



58,458/B SUPP.

BORSIERI G.

Digitized by the Internet Archive
in 2016



43574

INSTITUTIONUM
M E D I C I N Æ
P R A C T I C Æ

Q U A S

AUDITORIBUS SUIS PRÆLEGERAT

JO: BAPT. BURSERIUS
DE KANILFELD,

Editio Quarta Veneta.

VOLUMEN SEPTIMUM.
MORBOS PECTORIS
COMPLECTENS.




V E N E T I I S, 1802.

Apud Josephum Orlandelli,

N O M I N E

q^m. FRANCISCI EX NICOLAO PEZZANA.

CUM REGIA FACULTATE, AC PRIVILEGIO.



UBALDI VIGILII BURSERII

JO. B. APF.

P R Æ F A T I O.

EX prima fronte libri quisque perspiciet, quale sit praeceps, de quo hic agitur, argumentum. Quanam autem in unoquoque capite peculiariter comprehendantur, ex utriusque partitionis indiculis clarius innotescet. Uberiorem adhuc rerum cognitionem acquireret, si quis discendi cupidus singula quaque capita attente perlegerit. Quid plura? Restat modo, lector, ut certior de iis fias, quae aliunde scire, aut ex libro conijcere non posses. Quare praemonitum, te volo, hoc quartum volumen longe ab iis differre, quae vel auctor edidit, vel mihi edenda commiserat. Non enim elaboratas absolutasque continet praelectiones, uti fortasse sunt, quae tribus prioribus continentur voluminibus, sed rudes eas ac informes, quales nempe illi tum ex calamo exciderunt, cum primum eas de die in diem festinanterque in usus scholasticos enaraverat. Quamquam integrum novennium in schola ticinensi docentis munere functus est, non tamen eas pluries auditoribus suis, sed semel tantum tradidit excipiendas. Quod sane mirum videri posset, si primo restituta academia anno MDCCCLXX., quo simul & publice docere, & clinicen ad tironum institutionem facere in valetudinario ipse susceperat, hac illi provincia de medicina practica, ut ajunt, explananda demandata fuisset.

set , Verum non hanc illico medicina partem , ad quam reapse tradendam per legati litteras fuerat invitatus , sed alias atque alias , ipso quidem invito & discipulis agre ferentibus , ad exitum usque anni iv. tradere coactus est in gymnasio . Caussas vero non reminiscar , ob quas ei denegatum est , quod sibi ipse deberi contendebat jure promissi & conventi anno primo , quoniam culpa magis temporum calamitati quam aliorum invidia erit verosimiliter tribuenda . Id unum fas mihi sit animadvertere , munus hujusmodi ei delatum postea fuisse , cum nempe primum studiorum cura demandata est cl. v. equiti NICO-LAO PECCIO , cuius recentis jactura minus dolendum , quod modo illustres fratres iique juris consultissimi JACOBUS & JOHANNES DE BOVARIIIS , alter quidem in ejus locum suffectus prolegati insubrica praefectura , alter vero consiliarii , reique litterariae curatoris partes aequissima lance gerunt . Sub initium itaque anni quinti aggressus est ea methoâo tradere praelectiones ad praxim medicam , qua scilicet scholasticum curriculum intra triennium absolveretur ; & re quidem verâ in fine septimi primum idem absolvit . Nono autem vertente siue altero secundi curriculi anno , quo omnia clariori in lumine collocanda uti par erat sibi ipse proposuit , ab incœptis cessare compulsus est medio veluti cursu abreptus , ut Mediolanum concedens novo ei contredito regii archiatri fungeretur officio . Ab eo tempore praelectiones ad morbos pectoris & imi ventris spectantes , quas mox erat traditurus , in scriniis suis reposuit , ibique repositae ad ultimum fere vitae terminum manserunt . Etsi namque omnes subcessivas horas studiis im-

pertire

pertire solitus erat, has tamen sibi vindicave-
 rant tria priora volumina, eaque praesertim de
 febribus, morbisque exanthematicis febrilibus:
 quorum postremum vix initio illius quo decessit
 anni in ordinem redegerat, & una edendum
 paraverat aliud, quod tertio loco de capitis mor-
 bis prodixit. Potiorem temporis partem, prater
 suum officium, quod etiam infirmas valetudine
 fere semper usurpavit, alienis curis, quibus do-
 mi forisque distinebatur, donabat; minimam ve-
 ro omnium saluti prospicienda suae, etiamsi mo-
 lestiis invalescentis quotidie morbi affectus, acer-
 bisque doloribus confictatus nec rheda vehi, nec
 pedes ire commode posset. Prima autem quae se
 obtulit occasio educendi in lucem, & contrahen-
 di iterum praelectiones illas de morbis pectoris,
 imique ventris, haec fuit. Aeger ipse, jam nul-
 la spe reliqua de salute ejus, in lectulo jace-
 bat, cum properaret ad exitum tertii voluminis
 editio. Mecum de ea re colloquens conquestus
 est, se non posse institutiones medicas perficere,
 quas edendas susceperat suadentibus amplissimis
 viris tum laudato NICOLAO PECCIO, qui
 splendidissimos honores caesareae per Italiam re-
 gieque simul insubrica legationis florente adhuc
 aetate consequutus, eosdem aliquot ab hinc annis
 sapientissime, ac integerrime tueretur. Cupiens ta-
 men, quoad vires deficientes sincerent, bene de
 tantis viri promereri, voluit sibi abferri fasci-
 culos earum praelectionum, quas mihi jussit e
 scriniis depromere, ut supremam manum iis
 imponeret; meque peramanter rogavit, ut ego et
 ad easdem exscribendas adjutor forem, singula
 quaeque prout mihi ipse indicasset adornando.
 Facere aggressus libenter sum quod jubebat, at

non satis fausto felicique omne . Postquam duo capita de tussi , & cruenta exspuitione , nec non diagn. sim rthhiseos pulmonaris , de qua tertio morborum pectoris capite disputatur , omnia ab ore morientis excipiens ego conscripseram ; ipse vero ea mihi dictare inter summas anxietates & spiritus angustias , licet repetitis intervallis , plures dies conatus erat ; tandem necesse fuit omnino desistere , nam vires eius fracta penitus sunt , & vox fere intercepta . Hinc dolenti mihi & querenti , quod idem fatum , quo dulci ejus consuetudine privabar , nobis ejus lucubrationum fructum eriperet , ut solatium aliquod afferret , sic me , leniter subridens , allocutus est : „ hac rerum humanarum vicissitudo est : opus ipsa suum eadem quæ coagmentavit natura dissolvit : equo animo ferendum quod aliter fieri nequit . Si quid e meis scriptis in vulgus edidi , jam nosti non meo tantum quam aliorum judicio fecisse , & præsertim ut legibus academicis obtemperarem , nulla sane spe præmii allectus , nulla laudis cupiditate aut prospiciendi posteritati arrogantia permotus . Primum siquidem frustra expectassem ; alterum vero sibi polliceri post innumeras doctissimorum medicorum commentationes insanientis hominis esset . Morte vero obrepente citius adhuc quam gravi senecta , vitio mihi non vertetur , si quod fueram aggressus non absolverim . Nihil est ergo , quod te nimis reddat sollicitum . „ Mihi vero potenti instantique quidnam agendum de reliquis prælectionibus decerneret ? an eas evulgandas , cui credendas esse existimaret ? Ipse post breve silentium me iterum alloquens respondit : „ se nullo modo talium rerum editionem esse probaturum ; nam manca &


imper-

imperfecta plura cum sint, lituris aliisque vitiiis non paucis commaculata, nec legi eadem recteque intelligi, nec periodos quandoque sive orationis membra inter se parum interdum connexa colligari facile posse: præterea multa in usum scholæ vix delibata (quæ tamen ipse oretenus longiori sermone explicare solitus erat tum scholæ, tum in valetudinario) majorem amplitudinem exposcere ut lucem mererentur: quædam etiam fortasse tollenda, quædam addenda; perpolienda omnia, & ad priorum formam atque ordinem redigenda esse; ac id genus alia præstanda, quæ nonnisi vel ipsemet, vel saltem aliquis non tam peritus homo, quam diligens, æquo animo præditus, & a partium studio alienus perficere valeret: in hujus enim consuetudine vite non rerum scientiam, sed morum probitatem spectandam esse, quæ præstantior omni doctrina est. Ipsum autem neminem nosse, de quo prob' nimium diffidendum non esset; qui enim aptiores videntur, plerumque rerum innovandarum cupidos, vel plausus aut gloriolam aucupantes suæ magis adaugendæ famæ, quam publicæ utilitati studere, nec quæ vera sunt, sed quæ magis novi speciem referunt non levi rei medicæ detrimento plerumque sectari: omnes insuper medicinam facientes quo peritiores habentur, eo minus ocium studiis suppeditare posse, quod vix sufficiat invisendis curandisque agrotis; qui vero non satis peritis, eos vel desidiæ, vel oblectamentis deditos haud ita facile ad laborem & vigilias revocari; demum quoscunque studio partium teneri; ideoque malle suæ perpetuo delitescere, quam aut adulterata, aut turpiter mendosa in lucem prodire, „ Multo plura

tum protulit memorabilia, quæ veluti testamenti loco tradita excepi, atque animo defixi. Interim ipse morbi vi ad interitum ruens diem supremum obiit. Mala avi potestas mihi data non est penes me retinendi memoratos fasciculos. Etenim statim a morte ejus una cum ceteris scriptis ac libris in cubiculum conjecti fuere, cujus ostium sigillis obsignatum est, ut hereditum jura facta rectaque servarentur. Præter omnem expectationem accidit, ut idem resignatum amplius non sit nisi majore mense superioris anni MDCCLXXXVIII., quo tempore duntaxat e latebris eductæ prælectiones sunt, mihiq; concredita, ut si fieri posset in vulgus emitterentur, satisque fieret nostratum æque ac exterorum desiderio, qui omnes vel a me, vel ab aliis hoc quantum fisciabantur volumen tanquam jure ad idem acquisito, postquam illud quam proxime predicturum esse sponderat ambrosiani monasterii typographus in epistola, quæ III. volumine edita est. Idipsum ego licet exoptarem (pudebat enim negligentia redargui), redibant in mentem optimi parentis monita, a quibus si discessissem, mihi violata erga eum pietatis reus esse videbar. Verum nonnulli amicorum non dubitabant asserere, me pie magis cum eo facturum, si ego ipse operi restituendo, ne infecta institutiones ad praxim manerent, manum sedulo admovissem; nec quidquam efficere quod medicina studiis addictus non essem; quin immo omnem inde amoveri suspensionem, quæ suboriri forte posset de minus vera auctoris sententia, si ab aliquo artis medicæ quantumvis eximio cultore id præstitum esse constaret; quoniam experientia comprobatum est, homines eandem artem

exercentes suas merces sub alterius opificis nomine saepe numero venditasse, ut pluries venirent; quod sane de filio non medico judicari a nemine posset. Etsi me pluribus ad id hortabantur, mihi tamen evolventi autographa auctoris exemplaria, & singula quæque attentius perscrutanti nimis periculosum opus videbatur. Oportebat enim non modo ea diligentissime exscribi, quod absque OEdipo conjectore fieri interdum posse diffidebam, sed etiam partionum rationem aliquanto immutari, ne a suscepto priorum voluminum ordine hoc posthumum discreparet; notulas præterea ad rerum seriem quolibet paragrapho contentarum indicandam singillatim in spatio marginis apponi; multos quoque fontes, unde auctoritates scriptorum erant depromptæ; innui; plurima adjici ad calcem paragraphorum latine reddenda, quæ vel innumeris schedis hinc illinc inter paginas insertis adnotaret, vel in sua conjecerat auctor adversaria, quæque ut opportunis in locis collocarem, conjectura uti debuisssem; quandoque vero si qua occurrerent in antecedentibus loca observanda, eadem ob oculos legentium poni; & demum alia hujusmodi necessario perfici, ne vitio mihi vertendum esset totum discrimen, quod inter hoc & priora volumina intercedere videretur. Quibus omnibus perpensis parum absuit, quin omne de eodem evulgando consilium abjecerim. Verumtamen ne privatum meum commodum publicæ utilitati (absit verbo invidia) anteferre, aut amicorum sollicitationes parvi pendere viderer, malui hunc subire laborem, & potius temeritatis notam, quam desidis ingratiq; hominis incurrere. Libens itaque aggressus sum, brevique temporis interval-

statem redolentes , quibus laudationem auctori
 perhonorificam in ejus funere contexit pro sua
 erga cum singulari humanitate amplissimus S. R.
 E. Cardinalis DURINIUS ordinis mediolanen-
 sis , non tam splendore generis & romane diba-
 phæ , quam præclaris legationibus functis , amore
 summo in scientias & artes earumque cultores ,
 rara in omnes comitate & facilitate , doctis lu-
 cubrationibus editis , perspicacissimi ingenii vi , ac
 præstanti doctrina spectatissimus .



ANGELI CARD. DURINII

IN OBITUM

VIRI CLARISSIMI

JO. BAPTISTÆ BURSERII

DE KANIFELD

ODE ALCÆICA.

Clere plectrum threicium tibi,
 Boerhave subrum mens jubet, inferos
 Quo mulsit amnes, atque ab orco
 Eurydicem repetebat Orpheus.
 Imi sed orbis te semel inchoam
 Nulli reducent heu citharæ soni,
 Plutona quamvis ipse Molto (1)
 Sollicitet prece blandus. Aulæ
 Scit quippe scit Dis illacrimabili
 Qui accessit hospes, te & toties necis
 Tardare pennas imminentis
 Non humili solitum triumpho
 Deserta ferme regna Proserpinæ,
 Atque otiosum viderat Æacum,
 Umbrasque raras, te medente,
 Elysiæ penetrare valles.
 Qua nempe doctam cumque dabas manum
 Funus sub ipsum cedit inefficax,
 Et pene victrix mors remittit
 gregiæ spolia ampla vitæ.
 Securus artis præsidio tuæ
 Ager nec æstus, signaque sirii
 Fœcunda morbis, africanque
 Corporibus metuit nocentem:

Non

Non mortis ullum pertimuit gradum
 Mortale corpus, non tacito phthisis
 Peredit igni, non tumentis.

Dirus hydrops labefecit unda.

Quocunque ferret dira febris pedem,

Te mater omnis, te miserabilis

Poscebat uxor, ne caducum

Orba virum, puerosque ploret:

Seu confluentes forte timet notas

Præclara virgo, tu faciem eripis

Periclitantem, protegisque

Delicias juvenum futuras.

Isthæc loquatur *Papia nobilis*

Tuis medelis freta potentibus,

Salubre numen quæ colebat,

Te veluti, sobolemque Phœbi.

Te jure talem, te hinc meritis vehit

Regina subrum laudibus. Invidæ

Vocem recedant; nam medendi

Cuncta tibi superasse virtus.

Concessit. Alte tu physicæ impiger

Fontes perennes, tu penetralia

Rimatus aspernarius unns

Vulgus iners volitante penna.

Qualem ergo honorem, quam statuam (2) tibi

Ponemus? O cui non alium parem

In arte Phœbus, se remoto,

Aut oriens videt, aut recumbens!

Fecere nec te multiscium scholæ,

Librique tantum; sed sapientia

Cognata rebus, mensque facti

Experiens, animusque felix:

Non mille plantæ, millæ vitæ, & domi

Ignisque centum, aut *hypothesis* placens

Profunt medenti, vel coercent

Sæva luis, mala sæva febris;

Ni pectus adsit consilii potens ,

Ni plena rugis experientia ,

Ufusque naturam secutus ,

Quid potius moneant in aurem .

Hæc *praxis* olim grande decus sacræ

Adduxit arti . Sic veterum stetit

Secura fama , sic præivit

HIPPOCRATES , meruitque cælum .

Te sic medendi munere nobilem

Effinxit ardor vividus ingenii ;

Te mentis audax vis , sagaci

Consilio bene temperata ;

Te cura morbos tollere pertinax ,

Rerumque prudens experientia .

Sed dum laboras recreare

Instabiles hominum ruinas ;

Dum perspicaci lumine conspicias

Causas latentes , & vitia , & modos ,

Vicesque morborum , necisque

Insidias retegis dolosæ ,

Ægri mederi te bene sedulum

Incauta morbi vis subiti occupat ,

Et , te jacente , impune paræ

Exitium insubribus minantur .

Frustra quot herbas terra parens alit

Sumis salubres , quot chymia exprimit

Sumis liquores , non caducam

Arte potes retinere vitam .

Quod si dominantem cuncta Proserpinam

Ufus medendi , aut pæonius labor

Domare possent , non peritum

Phœbigenam Jove fulminante

Merisset orco dura necessitas ;

Non & batavæ præsidium scholæ

Vidisset umbras , & lycæi

Lux potior SYDENHAMUS angli .

Næc

Nec te ita^{rum} prime Machaonum,
 MORGAGNE, flectet te medicum cohors,
 Carminque jam mœstum pararem
 Ipse tuæ, leve munus, umbræ;
 Retro fugaces sed tibi Delius
 Donaret annos, sed stabili salus.
 Vultu renidens, & juvena
 Perpetuum renovaret ævum.

At sacra tellus reliquias licet
 Servet repostas; non simul occidit
 Præclara virtus, nec silenti
 Splendidior series laborum
 Jacet sepulcro; sed spatium bonis
 Extendit ultra, & rite docentibus
 Cælum recludit usque penna
 Fama volans metuente solvi.

VIR MAGNE vives tempus in ultimum,
 Dum volve^t undas lubricus abdua;
 Hortoque docto dum Ticini
 Subsiliens, medicamen, herbæ:
 Dum multa sylvæ filia nobilis.
 Pulchre explicatis erudiet comis,
 Succosque monstrabit scientes
 Ægram hominum relevare gentem.

VIR MAGNE vives tempus in ultimum,
 Vigiliarum qui bene prodigus
 Sepulcra molitus superba
 Pyramidum potiora mole.
 Non marmor aquæ, non ebur indicum,
 Aurumque spirans, nomen in alterum
 Demittat ævum, ut quæ dicasti
 Scripta TUO nova FERDINANDO (3).

Et si peribit quod tibi stat lapis
Ferrariana (4) clarus epigraphe,
 Non tu peribis, lux medentum.
 Vivitur ingenio; meiorque

Gens docta fastis te historiæ inseret ;

Tibique surgent templa perennia ,

Lauroque vernantes columnæ

Ad citharam properante saxo .

Dum multa pestis fraude Promethei

Deducta cœlo, dum febrium cohors

Vexabit orbem, ut medenti ,

Tu pariter memorandus ægro .

Quin atque etrusci pectinis arbiter

Te VILLA (5) musis charior ætheri

Te sidus addet, te benignum

Sidus, & insubribus salubre .


(2) Illustis vir patricius neapolitanus extemporeus poeta percelebris .

(2) Liberalitate JO. BAP. MANZONII mediolanensis simulacrum marmoreum eidem decretum , in porticu medica ticinensis gymnasii collocandum , quod ad vivum effinxit exculpfitque JOSEPH FRANCHIUS excellens in arte statuaria, & R. artium academix mediolanensis professor .


(3) Volumen primum harum *institutionum*, quod usque ab anno 1781. editum est , numini majestatique FERDINANDI AUSTRIACI Divi FRANCISCI I. aug. filii , & D. N. JOSEPHI II. fratri consecravit auctor , qui ejus archiatri munere fungebatur .

(4) GUIDO FERRARIUS latinissimus scriptor, elogiis, & inscriptionibus romano more editis inter insubres satis clarus .

(5) ANGELUS THEODORUS VILLA eloquentix græco-latinae , & historiæ insubricæ professor in ticinensi universitate , idemque inter poetas insubricæ nulli secundus .



DE MORBIS PECTORIS.



C A P U T I.

D E T U S S I

§. I.

Involuntaria (*), plus minus vehement, cita, & brevissimis intervallis iterata aeris e pulmonibus cum sonitu, aut clangore ad laryngem quodammodo arctatum allidentis explosio, quam magna plerumque inspirati (a) antecedit, peculiari, communique nomine vocatur *Tussis*. Videtur effici a subita, alternaque fibrarum, musculorumque expirationi potissimum inservientium contractione, quam excitat irritatio nervis, aut fibris, aut musculis ad organa respirationis spectantibus illata, & præsertim laryngis, tracheæ, bronchiorumque sensibilissimam membranam internam proxime afficiens, vel remote ad hæc partes producta, nam hæc vel in iis incipit, & insidet,

Tussis definitio.

Causa proxima.

Remota causa.

Tom. VII. A vel

Sensibi-
litate, &
irritabi-
litate
pulmones
præditi
sunt.

Prima
tussis dif-
ferentia.

vel aliunde ad eas porrigitur. Neque ab ejusmodi irritatione immunes existunt ipsi *pulmones*, quia nervis, & *sensibilitates* non modo, verum *irritabilitate* etiam donari nuper a Cl. VARNIERO (b) demonstratum est. Hinc prima oritur tussis distinctio in *idiopathicam*, sive *pectoralem*, & in *sympathicam*, sive per *consensum*.

(*) Voluntate etsi inhiberi quandoque possit, sic ut HALLERO (*Elem. physiolog. lib. VIII. sect. IV. §. 35.*) *voluntaria actio* habeatur, non tamen semper id in nostrâ potestate positum est.

VAR-
NIERI
observa-
tiones de
pulmo-
num sen-
sibilita-
te, & ir-
ritabili-
tate.

(a) HALLER. l. c. (b) *Memoires de la Societè Royal de Med. vol. 3. p. 39. Memoire sur l'irritabilite du poulmon*. Ubi Auctor evidentissime ostendit, *pulmones* in vivis animalibus irritabiles ubique esse; eorum enim lobi tam interne, quam externe irritati contrahuntur; rubent; indurescunt, aerem retinent, alium non admittunt. In aspera arteria, & bronchiis magis adhuc hæc patent; quod fibras habent musculares evidentiores. Ibi quoque ostenditur, irritationem pulmonum ad alias partes etiam protendi, sed præcipue ad musculos abdominis, qui vehementius, crebriusque tum moventur, & convelluntur.

§. II.

Idiopa-
thica
subdivi-
so. Sym-
pathicæ
differen-
tiæ.

Idiopathica rursus dividitur in *primariam*, in *secundariam*, & *sympathicam* (*). *Sympathicæ* pariter plures sunt differentię pro locorum, a quibus originem ducit, diversitate; videlicet *stomachalis*, *hypochondriaca*, *hepatica*, *diaphragmatica*, *intestinalis*, *hysterica*, *inguinalis* &c. Immo a testium, renum, vesicæ, capitis, aliarumque partium affectionibus non raro etiam proficisci visa est. Hanc autem laryngis, asperæ arteriæ, pulmonumque cum aliis partibus bene mul-
tis

nis consensionem plerique magna veri specie explicare nituntur per *Paris vagi & magni sympathici, sive intercostalis* potestatem; qua universo fere corpori dominantur:

(*) *Secundariæ, & symptomaticæ* exempla per sæpe occurrunt in acutis morbis, in febribus gastricis, in cachæxia; scorbuto, catarrhis, variolis, morbillis, purpura scarlatina, morbo miliari, in metastasi materiæ febrilis, scabiei, tineæ, achorum, herpetum, ulcerum, & denique in pulmonum morbis, peripneumonia, asthmate, tuberculis, vomicis, phthisi, empyemate, pleuritide, hydrothorace, præcordiorum vitiis organicis; hepatitide, thoracis contusionibus; vulneribus, costarum luxatione, fractura, vulneribus &c.

§. III.

Altera tussis distinctio est in *humidam, & siccam*: atque hæc cuicumque tussis generis communis habetur. In magna siquidem pectoris concussionem, aerisque repetita e pulmonibus explosione (§. I.) quidquid in vesiculis eorum, in bronchiis, in trachea, & larynge hæret, excutitur, & quasi avellitur; aut iteratis ictibus e vasis, glandulisque exprimitur, exscreaturque. Itaque, si humor aliquis tussi affertur, quicumque demum is sit, *tussim* tunc *humidam* dicimus: si vero nullus, nullave materies, *siccam*. At plerumque ab initio *sicca* esse consuevit; progressu vero sensim fieri *humida* solet. *Ferinam*, quando vehementior est, *lenam*, quando mitior, appellant. Itemque *continuam*, aut *intermittentem*, aut *periodicam*, *nocturnam*, *catarrhalem*, *rheumaticam*, *epidemicam*, pro diversa temporis duo in surgit, aut causæ, quæ eam gignit, ratione.

*Altera
divisio
in humidam, &
siccam.*

*Ferina,
lenis,
continua,
intermittens,
epidemicam
&c.*

§. IV.

*Tussis
convul-
siva.*

*An ve-
teribus
nota?*

*Synoni-
ma.*

*Cur con-
vulsiva
dicatur.*

*Præcipua
ejus phæ-
nomena.*

Præter hæc differentias, quæ tamen præci-
pue censentur, nuperi scriptores fere omnes de
convulsiva etiam mentionem faciunt, novo usi
vocabulo, quamquam morbus, quem eo compre-
hendunt, antiquus dici possit, fereque cum *tussi*
ferina conveniat, cum de eodem jam HIPPOCRA-
TES, ut refert FRID. HOFFMANNUS, meminisse
videatur ubi *tussim ferinam*, vel *delassantem*, vel
suffocantem commemorat. Neque posterioribus ea
ignota fuit. A SYDENHAMIO enim *pertussis* no-
mine donatur, atque a Gallis vernacula lingua
quinte, aut *coqueluche*, ab Italis *tosse canina*, aut
asinina vulgo appellatur. Primus fortasse, qui
eam *convulsivam* vocavit, videtur fuisse WILLI-
SIUS, neque inepte; non quod a convulso tan-
tummodo thorace fiat, cum id cuilibet tussi pro-
pe commune sit, sed quod adeo sæviat, ferociat-
que, ut non modo pectus, pulmionesque vehe-
menter constringat, eorumque cohibeat dilatatio-
nem; verum etiam universum ferme corpus con-
vellat & quatiat. Hac enim correpti, quod ad
intervalla contingit, pene suffocantur; facie tu-
ment, & livent; contremiscunt; sanguinem e
naribus, oculis, aut ore effundunt; ingesta evo-
munt; urinas, alvique excrementa vel inviti,
aut inscii excernere coguntur; interdum mortui
similes, resolutique remanent, sic ut excuti, &
spiritu insufflato ad reviviscendum revocari de-
beant. Præterea titillationis quemdam sensum in
larynge percipiunt, qui ad scrobiculum cordis vi-
detur propagari, sonumque reddunt peculiarem,
ac quasi ab imo prodeuntem, Sed illud in pri-
mis

his notandum est , quod tussientes per aliquot minuta expirent tantum , nunquam inspirent , & si demum inspirationi facultas detur , sibilum , strepitum , clangorem , & veluti ejulatum quemdam edant ; aere nimirum , ut mihi videtur , arctatam glottidem ingrediente , difficulterque superante . Tussis hæc pletumque infantes , & pueros vexat , atque epidemice vagatur , ac sæpe morbillos , aut variolas præcarrit . Non tamen semper adultis parcit .

*Quid
huic tussi
obnoxii ?*

§ V.

Causæ , a quibus *coriza* ; aliæque affectiones catarrhales profluunt (*a*) , *tussi* quoque in universum gignendæ valent ; cujusmodi in primis sunt frigus subitaneum ; venti boreales , item humidi , & frigidi ; repentinæ tempestatum vicissitudines ; pedum , aut aliarum partium improvida refrigeratio ; incautus a loco calido in frigidum transitus ; acce epidemicum in aere volitans ; & similia : quibus fit , ut retenta expirabilis materia , quæ a pulmonibus emanare deberet , aut quæ ab universa corporis superficie pròditura esset , & ad spirituales partes delata , aut suscepto ; absorptoque epidemico miasmate , mucus laryngem , trachæamque oblinire solitus vitium , acrimoniaque capiat , aut lymphæ , sanguisque uberior , viscidiorque factus ad eas , pulmonesque confluat ; congeraturque , & collectione , irritationeque tussim moveat . Tussim quoque provocant glandularum bronchialium vitia ; pulmonum cruda tubercula , scirrhi , vomicæ , hydatides ; acria in laryngem delapsa , inspirata , aut sponte ibidem genita . Hæc igitur origo est tussis *idio-*

*Causæ
genera-
tim .*

Secundarie tussis origo, & causse. pathica, & quidem primaria, De secundariis vero, & speciatim de scorbutica, venerea, scabiosa, herpetica, reliquisque symptomaticis, aut sympathicis rarioribus non est hujus loci fufius differere.

(a) Vid. vol. 3. cap. xi. de gravedine, coryza &c.

Diagnosis.

§. VI.

Tussis catarrhalis, & rheumatica quales? Tussis a causis modo (§. V.) descriptis exorta, quoniam cum catarrho, & rheumate omnino convenit, *catarrhalis*, & *rheumatica* passim nominatur, ut ab aliis tussis generibus distingatur. Prout vero a tenui, aut crasso humore efficitur, diversa etiam symptomata inducere solet, & diversam curandi rationem exposcit. Interest igitur signa utriusque causse accuratius indicare, ne error in diagnosi, & curatione subrepat. Tenuem, acremque humorem tussis causam esse, liquebit ex temperamento calido, & sicco, habitu graciliori, oculorum lacrymatione, & rubore, facie roseo colore suffusa, gravedine, narium pruritu, frequenti sternutatione, coryza humida, interdum nares, & labium superius excoriente, continua faucium titillatione, crebroque ad tussendum incitamento, vesperti præsertim ingralescentibus, nulla, aut pauca tenuioris limphæ, aut salivæ excretionem, spiritu aliquantulum difficili, pulsu plerumque celeriori, & duriusculo, & demum ex morbis prægressis, acritudinem humorum denotantibus. Contra ubi crassus, & viscidus humor tussim ciet, matutino ma-

Signa tussis a tenui humore.

Signa tussis a crasso humore.

gis tempore ea ægrum exercet ; materia tenax , albicans , vel subflava extuffitur ; pulmones , & bronchia spumoso mucro obstruuntur , & quodammodo opplentur ; respiratio gravis , & laboriosa aliquantum est ; dumque aer inspiratur , strepitus , & sibilus humoris intus veluti bullientis auditur .

§. VII.

Ex his igitur tussis sedes, & causa colligi potest, præsertim si ea antecesserint, quæ spiritalia organa potissimum afficere solent. Certius *catarrhalem* tussim esse apparebit, si gravedo, coryza, & faucium aliquis dolor non abfuerint ab initio : *idiopathicam* vero, potissimum si, præter super enarrata, altius inspirare volentem, aut aliquanto diutius loquentem continuo tussis corripiat, aut increbrescat ; si superior pectoris pars humore quasi oppleta percipiatur ; si vox simul rauca sit ; si sputa e profundiori loco prodire sentiantur ; si thorax, & sternum punctiunculis hinc illinc quasi feriat ; si febricula nocturna, & crebræ horripilationes accesserint, & cuncta vesperi exasperentur, quemadmodum de febris catarrhali alibi dictum est.

Certius
catarrhalis,
& idiopathica
quomodo
innotescant.

§. VIII.

Non prætermittendum est, tussim *convulsivam*, de qua supra (§. IV.) retulit, a plerisque cum tussi *stomachali* (§. II.) confundi, deducique a ventriculo, saburra acris, & mucosa obfesso, & prægravato. Qui in hujusmodi sententia conquiescunt, his propemodum argumentis confidunt :

An tussis
convulsiva una
sit, eademque
cum stomachali?

*Argu-
menta
affirman-
tia.*

*Quid iis
reponi
possit.*

ventriculum male affici in tussi convulsiva ex eo evinci, quod plerumque eam vomitus ingestorum, & materiae mucosae subsequatur; quod titillationis sensus ad scrobiculum cordis pertingat; quod profundius resonet, & clangosa sit, ac si in ventre sedem haberet, quod oleosa semper noceant, prosint vero amara, stomachica, & evacuantia tam ore sumpta, quam in anum injecta; quod similis tussis non raro invalescat in ipsis tertianarum quarundam accessionibus, quarum fomes in primis viis existere communiter creditur. Verum, si quid iudicio, ostendant prius oportet, quod sane difficillimum erit, vomitum non esse sympathicum, sed idiopathicum; sensum pariter titillationis ad cordis scrobiculum esse revera idiopathicum, neque fallacem, certoque ad ventriculum pertinere, neque eo loci aliunde protendi. Deinde nihil certe videtur probare sonitus obscurior, & profundior, quem tussis excitat, si vere talis est; cum sonitus ille non certe ad abdomen, sed ad pectoris, pulmonisque cava omnino referendus sit. Falsum porro est, oleosa semper nocere, amara, & evacuantia prodesse: nam saepe oleosa tussim hanc plurimum levant, quanquam interdum frustranea videantur, morbi vi superante. Nec amara, nec emetica, nec purgantia prosunt semper, uti pluries experientia prosunt semper, uti pluries experientia didici. Et, si quando aliquid boni praestant, an semper id praestant, quia stomacho amica sunt, quia saburram, caussamque ipsam educunt? Nonne etiam incidendo, attenuando, pulmones excutiendo, & sputum, diaphoresinque provocando juvant? Quamobrem integrum mihi erit ad HOMII sententiam probandam accedere, qui omne
discr-

HOMII
senten-
tia pro-
babilior.

discrimen, quod inter tussim convulsivam, & reliquas tusses idiopathicas intercedit, a majore partium, quam in vulgari catarrho, affectarum irritatione, majoreque totius corporis irritabilitate repetere non (a) dubitavit.

(a) *Princip. Medic. l. 2. p. 3. sect. 5. §. 10.*

Prognosis.

§. IX.

Tussis ut plurimum levis morbus censetur, sed perperam; nam sæpe in alios gravissimos morbos degenerat, atque alia periculosissima mala advocat, uti peripneumoniam, pleuritidem, anginam, hæmoptysim, phthisim pulmonarem, tuberculam, vomicas, gibbositatem, sanguinis e naribus fluxum, hernias abdominis, aut inguinis, abortum, uteri hæmorrhagias, organica præcordiorum vitia; capitis dolorem, vigilias, apoplexias lethales ex ruptione vasorum cerebri, atque alia ejusmodi. Capiti certe, atque oculis semper noxia est. Si tussi *catarrhali* superveniant sputa crassa, & concocta, aut struis sanguineis remixta, plerumque morbum (a) solvunt. Interdum sudor, interdum alvi fluxus contumacissimæ tussi remedio fuit. *Convulsiva* tussi infantibus unius anni, atque ante dentium caninorum eruptionem non raro exitium affert; reliquis non item. Illi plerumque evadunt, qui sanguinem e naribus fundunt (b). Si diu trahitur, ut sæpe accidit, nec mitigari; nec compesci possit, abit in morbum schrophularem, in rachitidem, in (c) phthisim (*).

Prognostica.

Quot morbos periculosos necesse inducat tussis?

Catarrhalis fausta signa.

Convulsivæ prognos fausta, & infesta.

(a) VAN-

(a) VAN-SWIET. in BOERH. §. 830. n. 2.

(b) BISSET *Medical. Essays and observat.* p. 173.

(c) *Id. ib.* p. 178.

G. BUT-
TERI

*Angula-
ris opi-
nio an
vera sit?*

(*) Hanc ob causam potissimum GUILLELMUS BUTTERUS in peculiari tractatu *de tussi convulsiva* angelice scripto opinatur, hunc morbum suam sedem nequaquam in pulmonibus habere; additque se nunquam a *tussi pulmonari rachitidem*, & *scrophulas* profectas vidisse. Vid. *Comm. med. & philos. Soc. med. Edim. T. I. p. 4. n. VIII.* Sed pace ejus dictum sit, viderunt alii; nec difficilis explicatu res est. Quid? nunquam ne *phthisim pulmonarem* vidit ex *tussi convulsiva* natam, quod adeo frequens est?

Curatio.

§. X.

*Curatio
generalis.*

Qualibet tussis (§. I. II.) oppugnanda iis est, quæ causam efficientem emendant, aut tollunt. In universum si senior tussis est, longisque intervallis interrupta, sola sæpe naturæ ope, aut sola abstinencia, potu aqueo calenti, & regimine diapnoico discutitur. At si vehementius, & crebrius divexet, sanguinis missionem, etsi febris absit, interdum etiam repetitam exoptat, ut nimirum inflammationis initium, aut ejus timor avertatur, aut imminens vasorum disruptio præcaveatur. Id in primis in sanguineis, plethoricisque, in proclivibus ad hæmoptysim, & phthisim, in tussi *sicca* (§. III.), itemque in ea, quam acer, calidusque humor (§. VI.) procreat, Nihil enim certius vasorum plenitudinem, congestiones, phlogosim, spasmos, quæ cum tussi paullo molestiori junguntur, tollit, resolvitque, quam sanguinis missio: ex hac enim neglecta inter initia tussis, & catharralium affectuum pedetentim

*Sanguinis
missio.*

*Omissio
venæ sc-*

gentium ad phthsim transitum fieri , sapissime vident , & queruntur clinici peritiores . Post hæc maximum præsidium præbent diluentia , & diaphoretica ; blando enim , & continuato sudore causa morbi educitur , avertiturque a pulmone .

*etionis
sape phth-
thiseos
caussa .*

§. XI.

Acrem vero , tenuemque humorem , qui tussim efficit , temperant , atque obtundunt *diluentia* , & *incrassantia* , uti decocta hordei , avenæ , radicum althææ , glycyrrhizæ , saleb (*) cynosorchidis , aut diluta foliorum theæ , florum papaveris erratici , violarum , malvæ , verbasci ; item serum lactis , hydrogala , jure ranarum , testudinum nemorensium , caudarum cancrorum fluvialium , emulsa ex seminibus oleosis , & mucilaginosi , cremor orizæ , olea pingua recenter sine ignis opera expressa sperma ceti candidissimum , atque alia hujus generis , utpote quæ spasticas etiam contractiones laxant , & molcent . Valentius incrassant , acritateque involvunt gumi arabicum lucidum , & albicans , & tragacanthicum , ex quibus non modo mixturæ , & eclegmata , verum etiam cum succo glycyrrhizæ , aut saccharo parantur tabellæ , & rotulæ , inter quas celebres admodum sunt illæ , quibus *Pasta Althææ* , sive *Pate de guimauve* nomen est . Ubi autem crassus , & viscidus humor morbum facit , incidentia , & attenuantia indicantur , quæ sunt mel ; oxymel , radix helenii , thus , flores benzoe , sulphuris , decocta ex passulis , rapis , veronica , scabiosa , pulmonaria , marrubio albo , polygala vulgari , aut virginiana , pareyra brava , & radice bardanæ . Validiora adhuc sunt sapo venetus ,

Diluentia , & incrassantia .

Incidentia , & attenuantia .

tus, gummi ammoniacum, Kermes, minerale, sulphur auratum antimonii, stibium diaphoreticum non ablutum, aliaque hujus census, a quibus illud etiam emolumenti expectari licet, quod torpentem solidarum partium vim sollicitant, eriguntque. Sunt tamen quædam ex his, uti sapo venetus, gummi ammoniacum, marrubium &c., quæ cautissime in usum vocari debent in temperamentis calidis, & siccis, in diathesi sanguinis ad inflammationem prona, in sensibiliore corpore, ne acrimonia, & caliditate noceant.

(*) Radix *Saleb* hodie magno in usu est, & quasi tota in mucilaginem solvitur. Ex indigenis ei substituitur radix cynosorchidis.

§. XII.

*Revel-
lencia.*

Revellentia quoque egregiam operam præstant, quorum præcipua sunt balnea pedum, epispastica, & vesicantia. His enim interdum mirum in modum tussis minuitur, sensimque depellitur, sputum facilius, & respiratio liberior redditur, brevique sanitas restituitur, advocata scilicet aliorum, atque evacuata morbifica materie. Hoc etiam nomine commendanda sunt eccoprotica, & clysmata, quibus alvo soluta non raro contumaciores tusses devictas novimus. Immo interdum solis catharticis paullo valentioribus cedere eas vidimus. Quo opportune spectat observatio PROSPERI ALPINI, qui multos narrat a diuturnis ingulmones distillationibus ita languidos, & quasi tabidos factos, ut de eorum salute vix ulla spes superesset, & nihil a vulgaribus alvum ducentibus levatos, tandem ab assumpta scamonea, vel
colo-

colocynthide largissime purgatos exemplo (a) convaluisse.

(a) De medic. Ægyptior. l. 4. c. 6.

§. XIII.

Tanta tamen est tussis vi interdum, ut his (§. X. XI. XII.) prope despectis ægros, neque ad quietem se componere, neque somno indulgere permittat. Hinc ad sedantia, anodyna, & narcotica subinde confugere oportet, quibus ipsa conticescat, & quieti, & somno locus datur, Leni, atque innocua facultate valent aquæ violarum, nymphææ, lactucæ, papaveris rhœados, aut harum plantarum diluta, aut conservæ, ut vocant, & præ cæteris emulsa ex seminibus frigidis, & *syrupus* papaveris albi aut *de meconio* SYDENHAMII. Majori vi agunt opium, *laudanum liquidum* SYDENHAMII, *laudanum nepenthes* QUERCETANI *pilule de styrace* SYLVII, de cynoglossa, aliaque opium recipientia, quæ ab auctoribus passim describuntur. Nonnulli ad sedandam acerrimam, molestissimamque tussim proponunt vaporem aquæ calidæ, cui molissimæ plantæ incoctæ sint, ore infundibuli ope hauriendum. Neque id quidem sua laude fraudari debet. In ejus tamen usu cavendum est, ne vapor nimis calens sit, neque in iis usurpetur, qui ad sputum sanguinis propendere videntur, aut nimia pulmonum laxitate, ac debilitate laborant.

*Paregoricorum
usus.*

*Vapor
aque calidæ
quibus con-
veniat?*

§. XIV.

*Curatio-
tussis con-
vulsivæ.
VS. in-
ter ini-
tia.*

*Emesis
alvi du-
ctio; re-
vellen-
tia.*

*Parego-
rica. Me-
thodu.
SYDEN-
HAMII.*

*HUXHA-
MII, &
BESSE-
TI.*

*BUR-
TONI,
opinio
his con-
traria
irride-
tur.*

Tussi porro *convulsivæ* (§. IV.), quæcumque ejus demum causa sit, experientia edocuit, utilissimum esse sanguinem aliquanto largius protinus inter initia mittere; vomitum blande, & iterato etiam, ubi nihil contra obstat, ciere; alvum ducere manna, rhabbaro, mercurio dulci; cantharidibus cutim exulcerare, ut mucuosus, acerque humor solvatur; extrorsumque avocetur; & simul demulcentibus, incrassantibus, absorbentibus, paregoricisque *tussim* lenire. SYDENHAMIIUS, tussim hujusmodi curari tantum sanguinis missione, epispasticis, & catharticis lenioribus HUXHAMIO (a) auctor est. HUXHAMIO mercurialia catharticis admiscere primum, deinde corticem peruvianum dare (b) maxime placuit. BISSETUM quoque si audiamus; optimum præsidium est in leni emetico ex oxymelle scillitico, atque rhabbaro, & mannae usu; deinde in cortice peruviano, præsertim morbo jam inclinante, & tussi longiora quietis intervalla (c) relinquentem. Ex emeticis præferuntur kermes minerale; ipecacuana, tartarus emeticus, oxymelque scilliticum (d). His verò adversatur Cl. BUBTONUS (e) phlebotomiam, emesim, & catharsim vituperans: excepto aliquo graviore casu; laudat vero mixturam, in quam cantharides ingrediuntur. Nec mirum, cum Angli, aliique transalpini venenis, & vehementioribus medicamentis plerique delectentur.

(a) Epist. I. responso. (b) *De morb. epid.* T. i. p. 75. T. 2. p. 26. 28., & pag. 178. (c) *Medical Essays and observat.* p. 178. (d) *Essays de medec. d'Edimb.* T. 4. p. 26., & HUMAN. l. c.

(e) *Essays de med. d'Edimb.* T. 7. p. 120.

§. XV.

§. XV.

Musculus arboreus , & speciatim querneus ad-
 versus hanc tussim (§. XIV.) mirifice valere di-
 citur. Ejus decoctum BAGLIVIVS extollit . Ex eo
 etiam paratur syrupus ; ut pueris , infantibusque
 dari possit (*). Quod autem ad musci hujus de-
 coctum , METZGERUS (*a*) *irrito successu* illud
 adhibuit ; sed unico experimento id affirmat , nec
 iteravit , ut par fuisset , periclitationes , Muscum
 item (**) pyxoideni , sive lichenem pyxidatum
 contra *tussim convulsivam* (*coqueluche* vulgo di-
 ctam) uti specificum laudat VAN-WOENSEL (*b*) .
 Dedit is utilissime decocti forma , syrupo men-
 thæ edulcatum . Ejus pulverem pluries datam com-
 mendat DILLENIVS ex auctoritate , & fide GE-
 RARDI , & WILLISH . Alii decoctum ex lacte sæ-
 pe in die sorbillandum præcipiunt . Nonnulli ex
 nuperioribus extractum cicutæ reliquis remediis
 anteferunt . BUTTERUS (*c*) viginti historias re-
 censet , quibus ostendat præstantissimam hujus me-
 dicamenti hoc in morbo facultatem . Ipse uteba-
 tur hujusmodi extracto in liquore quodam aquo-
 so soluto , & satis diluto ; de quo parum primo ,
 deinde plus propinabat . Infanti nondum sex men-
 ses nato dabat granum dimidium uno die parti-
 tis vicibus absumendum ; ætati sex mensium ad
 biennium usque granum unum . A duobis annis
 usque ad vigesimum tot grana dimidia ; quot
 anni , præbenda singulis diebus jubebat . Post vi-
 gesimum ætatis annum , decem grana primo die
 exhibuit , deinde dosim auxit , prout opus ei vi-
 sum est . Si æger hinc bis in die non dejecerit ,
 suadet adjici magnesiā , aut salem polychrestum .

Specifi-
ca .BAGLI-
VII .Non be-
ne MET-
ZERIUS
experien-
di ratio-
nem se-
quitur
est .Lichen
pyxida-
tus .Extra-
ctum ci-
cutæ , e-
jusque
adhiben-
di modus
juxta
BUTTE-
RUM .

Cui-

Cuicumque non modò ætati, sed temperamento, & sexui innocue dari asseverat. Si morbus complicetur cun *vermibus*, *dysenteria*, *dentitione*, *variolis*, *morbillisve* præter cicutæ extractum non omittit remedia hisce morbis accommodata. Nec timet eo uti in utero gerentibus, sive gravidis

Monitum auctoris. foeminis, aut feбри laborantibus. Restat igitur, ut remedii hujus laudes novis, accuratisque periculis confirmentur. Non desunt etiam, qui moschum utiliter adhibuerint, præsertim in hysteri-

Moschi utilitas. cis, atque hypochondriacis, mobilique nervorum systemate præditis. Anodyna enim, & diaphoretica virtute prodesse videntur. GORTERIUS (d) in quadam *epidemica tussis convulsivæ constitutione* mixturæ cujusdam salinæ, & diaphoreticæ utilitatem expertus est. Nec revera quidquam utilius est, quam diaphoresim promovere in morbo, quem plerumque acre perspirabile retentum parit. Ego non semel infantibus, & pueris magno cum juvamine dedi quoque butyrum recens, pluries aqua purissima subactum, & lotum, atque

Mixtura GORTERII. in parvas pilas frigidas redactum, quarum una, vel altera, saccharo conspersa, subinde vorabatur. Serum quoque lactis defæcatum, immo lac ipsum aqua calenti dilutum non semel morbi vim fregit, ejusque progressum inhibuit, aut saltem tutiorem reddidit.

Butyri creæ lactis, & lactis ipsius mirabilis.

(*) Syrupi hujus formula exstat in *Pharmacopœa VVittembergenst.*

(a) *Advers. medic. T. 2. p. 56.*

(**) Muscus pyxioides; sive lichen pyxidatus est *muscus pyxioides terrestris C. B.*, aut *lichen pyxidatus major Instit. R. H. TOURNEFORT.*, sive *Lichenoides tubulosum pyxidatum cinereum DILLENII.*

(b) *Hist. de la Societ. Royal. de Med. T. 2. p. 294.*

(c) Vid.

(c) Vid. *Diar. med. Paris. T. 52. p. 523.*

(d) *Dissert. de Tussi*, quæ lectu dignissima est.

§. XVI.

Cæterum in omni tussi diuturniore, quando morbus ad finem inclinat, & magna pars materię expulsa per sputa est, aut diutius, quam oportet, & copiosius ad pulmones ob atonię quendam speciem humor catarrhalis confluit, indeque sputorum copia corpus emacrescit, tunc leniter roborantibus, & traumaticis tonicis fit locus. Amara huc spectant, præsertim si stomachi inbecilitas, pulmonum, habitusque laxitas tussis causam fovere videatur. In his cortex peruvianus, quem memoravi, primas tenet. Egregie is etiam proficit, cum tussis periodum quendam præse fert. Periodicam tussim hoc præstantissimo auxilio etiam Homrus celerime abegit. Utiliter corticis hujus decocto, aut diluto adjicitur lactis asinini, aut vaccini aliquantulum. Hodie ad tussim diuturnam, phthisimque minitantem proponunt multi decoctum lichenis islandici, cui vis demulcens, & incrassans tribuitur. Non nullis etiam resolvere, atque incidere creditur. Præter mucilaginosam naturam aliquid etiam acrimonię habet, ut ostendit ejus ametica, aut cathartica virtus, si saturatius decoctum præbeatnr. Nos diuturnas, siccasque tusses interdum fugavimus copioso aquę *nucerinæ*, aut *villensis* potu jejuno stomacho adhibita, & balneo tepido aquę dulcis. *Scelteranam* aquam cum lactis asinini tertia parte nuptam, & mediocri quantitate ad aliquot hebdomadas mane sumendam præcipiunt alii, maxime Germani.

*In fine
cujusvis
tussis ro-
borantia*

*Cortex
peruviana-
nus.*

*Lac.
Lichenis-
landicus
in tussi
diuturna,
phthisim-
que mi-
nante.*

*Aqua
medica-
ta.*

§. XVII.

Tussi senili incidentia, & amara.

Regimen frigidum quibus?

Salsa capitis fluxiones quid continent?

Aque frigidae aspersio.

Fonticuli.

Senes quoque tussi sæpe vexantur; hinc tussiculosi vulgo dicuntur. In his tussim, quam ple-
rumque copiosior mucus in ventriculis laryngis,
atque in folliculis sive cryptis asperæ arteriæ,
bronchiorumque collectus facit, incidentibus,
amaris, & attenuantibus (§. II.) oppugnare (a)
oportet, quia rancedines, & gravedines in valde
senibus, ut inquit HIPPOCRATES (b), non co-
quuntur. Qui vero catarrhis, rheumaticisque af-
fectibus obnoxii maxime sunt, debent paulatim
aeri assuescere, cubicula calefacta vitare, sensim
indumenta nimia minuere, cubile frigidum in-
gredi, conclavia temperatissima incolere, frigi-
dum cibum, & potum sumere, multum excer-
ri, & si affectio inveteraverit, cortice peruvia-
no, & balneis frigidis firmari (c). Qui falsis
capitis defluxionibus infestantur non facile cathar-
tica admittant, ne per cellularem textum ad pe-
ctus, & pulmones humor noxius alliciatur. Uti-
lius in iis sudor cietur decocto ligni santali, &
guajaci, & herbarum cephalicarum (d). His quo-
que prodest verno tempore frigida caput, & col-
lum subinde aspergi. Sic enim fluxiones illarum
partium, quæ a nimia laxitate soventur, sæpe
præcaveri visæ sunt. Plurimum etiam boni effi-
ciunt prophylaxeos causa fonticuli brachiis, aut
femoribus inusti.

(a) VAN-SWIETEN in BOERH. §. 69. GORTER.
dissert. de Tussi. §. 50. (b) Aphor. 40. sect. 2.

(c) Gazzett. d'Oltremonti 1762. num. XXXII.
edit. vect. (d) BENNET Theatr. Tabid. p. 119.

§. XVIII.

§. XVIII.

Ad hæc autem accedat diæticum regimen ; *Diæta*, oportet. Cibi sint concoctu faciles. Carnes & quævis acria vitentur. A vino abstinere saluber-
 rimum est, itemque a cœna, cujus loco aut lac, aut ptisana hordeacea ; aut pulmentum leve ex farina hordei non nihil tosta esse poterit. Aeris quoque delectus necessarius est ; quo solo interdum pertinacissimas tusses sublatas ferunt. In his potissimum vectio, equitatio, balnea, aquarum medicatarum potus, decocta lignorum, & radicum purificantium, & lactea diæta tentari debent ; ut cauteria præteream, quæ in humidio-
 re habitu, cacochymoque corpore quantum pro-
 ficere possint, nemo non videt.

§. XIX.

De tussibus secundariis, symptomaticis, ac sym- *Tusses*
 pathicis nihil dicam. Ut enim hæc omnes ab aliis *secunda-*
 morbis, aliarumve partium vitiis ortum ducunt, *ria &*
 sic non aliam curationem petunt, quam quæ *sympa-*
 morbis, & causis, unde manant, accommoda- *thice &*
 ta est. Quare a *scorbuto*, a *lue venerea*, a *scro-*
phulis, a *mensibus retentis*, a *morbillis*, *febri-*
bus, *peripneumonia*, *pleuritide*, *asthmate*, *hy-*
drothorace, *phthisi*, *cacochylia primarum viarum*,
dyspepsia, *vermibus*, *obstructionibus imi ventris*,
hysteria, *hypochondriasi*, & sic porro, earum cu-
 ratio desumi debet.

CAPUT II.

DE CRUENTA EXSPUITIONE, ET
SPECIATIM DE HÆMOPTYSI.

§. XX.

Sanguis, qui ex ore exspitur, variis e locis
profundi potest, nempe e gengivis, e lingua, e
palato, faucibus, columella, naribus, pharynge,
œsophago, ventriculo, larynge, aspera arteria,
& pulmonibus. Effunditur autem eisdem omnino
modis, quos alibi (a). ubi de *narium hæmor-*
rhagia disseruimus, oportuit explicare. Quocun-
que autem e loco erumpat, *cruenta exspuitio*
est, sive *sanguinis sputum*; græce αἱμοπτύσις *.
At distinguendam a *cruenta exspuitione*, sive san-
guinis sputo *hæmoptysim* putat RIVERIUS aucto-
ritate ductus GALENI (b). Cum RIVERO FRID.
HOFFMANNUS, LUDWIGIUS, PLATENERUS, alii-
que bene multi ex nuperioribus non sine causa
consentiunt. *Hæmoptysim* proprie, & speciatim
sanguinis puri & non pauci e pulmonibus pro-
deuntis per os excretioni tantummodo convenire
ajunt, neque promiscue esse usurpandam hanc
vocem. Si tamen quis voluerit sanguini etiam e
larynge, aut aspera arteria profluenti *hæmopty-*
feos nomen tribuere, per me quidem licebit,
nec crimini id cuiquam dabo, cum levior saltem
hæmoptysis, aut quidam ejus gradus haberi queat,

(a) T. 3. cap. XII. (b) De crisib. l. 1. cap. 1.

§. XXI.

Cum ea (§. XX.) tamen confundi nequaquam debet sputum subcruentum, aut striis sanguineis remixtum; quod pleuritici, & peripneumonici emittunt; neque illud, HOFEMANNUM audiri lubeat, quod causam externam & violentam, vulnus puta, contusionem, ictum, vel graviorem casum subsequitur. Nam hæmoptysis vera ea est partium spiritualium hæmorrhagia, quæ a causa interiore, puta sanguinis copia, aut dyscrasia, aut læsa vasorum pulmonarium compage, & continuitate pronascitur. Video præterea CÆLIUM AURELIANUM, NICOLAUM PISONEM, aliosque *sanguinis sputum* ab ejus *fluore* secernere, illud esse existimantes, quando sanguis paucus, aut concretus cum pituita, aut aliis humoribus effertur; hunc vero, nempe *sanguinis fluorem*, quando purus, rutilans, floridus, & magna copia erumpit. Quæ distinguendi, loquendique ratio & si hodie fere obsoleverit, non tamen inutile erit animadvertisse, quid veteres hisce vocabulis intellexerint, ut omnis confusio, obscuritasque, quæ eorum scripta legentibus oboriri potest, procul arceatur. Discrimen enim, quod hodie inter *sanguinis sputum*, & *veram hæmoptysim* intercedit, fere idem olim a quibusdam ponebatur inter sanguinis sputum, & fluorem, ut dictum est.

sputum sanguinis quoddam differt ab hæmoptysi.

Hæmoptysis vera quanam?

Discrimen inter sanguinis sputum, & fluorem.

Diagnosis.

§. XXII.

Quibus indiciis locus, unde sanguis effluit, internosci possit? Quoniam igitur tot modis (§. XX.) sanguis ore excerni potest, quærendum modo est, quibus indiciis locus, unde manat, recte cognoscatur. Itaque si e gingivis, lingua, aut palato exstillat, simplici exspuitione emittitur, & facile inspecto ore, undenam prodeat, innotescit.

Quinam e gingivis, & palato prodeat? Præterea, qui e gengivis manat, ut scorbuticis crebro accidit, ferosior, dilutior, aut quandoque etiam nigricantior est. Titillatio vero aliqua circa palatum percipitur, si illinc scaturiat; & plerumque capitis gravitas, aut dolor, aut aurium

signa sanguinis e palato erumpentis. tinnitus, aut temporum, & frontis pulsatio, aut somnus nocturnus præcessit. Hic sæpe matutinis horis post somnum, & decubitus apparet.

Quomodo cognoscatur prodire e faucibus, aut naribus interius? Qui vero e faucibus, gurgulione, aut interioribus naribus profilit, solo excreatu, & sine tussi educitur. Interdum tamen tussiculam is movet, aut vomendi voluntatem, prout vel in laryngem, vel in œsophagum sanguinis aliquid deciderit. Insuper oculis locus patet, & semper cruenti quid e naribus emungitur, si ab his in fauces descenderit. Non tamen, quotiescunque sanguis e naribus emungitur, illico statuendum est illum etiam, qui ore prodierit, e faucibus, & naribus exsilire. Nam sæpenumero sanguis e larynge tanto impetu profunditur, ut aliqua ejusdem pars sursum in narium cava irrumpat, emungique antea possit. Quo casu evidentissimum est, fallax ejusmodi signum esse, neque eidem semper fidendum. Interdum quoque incidit (quod non

non semel a nobis observatum est), ut dum e pulmone sanguinis fertur, eodem tempore narium vasa a vehementiore tussis nisu simul dirupantur, sicque sanguis utraque ex parte, ore nimirum, & naso erumpat. Cavere igitur oportet, ne utrumque sanguinem e solis naribus profluere temere credamus.

§. XXIII.

Ab œsophago, aut ventriculo quando proficiscitur, crassus, & niger sanguis plerumque est; *Quando ab œsophago, aut ventriculo manat* quandoque etiam, sed rarissimum est, aquæ, in qua caro lota est, speciem refert & vomitu tantumodo ejicitur. Animadvertendum vero est, vomitu interdum expelli sanguinem, qui inter dormiendum e facibus potissimum extillans in œsophagum penetraverit. At quando in ventriculo ejus scaturigo est, epigastrium & dolor, & pondus, & anxietas, & ardor plerumque percipiuntur, absuntque affecti pulmonis, aliarumque sedium indicia. Levi tussicula, exiguoque motu extunditur sanguis e laryngis, & asperæ arteriæ vasculis. *Quando larynge, & trachea?* Præterea pruritus, & calor aliquis in trachea ipsa percipitur, & quodammodo sursum ascendere videtur, antequam in ore sanguis se prodat. Si vero profundiora e loco, pulmonibusque scaturiat, tussi validiore expelli solet; floridus, & spumidus ab admixto aere est, & murmuris, strepitusque quoddam genus intus efficit. Hinc jure scripsit HIPPOCRATES: *qui sanguinem spumosum expiunt, his ex pulmone talis rejectio est (a).* Quod si tussis, aut clamor, aut aliud simile, quo pulmonibus vim inferri notum est, antecesserit, aut dolor *, aut pondus in pectore

sentiatur, aut ægre spiritus ducatur, aut cum
 punctiōnis, divulsiōnisve alicubi, præsertim ad
 scapulas, sensu copuletur, aut major aeris quan-
 titas hauriri, inspirarique nequeat, quin tussis,
 & sanguinis sputum invalescat, aut exsuscitetur,
 non licet amplius dubitare, num e pulmonibus
Animad. sanguis effusus sit. Scire demum oportet, *versio ad*
fraudem, quandoque tussicula, ac vix notabili sanguinem
et erro- efferri qui idcirco e superiore larynge exire vi-
rem vi- deatur; cum tamen ejus copia, & ea quæ con-
tandum. sequuntur deinceps, sæpe ostendant, fraudem
 subfuisse; & e pulmonibus, aut saltē e bron-
 chiis eum prodiisse.

(a) *Aphor. 13. sect. V. Coacar. n. 433.*

*Pulmo-
 nes sensu
 donan-
 tur.*

* Olim credebant, sensu pulmones carere; quod
 nervis destituerentur, vel si qui ad eos pertingerent, in
 sola eorum exteriori facie vagarentur a *sexta* deducti
conjugatione, quam hodie *octavam* vocamus. Quare
 plerique antiquorum docuerunt, sputum sanguinis e
 pulmonibus sine dolore educi: quod etsi quandoque ac-
 cidat, non tamen perpetuum, & constans id est. Nam
 & nervis præditos esse pulmones anatomicorum soler-
 tia demonstravit, & sensu etiam interius donari cli-
 nicæ observationes evicerunt (§. I.) Veteres ipsi
 experientia didicerunt, sanguinem ab imo pectore
 interdum effundi cum doloris quodam sensu pectus
 occupante; quod ubi evenire videbant, ne præcon-
 ceptæ de insensibilitate pulmonum opinioni valedi-
 cerent, e thorace, sive e pleura; quam sensibilissimam
 reputabant, tunc effundi dicebant, non e pulmoni-
 bus; nec norant; id anatomicis, physiologicisque ex-
 perimentis penitus adversari. Dum enim charybdim
 vitare volebant, se in scyllam incidere non animad-
 vertebant. Nec satis obstat sensibilitati pulmonum
Doloris a auctoritas ANDRÆ VESALII, anatomaci alioquin
pulmoni- celeberrimi, qui in compluribus, & potissimum in Co-
bus absen- mite DE BURA observavit magnas pulmonum suppu-
tia nihil rationes, quin dolorem perciperent; idque non
officit; et
quare?

tum est. Sed tunc probabile est, sensum doloris non excitari, quia sensibilitas infractu, compressione, aut alia quacumque ratione in nervis pulmonicis quodammodo obstupefcit, ac quasi aboletur, aut etiam adeo lenta est eorum tensio, distractio, & dilaceratio, ut nequaquam dolorem inferat. Præterea si exempla non desint doloris absentis in pulmonum morbis, multo plura suppetunt doloris eos comitantis. Nuperrima item *Cl. LORRYI* capta in vivis pericula (*Experienc. sur l'Irritabilité &c.*) confirmant, *pulmones*, & in primis eorum interiores partes, uti *bronchia*, sensu reapse pollere; quod observatu dignissimum est.

§. XXIV.

Magni etiam refert nosse, *sanguinem*, qui e pulmone effunditur, non semper floridum, & rutilum & spumosum (§. XXIII.) esse, sed non nunquam atrum, densum, & coactum apparere. Talis enim cernitur, cum aut moram in pulmone, ejusque vesiculis fecerit, substiteritque diutius immotus, aut e vasis varicosis, aneurysmaticisque, in quibus congestus fere concreverit, repente deliscentibus effluxerit. Niger quoque, & porosus spongiæ instar extussitur, BAGLIVIO (*a*) testante, si pars aliqua pulmonis sphacelo corrupta fuerit: Quas ob res signa hæc, qualia memoravi, una & conjunctim consideranda sunt, ut sedem peculiarem, ex qua sanguis dimanat, tuto definire possimus; multaque prudentia, & cautione opus est; ne in judicando decipiamur. Secus enim, & seorsum sumpta, neque ad rariora, & minus frequentia collata, incertum, fallaxque judicium faciunt.

(*a*) *Cap. de rar. affect. hepatis.*

§. XXV.

*Exceptio
circa
sanguinem e
pulmone
manan-
tem.*

§. XXV.

Causa proxima. Quod ad proximam attinet hæmoptyseos causam, ea est vel vasorum ruptura, quæ grece dicitur *ρήσις* *, & *διαίσις* **, vel erosio, sive *διαβρωσις* ***, vel orificiorum, osculorumque, quæ intus hiant, dilatatio, sive *ἀναστόμασις* ****. *resis.* Frequentissima omnium putatur *rhexis*, & *diabrosis*. **** Ana-* *resis*; rara *diabrosis*, quæ in phthisi, atque ulceratione pulmonum præcipue contingit. Plerumque tamen acritas humorum non diabrosim, sed *spasmodum* infert, quo vasa contracta æquabilem sanguinis circuitum subvertunt, vehementiusque in liberiora loca eum impellunt, unde, impetu quasi facto distenta, dissiliant, rumpanturque, necesse est. Rarissima demum anastomosis habetur: sed tamen non ita in mulieribus, ac viris, quibus consuetæ evacuationes sanguinis deficient.

§. XXVI.

Causæ præsumptivæ. Remote ad hæmoptysim iter parant corpus procerum; coilum gracile & longum; pectus angustius; mala hujus conformatio, in primis gibbositas, & depressio; tenella & laxa totius corporis, sed in primis pulmonum compages; temperamentum cholericum sanguineum; hereditaria labe; plethora; defectus consuetarum sanguinis exaribus, utero, hæmorrhoidibus evacuationum; polyposæ in vasis pulmonaribus, aut in sinistis cordis sinibus concretiones; eorumdem compressio, infarctus, aut dilatatio præter naturam; viscerum abdominalium obstructions; abdominis arcta constrictio; spasmi; acritates variæ, & præsertim

sertim scorbutica, sive hæ irritent tantum, sive crassum sanguinis resolvant, sive etiam vasa erodant. Potissimum vero ad hæmoptysim pronior est adolescentia, ætasque ab anno duodevigesimo usque ad trigessimum quintum. Hinc HIPPOCRATES scripsit: *Adolescentibus autem sanguinis spuitiones, tabes, febres acuta, morbus comitialis, & alii, sed præcipue ante dicti (a).*

(a) Aphor. 29. Sect. III.

§. XXVII.

Occasionem vero hæmoptysi porrigunt vehementior pectoris, aut pulmonum nisus in attol-^{Preca-}lendis ponderibus, in saltu, cantu, tussi, vociferatione, tiliarum aut tubarum inflatione, in deponenda alvo, aut fœtu edendo; colli, pectoris, aut abdominis nimia coarctatio; aer calidus, & siccus, vel nimium rarus, & levis, uti est in montium cacuminibus, vel frigidior, humidiorve; abusus vini, liquorum quorumcumque fermentatorum, rerumque acrium, & calefacientium; motus corporis concitator in cursu, lucta, lusu, venere; scalarum, & locorum acclivium ascensus; ira, gaudium, aliaque subita animi patheniata graviora.

Prognosis.

§. XXVIII.

Cruenta exspuitio, quæ gingivis, lingua, na-^{Progn-}ribus, gurgulioni, facibus debetur, periculo fe-^{stica.}re vacat; non ita quæ ab œsophago, & ventri-
culo

culo est, si copiosior. Sed de hac alibi (*). Alibi etiam de sputo cruento, quod *pleuritidis* & *peripneumonia* proprium est quodque in morbi declinatione salutem promittit (**). Nec magni æstimanda est levis sanguinis exspuitio, quando e *summo larynge* effertur ob hypocondriorum spasticas contractiones, a quibus sanguis illuc vehementius urgetur, & protruditur.

(*) *Cap. IV. Par. II. hujus Volum. IV. §. 46. §. & 50.*

(**) *Hic. Cap. IV. §§. 105. 116. 117.*

§. XXIX.

*Vera hæmoptysis
semper
periculosa.*

Ceterum vera hæmoptysis nunquam expers discriminis est. Id etiam HIPPOCRATES animadvertit, dicens: *sanguis sursum quidem, qualiscumque fuerit, malus (a)*. Malus quoque niger, & coactus, & porosus (§. XXIV.) quia aneurysmata, aut varices, aut sphacelum significat. In primis magna pericula affert copiosa e pulmonibus sanguinis profusio, quia vel potest hominem illico exanimare, vel nimia ejus copia intera vesiculas, cellulosumque textum, aut bronchia ipsa congesta præfocare, vel cor debito sanguinis influxu orbare, vel etiam mole, aut pondere opprimere, ut subita lethalisque syncope, sive asphyxia subsequatur. Quod si hæc fortè fortuna effugiantur, gravissima saltem ulcera & insanabilia in pulmonibus metuenda sunt, eoque magis, quo corpus impurius est, aut cacochymia, aliove morbo ex pravitate humorum simul laboraverit. Quando phthisis simenda. re jure dixit HIPPOCRATES: *a sanguinis sputo puris sputum, malum (a)*. Id autem verissimum præcipue fit, si febricula etiam accesserit nunquam

quam penitus desinens; quam lentam amphemerinam vocant. Tum enim phthisis in propinquo esse perhibetur.

(a) Aphor. 15. Sect. VII.

§. XXX.

Quæ hæreditario veluti jure in filios, nepotesque propagatur, multo exitiosior est, difficiliorque curatu. Plus etiam periculi habet ea, quæ erupto majore vase, aut ex profundiori loco derivatur, quam que e minoris alicujus vasculi ruptione, aut superiori e loco originem ducit. Illa uberiores sanguinem largitur, hæc parciorem; sic ut copiosior & largior sanguinis exspuitio plus discriminis, parciore & minor minus indicet. In universo gravior, & perniciosior præ reliquis censetur, videturque illa, quam *diabrosis* efficit. In hac ab initio paucus quidem sanguis ejicitur, & falsum saporem exhibet: paulatim vero uberiore rivo profunditur, dilatato scilicet per erosionem vasis osculo. Inveterata, & chronica hæmoptysis, aut phthysi pulmonari superveniens omnem fere medicinam contemnit.

Hæreditaria exitiosior.

Copiosius sputum periculosius etiam.

Item quod diabrosis efficit. Inveteratum malum, aut ulceri pulmonum accedens sine spe est.

§. XXX.

Nihilo tamen minus experientia sæpe demonstravit, a vera hæmoptysi, interdum etiam larga, & recidiva non paucos evadere, quibus mature auxilium feratur, neque grave sit diæta legibus religiose se submittere. Ferendum vero illud esse jubet PLATNERUS primo triduo. Minus quoque negotii facessit hæmoptysis, quæ ab aere raro-

Multi tamen sanantur.

Quæ facilius curatur.

Signa bona, mala.
 rariore, & leviore, aut a suppressis catameniiis, aut alia evacuatione deficiente procedit, quia plerumque per *anastomosim*, aut *diapedesim*, sive exsudationem fieri solet. Minorem quoque metum incutit illa, quæ a clamore, aut motu vehementiore inducta est præ ea, quam *diabrosis* effecerit. Generatim hæmoptysi laborantibus sine febre, & tussi, & dolore leviter conflictari, sputumque ad dies quatuordecim tenuari, spem salutis facit. At intense febricitare, & tussire, aut dolere, sanguinemque recentem semper spueri, ut habemus in *Coacis* (a), minime bonum.

(a) N. 427.

Curatio.

§. XXVII.

V. S.
Quando iteranda V. S.
 Curationem fere eandem exoptat hæmoptysis, ac ea est, quam in capite *de narium hamorrhagia* (a) proposuimus; & si quod interest discrimen, id vel parte affecta, vel a causa, vel a morbo impendente enascitur. Itaque ubi sanguis e pulmonibus cum impetu exscreatur, protinus ejus non parum pro virium, pulsus, ætatis, temperamenti, habitusque ratione e vena detraendum est, idque opportune iterandum, præsertim prosequente hæmoptysi, si homo plenior sit, & caleat, & febricitet. De loco, e quo mitti debeat, non valde plerumque disceptare oportet, dummodo cito mittatur. Multi tamen satius ducunt venas primum inferiores aperire, deinde superiores, & proximās. Neque facile quis a copia sanguinis excreti a vena secunda deterreatur, nec

nec inanita vasa ostendant. Prudenter quidem, sed non timide ad summum hoc præsidii genus deveniendum est, nisi manifesta sanguinis liquatio, raritas, dissolutio, aut corruptio aliter suadeat. Imminuitur enim nimius sanguinis ad pulmones appulsus, & coacervatio, vasaque minus distenta se se contrahere tunc possunt, ut coeant, & glutinentur. In hoc etiam fere tota continetur prophylaxis eorum qui in phthisim ex hæreditaria labe (*) propendent. Neque alia revulsionum genera, quorum sæpius verba fecimus, uti cucurbitulæ, ligaturæ, clysteres omitti debent, ut optato fine potiamur.

*Revel-
lentia.*

(a) Vol. III. cap. XII.

(*) Vid. *Dissert. de ratione venæ sectionis in hæmoptoicis*, quæ exstat in *Adversar. med. pract.* LUDWIGII P. I. p. 145. Item ERNESTI VALENTINI COHAUSENII *Dissertatio de noxa timiditatis in hæmoptyseos curatione*, quæ legi potest in *Act. N. C. T.* I. p. 33.

§. XXXIII.

Interea æger capite, & pectore elevato quasi lecto insidens decumbat, ab omni tum corporis, tum maxime pectoris, atque animi motu abstinere; immo vel ab ipso sermone sibi caveat, & si quid loqui velit, id submissa tantum voce, & brevissimis verbis faciat. In conclavi ad frigidum potius inclinante conquiescat, stragulis levibus corpus cooperiat, neque vestimentis nimirum adstrictis sanguinis circuitum turbet, tussim quanta maxima potest cura, caloremque tam in potu, quam in cibo devitet.

*Decubitus are-
ctus.*

*Quies &
silen-
tium.*

*Regimen
frigidum.*

§. XXXIV.

§. XXXIV.

Intussecus danda ea sunt, quæ cognitis præcipuis causis occurrunt. Nimius sanguinis fervor, & nimia ejusraritas, tenuitasve compescatur, refrænaturque aqua frigida, emulsis ex seminibus farinosis, nitro, absorbentibus terreis, acido aliquo vegetabili saturatis, & demum spiritibus acidis, quos *minerales* vocant. Ex his variæ comparantur remedium formulæ, prout res ægre ejusque gustus exigere videntur. Scire tamen licet, *Acida*, acida plerumque tussim non modo exasperare, sed etiam movere, qua nihil nocentius in hæmoptysi. Quod ubi indidit, quod sæpius vidi, statim ea dimittenda sunt. Evitari vero id incommodi quadantenus potest, si acida, quæ adhibere volumus, diluta, & mucilagineis, oleosisve mitigata dentur, si absorbentibus additis retundantur, atque opii aliquid iis adjiciatur. Celebratur ideo, & jure, ut puto, mixtura ab inventore *Mixtura Sylviana* dicta, quæ habet *Sylvii* aquæ plantaginis uncias sex; aceti distillati unciam semis; coralliorum rubrorum, & terræ sigillata, singulorum drachmam dimidiam; opii grana duo: syrupi de meconio unciam, de qua subinde cochlear dari consuevit. Hujus ope & sanguinis fervor comprimitur, & si quid sanguinis coacti in pulmonaribus vesiculis hæserit, dissolvi creditur; tussis & spasmus sedantur, avertunturque.

§. XXXV.

Sanguinis exspuitio, quam in hypochondriacis (§. XXXVII.) atque hystericeis spasmus immi ventris,

tris, & thoracis non raro inducit, opio præ ceteris, oleosis, emollientibus in alvum injectis, balneis pedum tepidis, aliisque spasmos laxantibus plerumque supprimitur. Inter remedia, quæ ex opio parantur, excellere hic dicuntur laudanum cydoniatum, æthiopis vegetabilis, diascordium FRACASTORII, & pilulæ ad sputum sanguinis DEKERSII, utpote quæ aliqua etiam adstringendi facultate videntur donari. Acritati hominum, si in hanc hæmoptyseos causa cadat, obviam eundum est mucilaginosi, farinaceis, pinguibus, oleosis, & gummi arabico, tragacantha, quæ duo postrema etiam glutinandi vim habent. CLERCUS (a) refert curatam hæmoptysim, quæ a tribus jam annis identidem revertebatur cum tussi ferina, ope remedii, quod constabat ex decocti hordei libris duabus, & uncia una gummi arabici in eodem dissoluti, per aliquod tempus adhibiti. Ab hæmoptysi ab acrite sanguinis genita, in quam adolescens inciderat, cl. medicinæ Professor Bononiensis, cujus per aliquot annos auditor fui, solo, sed liberaliori, & diuturno pulveris gummi arabici usu se convaluisse in suis prælectionibus narrabat, pervenitque ad eam senectam, ad quam paucis datum est pervenire.

Quid
conve-
niat ex-
sputioni
sanguinis
hypochon-
driacæ?

Hæmo-
ptysi ex
acritate
quid?

Observa-
tio.

(a) CLERC *Histoire de l'homme malade*. T. 2. p. 36.

§. XXXVI.

Nulla in morbo magis, quam in hæmoptysi periculi magnitudo, metusque cum ægrotantis, tum assidentium cogit sæpissime medicos vel invitos ad *adstringentia* properare. Verum hæc, si *adstringentia* talia fuerint, vel nullo modo videntur ad

vasa disrupta, aut quacumque alia ratione ad aperta pertingere, vel si penetraverint, nequaquam tuta esse; quod ab iis congestiones, tubercula, vomicae, & demum phthisis gigni possunt.

*Animad-
versio.*

Eorum enim vim tenerrima, irritabilisque textura ferre nequit, quin vasa corrugentur, spasticas contractione subeant, liberumque sanguinis circuitui iter praepe-
diant: Quamobrem cl. COHAU-
SENIUS post complures alias artis scientia, atque usu percelebres prudentissime admonet, ne ad ea nimis propere, & nimis temere (a) confugiatur.

(a) *Dissert. citat.*

§. XXXVII.

*Adstrin-
gentia
quædam
passim
laudata.*

Attamen quædam, ubi sistendi sanguinis tem-
pus videatur, hoc nomine celebrari universim so-
lent. In his succus urticae, praesentim non pun-
gentis, sive, ut ajunt, mortuae, plantaginis, cou-
solidae, atque hædera terrestris primas tenet, cu-
jus aliquot unciae in diem propinantur. Adstrin-
gant verò hujusmodi succi, aut resolvantur, & tem-
perant, similique alio modo agant, dubitant non
nulli. Fungus pariter meliten-
sis adstringendi lau-
de clarissimum est, diciturque a quibusdam non
temere credulis viris, qui ejus effecta in sangui-
nem experimentis indagarent, nec tamen ausi
sunt jactatam ubique ejus facultatem denegare,
dum venarum oscula connectit, & mutuo appli-
cat, sanguinem in eo statu, in quo erat, intac-
tum, integrumque omnino (a) relinquere.
Quod sane, ni fallor, argumento est, non esse
adhuc ejus sanguinis sistendi facultatem satis fir-
mis innixam observationibus. Sanguinem spuen-
tibus

*Fungus
Meliten-
sis.*

tibus dabat ALEXANDER VRALLIANUS in singu-^{Hæmatites.}
 los dies lapides hæmatitis scrupula quatuor, non
 modo ut sanguinis sputum præsens comprimeret,
 sed etiam futurum averteret A GESNERO, ab
 ERASTO, CRATONE, RIVERO, ETTMULLERO,
 aliisque extollitur quam maxime *Electuarium ad*<sup>Electua-
rium</sup>
sputum sanguinis HÆLIDÆI PADUANI (a), in<sup>HÆLI-
DÆI</sup>
 quo tamen plus eminet vis anodyna, & tussim<sup>PA-
DUAN-</sup>
 sedans, quam adstringens. Si quid tamen in eo^{NI.}
 est, quod minus quibusdam probandum videtur,
 est plane suspecta seminum hyosciami virtus, qua
 cerebrum turbant, stuporemque, immo interdum
 etiam furorem inducere possunt. Ab aliquot an-
 nis ad omnes hæmorrhagias adhiberi cæpta est,
 magnisque laudibus efferri aqua quædam vulne-
 raria, quæ a JULIANO LANDIO pharmacopola Ro-
 mano venditur. Apud Mediolanenses tanti fit<sup>Aqua
vulneraria-
LANDII.</sup>
 ejusmodi, ut vocant, specificum, ut in quavis
 hæmorrhagia tam intrinsecus, quam extrinsecus
 magna confidentia usurpetur; sed precipue in
 hæmoptysi ipsa. Universim Clinici nostrates te-
 stantur, remedium istud miros præstare effectus,
 sic ut nunquam ejus usum in hæmorrhagiarum
 curatione omittant. Experientia, fateor, plus
 ponderi habet, quam quævis probabilis mentis
 ratio. Verum quam difficile est ipsum experimen-
 tum! Quantum prudentiæ, sagacitatis, cautela-
 rum, & solertiæ requiritur in recte faciendis pe-
 riculis, quanto mentis acumine, quanta judicii
 æquitate opus est in causarum effectibus digno
 scendis, distinguendisque ab aliis, quos aliæ in-
 terjectæ causæ ediderunt, ne in errorem rapia-
 mur nostraque experimenta nos ipsos decipiant!
 Ne quid vero dissimulem, aquæ vulnerariæ ro-
 manæ composito (**) plane est ejusmodi, ut si

*Animad-
versio de
difficul-
tate re-
cte, pe-
ricula,
insti-
tuendi.*

Aqua vulneraria quis vires physicas, medicasque singulorum omnium ingredientium noverit, teneatque probe, magis, quid chimica enchiresis in ea prestare possit, facile ejus laudibus, vribusque adstringentibus diffidere omnino debeat. Immo si quid enchiresis chymica adeo repetita faceret, impertiretque liquori distillato plantarum, saliumque facultates; aqua ista tantum abesset ut in hæmoptysi prodesset, ut potius noceret.

(a) *Comm. Accad. Bon. T. 1. p. 158.*

* *Electuarium ad sputum Sanguinis HÆLIDÆI PADUANI.*

℞. *Semin. Hyosciami, papav. albi una drachm. X. Terræ sigillat., Corallior. rubror. an. drachm. V. Sacchari rosati antiqui q. s. M. f. c. f. q. Syrup. rosar. simplic. electuarium, de quo detur drachma una bis in die.*

** *Aqua vulneraria Landii, sive Romana.*

℞. *Succ. rec. Origani, saniculæ, betonicæ, verbenæ, sedi, sive sempervivi, pimpinellæ, millefolii ana unc. VI. Succ. Mari unc. III. Sal. Alkali, Gemm. an. unc. VI. Cremor. Tart. pulv. unc. IV. Aceti stillati lib. I., in quo solv. aloes unc. I. cum dimidia.*

In succo Betonicæ solvatur sal gemma. In succo Verbenæ, & Millefolii sal Alkali. In succo Pimpinellæ Cremor Tartari.

Omnia ponantur in Retorta, & digerantur per dies tres, dein distilla S. A.

Caput mort. pulverizetur in mortario, & supereffundatur distillatum, denuo ponatur in digestionem per dies tres, & distilletur ut supra. Replicetur pro tertia vice digestio, & distillatio, & liquor a tertia distillatione obtentus servetur in vasis bene obsignatis. Usus: in sputo sanguinis datur cochlear unum singulis ternis horis; interdum sufficit cochlear unum mane, & vesperi. Sed in vulneribus adhibetur frequentius, spleniis aqua ista

ista imbutis, aut injectione ter quater in die, abluta prius parte sauciata quavis vice per vinum calidum.

§. XXXVIII.

Tutiora, & simul usu, & medicorum consensu probata habentur saccharum rosatum, conserva rosarum rubrarum antiqua, syrupus de symphytho majore, de rosis siccis, mala cotonea, & ex his miva parata. Cortex quoque peruvianus a MORTONO primum, deinde a quam plurimis aliis ut præstantissimum remedium commendatur, nec immerito. Ab eo omnem prope virtutem, & laudem mutuatur usitatissimum *Electuarium Peruvianum adstringens FULLERI* *, quod tamen, ut & reliqua tonica, & adstringentia, in usum non vocari debet, nisi vasis per sanguinis missionem satis depletis, resectoque febris, si est, impetu. Laudantur etiam a non paucis tincturæ Catechu, lapidis hæmatitis, & coralliorum rubrorum HELVETII. THOMAS DICKSON (a) nitrum parvis, & crebro repetitis dosibus ad coercendam hæmoptoen, aliasque interdum hæmorrhagias ut certum remedium prædicat; & quanquam conserva de rosis rubris, & spermate ceti exceptum adhibeat, tamen soli nitro hosce salubres effectus tribuendos existimat. Anodynum, refrigerans, ac compescens ipse reputat. Pace vero auctoris, nitro sæpe tussim excitari vidi, qua nihil nocentius in hæmoptoe. Immo interdum post diuturnum, largumque ejus usum acritate sua, quæ viribus vitæ non subigitur, hæmoptysim ipsam induxisse visum est.

Probabilia Saccharum rosatum, syrupus de symphytho majore.

Cortex peruvianus. Electuarium FULLERI.

Tinctura Catechu. Hamatidis coralliorum. Nitrum a DICKSONO commendatum.

Animadversio Auctoris de noxiis nitri effectibus in hæmoptysi.

* *Electuarium FULLERI.*

R. Cortic. peruvian. pulver. unc. I. Balsam. Tolu-
C 3 *tan.*

tan., *Terræ Japonicæ pulv. una drach. I. Syr. de Symphyth. Boylei q. s. M. f. Elect. quod in decem part. æquales dividendum est, ut binæ, vel tres intra diem sumantur, & superbibatur haustus aquæ idonæ.*
 (a) Vid. LUDWIG. *Comment. T. 18. P. 3. p. 399.*

§. XXXIX.

*Aqua
gelida
usus.*

Quod si evacuatione generales, aliaque præstidia sanguinis sputum nequaquam inhibeant, aut tanta sanguinis copia erumpentis sit, ut citissime comprimi postulent, nihil aliud superest, quam ad aquæ frigidæ potum confestim procedere. In hoc summa salutis spes cantineatur, dummodo inflammationis signa absint, neque complicata sit hæmoptysis cum vetere aliquo infarctu, aut alio vicio pulmonum, quibus in casibus nec adeo tutum est remedium, nec adeo certum ejusdem emolumentum. De ejus mira efficacitate in hæmoptysi, & quocunque sanguinis profluvio peculiarem dissertationem vulgavit Romæ anno 1756. IGNATIUS GERVASIUS a Monte Falisco *, sed ante eum alii etiam, & præsertim MARTINUS GHISIUS (a) ejus laudes experimentis comprobarunt. Ab aqua simplici naturaliter frigida inchoandum est, deinde ad frigidissimam, & nivatam transseundum. Non nulli quovis horæ quadrante scyphum hauriendum jubent. Ejus singulis semihoris octo, vel decem uncias præbere soleo, excluso quocunque alio alimento, continuarique ejusmodi potum suadeo die, noctuque ad aliquot dies, interdum ad hebdomadam, aut certe donec sanguinis sputum cessaverit. Postea paullatim imminui ejusmodi aquæ potus debet, & aliquid tenuioris alimenti concedi licet, de quo regimine consulantur LANZANIUS (b), CIRILLIUS (c) &

*Methodus
utendi.*

VALLISNERIUS (*d*) alibi opportune a nobis nominati, ubi de *diata aquea in februm curatione* locuti sumus. Aquam frigidam tam intrinsecus datam, quam extrinsecus brachiis, & poplitibus per linthea eadem madefacta impositam feliciter adhibuit hoc in gravissimo morbo nuperior scriptor MERTENSIVS (*e*). Addit autem idem auctor præclarus, ea non proficiente, se amplum vesicatorium intra scapulas admoveere solitum esse, hujusque remedii præstantiam tam in sedanda illico tussi, quam in sanguinis sputo supprimendo quatuor adductis observationibus illustrat. Tentatum id pluries a me est in contumaciore, & recidiva hæmoptysi, sed non ita prospere, ut MERTENSIO, res cessit.

Vesicatorium.

* IGNATIUS GERVASIUS *a Monte Falisco Medici Romani de usu frigida in hæmoptysi, & quocumque sanguinis profluvio mechanico physica dissertatio. Romæ 1756. apud Zempel in 4. Vid. quoque ORTESCHI Giornale di Medic. T. 1. n. 34. ann. 1763. p. 270. & SWIETEN §. 1200.*

(*a*) *Lettere med. Lett. 1. p. 22.* (*b*) *Vero metodo di servirsi dell' acqua fredda ec.* (*c*) *De frigida in febr. usu in not. ad ETIM* (*d*) *dell' uso, ed abuso delle bevande, e bagni freddi ec.*

(*e*) *Observ. med. P. 3. cap. 2. Vindon. 1778.*

§. XL.

Postquam sanguinis sputum jam desit omnino, omne prope auxilium in abstinencia, quiete, & diætetico regimine positum est. Inter remedia vero plurimum prodesse solet lac in primis asinum, aut lac desloratum, aut si hoc non feratur, aut acescat, serum lactis dulce HOFFMANNI, quod nunquam acescit, & ab ejus inventore

Curatio post sanguinem cohibitum.

persape præscribatur, vel jura ranarum, can-
 crorum fluviatilium, vel avenæ, vel diætæ ave-
 nacea, item cremor hordei, oryzæ, & similia.
 Diluta etiam aquosa, nec valde calentia veroni-
 cæ, chærophylli, scabiosæ, hæredæ terrestris, flo-
 rum bellidis minoris, arnicæ egregie resistentis
 sanguinis grumos resolvunt, & blande ipsam pul-
 monum texturam; præsertim additis rosis rubris,
 confirmant. Lacte ex vacca, quæ fursure aqua
 subacta, atque urtica urenti alebatur, hæmopty-
 ficos plures quam viginti perfanatos a CLERCO
 (a) accepimus.

(a) *Hist. de l'Homme. malad. T. 2. p. 31.*

§. XLI.

Aeris Sed præ omnibus aeris mutatio imperanda est.
mutatio. Utilissima etiam censetur vectio, equitatio, pru-
 dentis tamen medici consilio instituenda; non
 enim cuilibet, nec cuilibet casui opportuna est.
Exerci- Raro etiam locum habet *balsamica*, in primis
tatio qua-
nam? acriora, quidquid aliis visum sit, & videatur.
Quid de Quod ad victum attinet, conveniunt pulticulæ
balsami-
mici? ex farina hordei, oryzæ, avenæ, sagou, frumen-
Victus. to turcico, aut saracenico; vegetabilia intubacea.
 & mollia, galatinæ pedum vituli; & cornucer-
 vi succo citrei, aut medici mali acidulatæ; ova
 recentia, & sorbilia; fructus horæi tam recen-
 tes, quam siccati, atque alia hujus generis. E-
 xulent vero carnes graviores, exceptis, quæ ex
 pullis gallinaceis, præsertim lacte enutritis, aut
 ex piscibus fluviatilibus, & tenerioribus sumun-
 tur; itemque vinum exulet, atque quodcunque
 acre, & calefaciens. Alyus ut semper aperta, &
 laxa

laxa servetur, curandum est; & quovis tertio ut plurimum mense imminuenda per venæ sectionem sanguinis copia, prout ætas, temperamentum; regio, & reliqua postulabunt.

V. S.
pophy-
lætica.



C A P U T III.

DE PHTHISI PULMONARI, PRÆMISSA
PHTHISEOS, SIVE TABIS
UNIVERSÆ CUM EJUS
DIFFERENTIIS EXPLICATIONE.

§. XLII.

Generatim *φθίσις* *, Latinis *tabes*, quamcumque lentam, diuturnamque corporis extenuationem nulla habita causæ, originisque rationem comprehendit: *lentam* inquam, & *diuturnam*, quam ab ea macie fortuita & cito desinente, que morbum aliquem acutum, aut immodicam aliquam excretionem, aut insolitam cibi abstinentiam subsequitur, facile distinguendam esse vides. De *phthisi* igitur sive *tabe* primum, deinde de ea speciatim, quæ *pulmonibus* quomodocunque vitiatis succedit, nunc breviter dicere operæ pretium ducimus; nam etsi non omnis corporis marcor ad hanc pectoris sedem attineat, ut ad morbos hujus classis referendus sit, tamen quia in utroque phthiseos genere symptoma, quod primum in oculos incurrit, est ipsa macies, uti commune utriusque phænomenon; idcirco non alienum putamus de utroque hic morbo sermonem habere.

* *Phthisi*,
genera-
tum.

De ea
primum
deinde
de pul-
monari.

§. XLIII.

§. XLIII.

Itaque omnis phthisis universa accepta duplici
Duplici modo con- siderari potest, vel ut corporis extenua-
siderari tio a toto ejus habitu, vel ab alicujus visceris
potest vitio, infarctu, abscessu; ulcere proficiscens. Quæ
phthisis. a toto habitu est, nec ab ullius visceris læsione
 fit vocatur græca, & peculiari voce *ἀρροπία* *,
 * *Atro-* quæ plerumque sine febre, & sine calore hecti-
phia. co, & sine tussi est, potestque triplici ratione
 oriri, videlicet vel ex alimenti defectu, vel ex
 ejusdem depravatione, vel e partium nutrienda-
 rum mala constitutione. (*)

Quenam (*) Præter hanc *atrophiā* totius corporis est
atrophia, etiam altera, quæ in aliquam tantum partem ca-
dicta ari- dit. Hæc posterior, si magna adeo sit, ut mem-
dura? brum arefcat, dicitur etiam *aridura*.

§. XLIV.

Quotmo- Alimentum deficiet, si a stomaco nullo mo-
dis ali- do, vel non ea, quæ opus est, copia recipiatur,
mentum uti in læsa deglutiendi facultate, in jejunio, in
deficiat? fame, atque inedia contingit; vel si materia nu-
 triendo corpori non apta assumatur; vel in san-
 guinem non penetrare possit ob vias occlusas,
 uti in pylori, aut intestinorum, aut mecenterii,
 aut telæ cellularis, vasorumque lymphaticorum
 obstructione, aut læsa actione fieri notum est
 (quod antepenultimum vitii genus pueros maxi-
 me, & infantes corripit); vel si ad sanguinem
 pervenerit, corpori nutriendo nequaquam impen-
 datur, sed ejus fiat jactura per aliquam sangui-
 nis

nis ipsius, aut cujuslibet alius liquoris immodicam effusionem.

§. XLV.

Ex nimia autem sanguinis, aliorumque liquorum effusione corpus contabescit in hæmorrhagis, in ptyalismo, in lactatione, si crebra nimis seminis emissionem tam spontanea, quam artificiosa, in gonorrhœa, in fluore albo, in alvi, aut urinæ profluviiis, in sudoribus, in ulceribus diu manantibus, in hydrope, præsertim ascitico, & in quibuscumque effusionibus, aut evacuationibus, si quæ sunt aliæ, etiam humorum, quos excrementitios, inutilesque vocant; cum fieri non possit, quin semper aliquid boni, utilisque succi, quo ali corpus debet, cum iis simul dependatur. Huc proprie referri debet *tabes dorsalis* secundi libri *de morbis* (a), qui inter hippocratica scripta reperitur; nam in eam incidunt novi sponsi ex nimia venere, & nimia idcirco liquoris seminalis jactura, & quoniam hinc medulla spinalis videtur detrimentum capere, a dorso nomen ei tributum est. En verba ipsa, quibus morbus ibi adamussim describitur: *Dorsalis tabe a medulla fit. Corripit autem maxime recentes sponso, & veneri deditos. Sunt autem sine febre, & bene cibum capiunt, ac consumuntur. Et, si interroges ita affectum, dicet sibi superne de capite in spinam velut formicas descendere videri: & ubi mingit, aut ventrem exonerat, prodit ipsi genitale semen multum, ac liquidum, & genitura in utero non manet, & in somnis semen profundit, sive dormiat cum uxore, sive non. Et cum iter fecerit, aut concurrerit, tum alias, tum ad*

*Quibus
evacua-
tionibus
corpus
contabe-
scat.*

*Tabes
dorsalis
primæ.*

accli-

acclivem locum, anhelatio, & debilitas ipsum corripit, & capitis gravitas, & aures sonant. Hunc temporis progressu, ubi febres fortes ipsum corripuerint; perdunt febres lipyria.

(a) N. 49.

§. XLVI.

*Tabes
dorsalis
secunda.*

Quandoquidem vero de *tabe dorsali* sermo incidit, non prætermittam alias ejusdem generis veluti species recensere, de quibus hippocratica oracula, aut alii scriptores medendi usu consummatissimi loquuntur. Et primum reperio in libro de *internis affectionibus* (a) aliam *tabem dorsalem*, quæ quoniam etiam immodicæ veneri interdum ortum debet, opportune ipsissimis verbis, quibus ibi, exponenda nobis esse videtur: *Resiccatur medulla spinalis maxime cum venule ad medullam tendentes fuerint obturate, itemque ex cerebro accessus. Propter corporis autem affectionem hæc patitur, & agrotat. Resiccatur etiam a venere. Hæc igitur patitur: dolor acutus incidit ipsi in caput, & in collum, & lumbos, & in lumborum musculos, crurum, ut aliquando flectere non possit. Et stercus non secedit, sed sistitur. Et urinae difficultate vexatur. Hic in principio quidem morbi quietius degit. Quanto autem magis tempus morbo prolongatur, tanto magis omnia dolent. Et cum velut ab aqua inter cutem tument, & ulcera e lumbis emergunt; & alia quidem sanescunt, alia vero nascuntur. Hæc tabes parum videtur a priore (§. XLV.) discrepare. Attamen in illa languere totum genus nervosum, verisimile est; in hæc (§. XLVI.) irri-*

irritari etiam, convelli, & demum resolvi. In illa humorum utilium, alibiliumque inopia; in hac etiam depravata natura, & stagnatio, & solidarum partium consequens atonia discrimen faciunt.

(a) N. 13. vers. fin.

§. XLVI.

Aliam *tabis dorsalis* speciem, quæ ad hunc ^{*Tabes dorsalis*} locum pertinet, commemorat WILLISIUS (a). In ^{*tertia*} hac non quidem semen, verum ichor, sive putrilago quædam e genitalibus profunditur. Quod profluvium quando ingens, & continuum est, sæpe totius corporis vires infringit, & materiam nutritiam subtrahendo, & prodige ablegando, *atrophiam*, sive *contabescentiam* inducit. Hoc in ^{*Atrophia*} primis liquet in gonorrhœa, & fluore albo muliebri, sive affectus hi per impurum concubitum, aut immodicam venerem, sive ob plagam, & contusionem, aut nisum vehementiorem, aliamque noxam lumbis inflictam oboriantur. ^{*vocatur.*}

(a) *Pharmac. Ration. P. 2. Cap. V. de tab. dorsali.*

§. XLVIII.

Sed eo revertamur, unde *tabis dorsalis* consideratio nos aduxit. Paulo ante (§§. XLIV. XLV.) quot modis alimentum deficiat, indicavimus. Nunc videndum, qua ratione ejus depravatio contingat. Depravari igitur potest vel quod male, atque imperfecte in ventriculo concoquitur, aut non bene in intestinis chyli naturam

^{*Qui alimentum depravari possit?*}

ram induit, non defæcatur, nec sanis humoribus rite assimilatur; vel quod investum in sanguinem crudos, viscidos, acidos, sallos, acres, alkalescentes, aut aliter a naturali crasi, & bonitate devios offendit, ab iisque contaminatur; ut multis in morbis, & præsertim post febres male curatas, imperfecteque solutas, quæ interdum in hecticas abeunt, non raro evenit.

§. XLIX.

*Prava
partium
constitu-
tio.*

Restat, ut malam partium constitutionem (§. XLIII.) contemplemur, qua interdum efficitur, ut alimentum nec præparetur satis ad nutritionem, nec probe in animale naturam convertatur, nec parcibus alendis rite apponatur, aut apositum iis non adhæreat, nec retineatur, ut par esset. Partes autem malæ constitutæ dicuntur, quando earum tono deperdito languent, & veluti enerves torpescunt. Quod cum magna, & potissima parte a nervei succi inopia, & nervorumque laxitate, atque inertia ut plurimum eveniat, sic ut partes propemodum resolvantur;

*Atrophia
nervosa
MORTO-
NI.*

ideo hoc phthiseos, sive tabis genus *atrophia nervosa* a MORTONO appellatur; quo nomine discriminatur ab ea tabe, a toto pariter habitu orta

*Atrophia
ab inani-
tione ejus-
dem.*

(§. XLV.), quam ipse simpliciter *atrophiam ab inanitione* vocare melius existimavit. Possunt vero non solum enervari partes, ut dictum est, verum etiam contrario vitio affici. Interdum enim fibræ omnes, vasa in primis, & universa tela cellulosa ita paulatim contrahuntur, rigent, & consolidantur, ut alibili succo nec permeari, neque allui, neque extendi, ac nutriti queant. Quo in casu corpus exsuccum, & atrophicum

eva-

evadat. Id mali genus hominibus præsertim sic- *Phthisis,*
 cioris temperamenti, & calidæ constitutionis ac- *sive ta-*
 cidit. Quando vero ex hac causa emaciantur se- *bes seni-*
 nes, id quod iis frequentissimum est, *tabes se-*
nilis proprie vocanda esset, quanquam id nomi-
 nis tribui soleat senili extenuationi, quæ tussi
 catarrhali diuturnæ, & copiosiori sputo succedit;
 dum alii hanc *phthisim pulmonarem pituitosam* *Pthisa*
 rectius vocandam putant. *pituito-*
sa.

§. L.

Ad *atrophiam nervosam* (§. XLIX.) vulgo
 refertur *tabes tertia*, quæ in libro *de internis* *Tabes*
effectiionibus (a), HIPPOCRATIS discipulis ab HAL. *quædam*
 LERO adscripto, exponitur. Sed multo plures cum *falso,*
 WILLISIO eam *tabis dorsalis* speciem esse ajunt: *dorsalis*
habita.
 quo autem jure, non satis assequor. Nam in
 tota illius descriptione nihil sane occurrit legenti,
 quod medullam spinalem, aut dorsum, aut,
 vertebralem columnam affici, & laborare indi-
 cet. Non ideo quod priscus ille scriptor, qui-
 cunque demum fuerit, in causis, aut sedibus
 morborum assignandis non hercle semper felicis-
 simum, medullam spinalem in ista tabe sanguine
 oppleri arbitratur, protinus, & quodam cæco
 impetu in ejus sententiam est descendendum?
 At, inquires, MARINELLIUS in *commentariis* ani-
 madvertit, hanc sententiam confirmari, clarius-
 que exponi ab HIPPOCRATE libro *de locis in ho-*
mine (b) hisce verbis: *cum in medullam fluxio* *MARI-*
contigerit, tabes occulta, ac inconspicua oboritur. *NELLII*
Quo ex loco nihil aliud eruitur, nisi quam HIP- *opinio re-*
POCRATEM credidisse tabem interdum a fluxione *fertur.*
 in medullam spinalem fieri, quod alibi etiam
 aper-

apertius docuit, non vero confirmare voluisse id, quod in libro *de internis affectionibus* supra citato scriptum fuit; cum exploratissimum sit, neque illius libri auctorem esse HIPPOCRATEM, neque ibi de tabe, quæ *occulta, ac inconspicua* dici possit, mentionem ullam fieri. Nam eo in loco verba fiunt ab anonymo, atque incerto auctore de tabe quadam, in qua homo niger statim, & subtumidus evadit, & partes, quæ sub oculis sunt, pallidas præsefert, & vasa, quæ in toto corpore sunt, partim pallida, & distenta, partim valde rubra exhibet spectantibus, & manifesta. Exspuit quædam subalbida, & ita difficulter, ut interdum se suffocari sentiat: immo sub ipso extussiendi conatu bilem acervatim evomit, aliquando pituitam, sæpe etiam cibos, ubi comederit; nec sublevatur, nisi post alteram vomitionem, & per brevissimum tantum tempus, quoniam cito in easdem ærumnas delabitur. Voce etiam acutior est, quam cum sanus esset, *febre, rigoribus, & sudoribus conficitur, & sic per annos novem languescit, & rari sunt, qui ex hoc morbo evadunt*. Quæcunque autem sit huiusmodi affectio, an *occulta, ac inconspicua*? Nonne etiam pulmo in ea manifesto laborat?

(a) N. 13. *sub initium.* (b) N. 18.

§. LI.

Neque quidquam proficit, mea quidem sententia, idem MARINELLIUS, dum pergit ex eodem libro *de locis in homine* (a) anniti ostendit, HIPPOCRATEM reapse *tabem dorsalem* ibi intellexisse, quia scripsit *agro lumbos dolere, & ante-*

MARI-
NELLIUS
magis ma-
gisque re-
fellitur.

anteriores corporis partes, & vacuas ipsi videri. Nam hæc ferè communia esse possunt, nec satis perspicue *tabem dorsalem* significant, multoque minus eam, quam auctor libri *de internis affectionibus* (§. L.) expressit: nisi quamcunque tamen *a toto habitu* velis *dorsalem* appellare, quod plane absurdum dixerim. Neque demum adduci possumus, ut RAULINIO (*b*) assentiamur, cui *ner-
vosa tabes* eadem omnino cum *dorsalibus* vi-
dentur; ex eo fortasse quod ex locis veterum scriptorum, quæ valde obscura, & implexa invenit, nihil certi hac super re statui posse ipse deprehenderet; nisi *species* cum *genere* confundere lubeat.

RAULINIO
NI ope-
nio re-
probatur?

(*a*) N. 29. (*b*) *Observat. de Medecin. P. 1. Remarq. sur la Phthisie en general. p. 2.*

§. LII.

Verius ad *tabem dorsalem* spectat alia species; quam ipsemet WILLISIUS (*a*) memorat, longe ab illa, quam ex libro *internis affectionibus* (§. L.) adduxit diversam, atque ab aliis speciebus supra descriptis (§. XLV. XLVI. XLVII.) distinguendam. Vidit enim quosdam dolore circa lumbos, immo interdum in toto dorso miserrime vexatos, qui cum aliquandiu ita excrutiati essent, postea gibbi, aut claudi evaserunt, ac tandem toto corpore, excepto capite, contabuerunt, quemadmodum *rachitide* affectis contingit. Hujus morbi causam in hoc consistere ipse opinatur, quod humor, sive materia quædam morbida cum succo nerveo per medullam spinalem descendens in nervorum vertebraliū origines, aut truncos influat, eorumque fibris primum irritatis dolorem

*Tabes
dorsalis
quarta.*

*Rachitide
idem
plane re-
fert.*

continuum excitet, deinde quibusdam etiam compressis, aut intime labefactatis respondentes musculares fibræ resolvantur, dum interim antagoniste validius se se contrahentes vertebrae, quibus affiguntur, e loco dimovent, trahunt, & aliorum distorguent ac demum nervis, fibrisque muscularibus aut resolutis, aut debilitatis non modo ægri claudicent, verum etiam membra, totumque corpus langueat, macieque exsiccet, quod; si sola ligamenta ab alieno humore laxarentur, non contingeret. Neque id pueris tantum, atque adolescentibus infestum; ac familiare malum esse credas, verum etiam ætate jam proVectis. Nam egomet ipse plures vidi, quibus adulta in ætate hoc affectu correptis vertebrae intumuerant; e sua sede prociderant; & cariem contraxerant. Quare facile inducor, ut credam non modo nerveum succum, sed etiam osseum, & synoviam ipsam, lymphamque nutriendis ligamentis dicatam hoc in morbo interdum alterari, corrumpique.

(a) L. c.

§. LIII.

Alia Tabes a toto habitu; vel ad nervosas atrophias spectantes. Non hic vero finem habet *tabes*, sine *phthisi* *a toto habitu corporis* (§. XLIII.) permanentes, aut ad *atrophias nervosas* (§. XLIX.) spectantes. Nam sunt etiam quædam aliæ, quæ a *mærore*, a *nostalgia*, ab *amore*, aliisque *animi ægritudinibus* ab *affectione hypochondriaca*, aut *hysterica*, a *scorbuto*, a *lue venerea*, ab *arthritide* profluunt, de quibus utpote magna ex parte secundariis singillatim differere vetat instituti ratio,

ratio, temporisque prefinita brevitās. Referri autem fere omnes possunt vel ad imminutam nervorum vim, vel ad fibrarum omnium siccitatem, vel ad depravatam, vitiatamque humorum naturam, aut diribitionem. Cujusmodi *atrophia at-* *Atrophia quodammodo habitu* luculentissimum exemplum existat apud *a toto habitu.* DELISLIUM (*a*), quod non admodum infrequens est observatu clinicem exercentibus. In hac igitur specie contabescit universum corpus sine fe- *Ejus signa, sive ejus descriptio.* bri, sine tussi, sine ulla spirandi difficultate. Quicunque in hanc tabem inciderint, cibum præter modum averfantur? numquam famis sensum percipiunt, de ingenti femorum, & crurum imbecillitate queruntur, atque evidenter macie in dies aucta deliquescunt. Alvo pigra, adstrictaque sunt, ut enematibus eam solvere cogantur. Lingua habent muco viscido & crasso obductam, & sæpe siccam. Interius calore quodam assiduo uruntur, quem nullo modo temperare possunt. Urinas emittunt nunc rubras, nunc pallidas, nunc admodum paucas, & saturatissimo colore præditas. Stomachi regio, etsi nec renititur, nec tumet, pressa tamen acutissimo dolore afficitur. Musculi abdominis sæpe præter modum tenduntur. Nocte, dieque pertinacissime evigilant, nec somno recreantur. Facile pallent, & livent, & pustulis quandoque, & variis eam scædatam referunt. Oculos ut plurimum lippitudine, & levis palpebras glutinantibus sordidos exhibent, cutinque siccam, aridam, & minime perspirantem. Pulsus deprehenduntur rari, & aliquanto dariores. Quæ omnia ostendere videntur bilem in his parcius secerni, viscidam, amurcosam, atque acrem circa præcordia coacervari: sanguinem acritatibus scatere, succo blando, & nutritio ca-

Quinam
si obnoxii
ex DELI-
SLIO?

rere, atque universum solidarum partium systema acrescere, & exsiccare. Huic potissimum malo obnoxios esse qui alimentis calefacientibus, acribus, aromaticis, potuque vini; & liquorum ardentium abutuntur, idem laudatus DELISLIUS observavit. Qui hoc morbo tenentur, si tempestive opem medicam exquirunt, saepe restituntur in pristinam valetudinem.

(a) *Tratie de la phthisie pulmon. charp. 14. p. 156. & pag. 164.*

§. LIV.

Phthises
particu-
lares.

A pecu-
liarium
viscerum
labe de-
nomina-
tio earum
est.

Actenus de phthisi ab universo corporis habitu. Reliquum est, ut alias nunc phthises enumerem, qua peculiare alicujus partis vitium gignit, uti tumores, abscessus, & ulcera. Nihil vero antiquius, frequentiusque est, quam a viscerum labe, puta hepatis, ventriculi, renum, lineis, pancreatis, mesenterii, intestinorum, uteri, vesicæ obstructione, infarctu scirrho, suppuratione, ulcere phthisim *hepaticam*, *stomacalem*, *renalem*, *splenicam*, *pancreaticam*, *mesentericam*, *intestinalem*, *uterinam*, *cysticam*, aliasque hujusmodi pronasci. Hæc enim viscera vitio aliquo correpta, & suis functionibus inepta reddita vel succum alibilem non rite elaborant, vel ichore, vel pus, & saniem, vel putridam quamcunque labem cum universo sanguinis fluento communicant, quo alendo corpori impar fiat, vel sanos, utilesque humores profundentia corpus ipsum rore debito sensim orbant, quare macrescit, & consumitur. Sed præ ceteris.

PHTHISIS PULMONARIS.

Pulmones vitium istud incurrunt, frequentissimamque phthiseos causam in se recondunt. Quæ igitur ex eorum culpa tabes corpus deterit, consumitque, *pulmonaris* rite, & proprie nominatur, ut ab aliis distinguatur; immo tanta est ejus etiam apud vulgum cognitio, ut simplici phthiseos nomine non alia sæpe intelligatur, quam ea, cujus sedes in pulmonibus est. *Vera* autem *phthisis pulmonaris*, quemadmodum communior fert sententia (a), est ea totius corporis lenta consumptio, quæ pulmonum ulcus assiduamque inde ortam febrisulam consequitur. Quando vero ex quacunque alia pulmonum affectione, aut labe corpus contabescit, uti quando atonia ingenti, flacciditate, marcore (*), tuberculis (**), strumis, scirrhis, infarctibus, calculis, aliisque lapideis concretionibus, vomitis, aut empyemate thoracis, similique alio vitio pulmones laborant, & contaminantur, tunc quoque *phthisim pulmonarem* adesse cum FRACASTORIO (b), & WILLESIO (c) credimus, non quidem illam veram, & exquisitam, quam, definivimus, sed quodammodo notham, atque imperfectam. Nam etsi in hac deficiat vera pulmonum exulceratio, effecta tamen, & symptomata adeo veræ phthisi sunt consentanea, ut quam maxime eam æmulentur, aut saltem expeditissimum in eam, quod JUNKERUS etiam (d) concedit, faciat transitum.

A pul-
monum
labe ejus
caussa.

Definitio
phthiseos
pulmonaris vera.

Phthisis
nothæ
species.

Hæc in
veram
transit
facile.

(a) GALEN. *Defin. med.* n. 260. 261. ARETÆUS *l. c. l.* 8. p. 62. AETIUS *Tetrab.* 2. *serm.* 4. c. 67. FERNEL. *Patholog.* l. 5. c. 10. p. 109. CAROL. PISO *de cognosc. & curand. morb.* l. 2. c. 10. BOERHAAV. §.

1196. VAN-SWIET. *ib. in commentar. MORTON. Phthi-
siolog. l. 2. de Phthisi pulmon. p. 26. DUPRE' DE
LISLE de la Phthisie pulmon. cap. 1. pag. 5. &c.*

*Purulen-
ti, copio-
sique
spati ex-
cretio ab-
sque ul-
cere pul-
monum.*

(*) Tanta interdum est pulmonum laxitas, sive atonia, ut non solum ad eos ingens humorum vis confluat, perque vasa exhalantia, & fibrarum interstitia, vasorumque poros inconspicuos exsudent, ac sputorum copia, & frequentia totum pene corpus exhauriant, verum etiam pus ipsum ex universo sanguine peculiarem ob quamdam ejus diathesim pulmo- nes secernant, aut, si mavis, conficiant, & sine ulla

Exempla.

exulceratione effundant. Exempla pulmonum inte- grorum in iis, qui copiosa sputa purulenta diu ex- creverunt, & pro phthificis ulcerosis habiti fuerant, apud BENETUM (*Theatr. Tab. p. 96.*), MORGAGNIUM (*de sed. & caus. epist. 22. n. 28.*) LIEU- TAUDIUM (*Hist. anatom. med. l. 2. observ. 404.*), HAENIUM (*Rat. medend. Part. XII. cap. 6. p. 250.*, & alibi pluribus in locis), CASIMIRUM ME- DICUM (*collect. observ. med. pract. T. 1. p. 279. ad 230. & Comm. Lipsiens. Supplem. 2. ad Decad. 2. p. 214.*), aliosque videri.

*Tubercula
in bron-
chiis vel
glandula-
rum bron-
chialium.*

(**) *Tubercula* non modo in aspera arteria, in bronchiis, pulmonibusque ipsis ex folliculis mucosis, cellulis, vesiculis, aut vasis, in primis lymphaticis obstructis fiunt, verum etiam extrinsecus bronchiis innascuntur, præsertim si quando glandulæ conglo- batæ, quæ, quia bronchiis fere ubique adjacent, bron- chiales dici solent, vitium aliquod contrahant, aut indurescant, aut sabulo aspero, aut aliis cartiligi- neis, ossileis, lapideisve concretionibus repleantur, aut abscessu turgeant; quas ob res *non infrequens*

*An hu-
jusmodi
glandulæ
communi-
cent cum
vasis tan-
tum lym-
phaticis.*

lentissimæ phthiseos causa ab HALLERO, aliisque re- putantur. Disputatur, an hujusmodi glandulæ cum systemate vasorum lymphatico solum communicent; num vero aliquid in bronchia ipsa infundant? MOR- GAGNIUS, & FANTONIUS negant; SENACIUS ve- ro, BERGENIUS, & HALLERUS affirmant. Utcum- que res sit, certum est, saltem in morbofo statu, si comprimantur, eas cœrulescentem, aut nigrican- tem,

tem, quo scatere solent, humorem in bronchiorum cavum effundere, & mucō pulmonari admiscere. Immo is etiam in sanorum sputis interdum cernitur. Ex bronchialibus ergo hisce glandulis suppuratis sputa quandoque purulenta educi poterunt. Vid. HALLER. *Elem. Physiolog.* l. VIII. sect. 2. §. xv.

*Quid cere
to desi-
nendum?*

(b) De morb. contag. l. 2. cap. 9. ubi hæc habet: verum & illam quoque possumus phthisim satis proprie appellare, quæ corruptis, putrefactisque pituitis ita pulmonem effecit, ut si non ulceratus est, at flaccidus, putidus jam redditur; quippe factis dissectionibus quorundam vidimus, interdum partem pulmonis sinceram, & nullatenus vitiatam, partem nondum exacte putridam, nondumque ulceratam, sed tamen flaccidam, mollemque, aque in marcorem tendentem, quandoque & totum pulmonem talem vidimus. Quare cum jam marcor ille in pulmonem serpit, phthisicum appellare merito hominem possumus.

(c) WILLIS. P. 2. sect. 1. cap. 6., ubi definitur phthisis totius corporis contabescencia a mala pulmonis conformatione orta. (d) Medic. conspect. Tabul. 34.

§. LV.

Utraque (§. LIV.), videlicet tam vera, quam notha distinguere debet in primariam, & secundariam, prout a pulmonibus primario laborantibus sine ullo alio morbo antecedente initium duxit, vel alii morbo succedit, ut scorbuto, lvi venereæ, arthritidi, malo hypochondriaco; aut hysterico, strumis, sive scrophulis, variolis, morbillis, scabiei, herpeti, scirrho, cancro, similibusque, unde etiam singulare nomen accipit, vocaturque phthisis scorbutica, venerea, arthritica, hypochondriaca, aut hysterica, strumosa, aut scrophularis, & sic deinceps. Ad has addit ut a se observatas HAENIUS phthisim cellularem, femora-

*Primaria
& secun-
daria.*

*Alia dif-
ferentia.*

lem, coxariam, sive ischiadicam, aliasque ejus-
 modi. Ceterum MORTONO (a), quam nos dici-
 mus *primariam*, placuit appellare *originariam*,
secundariam vero *symptomaticam*. Nobis tamen
 videtur, ut alias etiam docuimus, discrimen ali-
 quod interdum esse posse *secundariam* inter, &
symptomaticam. Existere enim potest *secundaria*,
 etiam si morbus, exempli causa hæmoptysis, pleu-
 ritis &c., a quo originem duxit, omnino cessa-
 verit, aut desierit; nequaquam vero *symptoma-*
tica, uti venerea, scorbutica &c. cum morbi,
 qui abest, vel abierit, *symptoma* esse non pos-
 sit, si symptoma pro effectu causæ præsentis, &
 non præteritæ vere habendum est. Nulla porro
 est tabes sive a toto corporis habitu; sive ab ali-
 cujus partis, aut visceris labe oriunda, quæ tan-
 dem in *phthisim pulmonarem secundariam*, aut
symptomaticam desinere non queat. Nam san-
 guis vel congruo deficiente alimento degenerans,
 vel alienis, noxiisque humoribus infectus, dum
 tenellam pulmonum substantiam pervadit, necibi
 rite ob laxatum partium tonum subigitur, facile
 ibidem hæret, & crudis, acribus, erodentibusve
 liquoribus depositis, altiusque se insinuantibus
 spasmos, congestiones, tubercula inducit, quæ
 primum tussim, respirandi difficultatem, pectoris
 dolorem, hæmoptysim, aut inflammationem; de-
 mum suppurationem, sputum purulentum, ulcus,
 & *phthisim veram*, & confirmatam pulmonarem
 progenerant. Præterea pro celeriore, aut tardio-
 re passu, quo suum cursum persolvit *phthisis*, *acu-*
ta, vel *chronica* etiam dici consuevit. Sunt enim
 phthisici, qui brevissimo tempore pereunt, &
 contra qui diutissime, & præter spem vitam
 protrahunt.

(a) Phthi-

* Phthisis
 acuta, &
 chronica.

(a) *Phthisiolog. l. 2.* (q) *Id. ib. cap., v. & HOMIUS Princip. med. l. 2. part. 3. cap. 9.*

§. LVI.

Itaque cum *phthisis pulmonaris* non semper ^{* *Amen,*} ejusdem sit gravitatis; & plerumque ad ἀκμὴν ^{* *sive summum gradum.*} non perveniat, nisi gradatim, & successive, in tres gradus a quibusdam dividi solet. *Primum* ^{*Varii Phthiseos gradus.*} esse dicunt; quando pulmones infarctu laborare incipiunt, obstruuntur, & quasi hectice incallescunt. *Secundum*, ubi jam tuberculis ex cumulatâ, congesta, coactaque lymphâ, aut alia materia cruda sensim enatis replentur. Postquam vero tubercula ejusmodi inflammationem subierunt, factaque supputatione; in abscessus, atque ulcera pus, & sanguinem interdum effundentia, convertuntur, *tertii gradus* initium jam accessisse. Divisio tamen hæc non videtur cuilibet *phthisi pulmonari* convenire posse, cum non omnis *pulmonaris phthisis* a tuberculis fiat, etsi ex his quidem frequentissime oriatur; ideoque nec eandem cum incipiendi, tum progrediendi rationem servet. Nam quæ a sola hæmoptysi, quæ a pleuritide, aut peripneumonia suppuratis, quæ ab acri, & rodenti humore, aliisque similibus causis proveniunt, divisioni certe huic nequaquam accommodari possunt. Quare cum causarum varietas differentiam non exiguam in *phthisi* ponat; rectius, ut ego quidem arbitror, dividitur in *incipientem*, & in *confirmatam*. Incipienti respondent *spuria*, atque *imperfecta*; itemque *tubercularis*, & *scirrhusa* (§. LIV.); *confirmatæ vera*, & *exquisita*, sive *ulcerosa*. Quoniam vero confirmata, sive *ulcerosa* paulatim & ipsa sua stadia

Phthisis pulmonaris non semper a tuberculis fit.

Rejicitur divisio trium graduum, de qua supra. Aliæ divisiones receptæ ab auctore.

Phthisis incipiens & confirmata.

per-

percurrit, donec ad extremum exitium perveniat, ideo æquiore jure, ut varius ejus status ob oculos ponatur, in tres quoque gradus distinguitur, quos ulcerationis, & maciei diversa ratio indicat. *Primus* dicitur, quando pulmo ulcerari quodammodo incipit, nec admodum corporis extenuatio in sensus incurrit. *Alter*, quando ulcus, maciesque manifestius se produnt. *Tertius* denique cum pus omnia inficit, ulcusque latius serpit, ut, liquatis quasi omnibus succis, ossa cute tantum recta (a) appareant.

(a) DUPRE DE LISLE de la phthisie pulmonaire p. 11., & p. 285., & seqq.

§. LVII.

Non omne Verum non omne pulmonum ulcus phthisim
ulcus pul- *veram* continuo procreat, nisi maciem, & len-
monum tem febriculam (§. LIV.) afferat ægrotanti; ra-
verum rum enim minime est, quod clini fere omnes
phthisim animadvertunt, dari quosdam, qui tussi sputa e
parit. pulmonibus nunc flava, nunc viscida & glutinosa, nunc purulenta, & sanguine etiam conspersa ejiciunt, quique nec maciem magni momenti præferunt, nec lente & assidue febricitant, nec ullo alio notabili incommodo, nisi ad longa intervalla, corripiuntur; ita ut vitam satis incolumem ducere quodammodo videantur. Hos tamen verisimile est ulcus quoddam in pulmonibus recondere, sed *callo* circum, aut *glutine* sic obductum, ut neque latius serpere queat neque magnam hinc alimenti jacturam pariat, neque puris quidquam in sanguinem infundat. Funiculi, si-
ulcera ve cauterii instar ulcus illud geri, probabile est.
callo ob-
ducta, &
chronica.

Ad

Ad quadraginta usque annos in quibusdam productum vidi, immo ad senium ipsum. Et quamvis aliquem phthisicum habitum in iis agnoscere viderer, tamen suis muniis obeundis satis commode pares erant. Cum his magnam habent similitudinem illi; quos *chronica phthisis* lentissime conficit. Sed hi, etsi lentissimo passu, quotidie tamen macrescunt, & lenta febricula non destituuntur. Sunt etiam qui existiment (a), *ulcera laryngis*, atque *asperæ arteriæ*, quia pulmonibus non insident, *phthisi* secludenda esse. Verum ab his quoque corpus sæpe deperit, & lenta febricula, cietur, qua omnis altrix, materies absumitur. Plerumque enim pulmo una afficitur, vel brevi eadem labes ad eum propagatur: Quapropter hanc phthisim, nisi *pulmonarem, trachealem* certe appellandam esse, non inepte judicaverim.

Discrimen inter chronicum pulmonum acutus, & phthisim chronicam. Phthisis trachealis quæ?

(a) MORGAGN. *Epist. anat. med. XXII. num. 27.*

§. LVIII.

De differentiis satis. Nunc causas difficillimi, & frequentissimi morbi investigare oportet. Proximæ causæ qua late patet, ideam complectitur, ni valde fallimur, quidquid pulmones, adnexasque partes obstruit, distendit, laxat, irritat, erodit, inflammat, aut lacerat, unde demum ulcus purulentum consequatur. Id vero non ita facile consequitur, nisi causæ proegumenæ, & procatacticæ una conspirent. *Proegumenarum* aut præcipuæ sunt ætas intra decimum octavum, & trigésimum quintum annum speciatim (a) comprehensa, tenella pulmonum, totiusque corporis constitutio; mala pectoris conformatio; temperamen-

Causa proxima phthiseos. Proegumena, & Procatactica.

tum

tum sanguineum, & cholericum; plethora; cat-
 chymia multiplex; variæ humorum acritates, at-
 que hæreditaria labeſ. *Procatarticas* exhibent
 graviora animi pathemata; fluida immoderata, in
 primis nocturna; vigiliæ protractæ, præva victus
 ratio; corporis tam nimia eſercitatio venus præ-
 maturata; aer densus, humidus, & paluster, aut
 subitas vices subiens, aut nimis rarus, levis,
 montanus (*b*); æſtas ſicca, & aquilonia, ſubſe-
 quente autumnio pluvioſo, & auſtrino (*c*); fri-
 gus calori repente ſuccedens; iſtus, contuſiones;
 vulneta; extranea in aſperam arteriam delapſa,
 aut inſpirata; magna vocis contentio, vehemens
 niſus, ſpiritus diu cohibitus; venena; halitus no-
 xii carbonum (*d*), metallici, acidi, nitroſi, &
 vitriolici (*e*); tuſſi, rheuma, catarrhus, & fre-
 quentiſſima in his poſtremis venæ ſectionis omiſ-
 ſio; hæmoptyiſis (*f*); pleuritis, aut peripneumo-
 nia imperfecte ſolutæ (*g*) aut ſuppuratæ; ſcor-
 butus; morbus ſcrophularis; lues venerea; hypo-
 condriaca; & hyſterica mala; metaſtaſes; con-
 ſuetarum evacuationum ſuppreſſio (*h*) ſcabies,
 herpetes variolæ morbilli aliaque cutis vitia re-
 tropulſa; ac demum contagium, ſi communicari
 ſententiæ ſtandum (*) ſit.

*Venæ ſec-
 tionis omiſ-
 ſio in
 Tuſſi Rheu-
 mate,
 catarrho
 frequen-
 tiſſime
 phthiſim
 ſigno.*

(*a*) HIPPOCRATES *Aph. IX. Sect. V. & Aph. 7. Sect. VIII.* (*b*) ROZIERE DE LA CHASSAGNE *Manuel des pulmonique pp. 282. 283.* (*c*) HIPPOCRAT. *Aph. 13. Sect. III., & aph. 22. ſect. III.*

(*d*) ROZIERE DE LA CHASSAGNE *Manuel des pulmoniques p. 281.* (*e*) HELMONTIUS *Operum p. 200.* (*f*) HIPPOCRAT. *Aphor. 12. ſect. VI.*

(*g*) IDEM *Aph. 15. ſect. VII. & COAC. n. 438.*

(*h*) IDEM *Aph. 15. ſect. V.*

(*) CL. MORGAGNIUS *Epist. anatom. med. XXII.* pro iis ſe declarat, qui phthiſim contagioſam putant.

SWIETENIUS eamdem sententiam exemplis confirmat. ANTONIUS vero COCCHIUS, & nuper CASTELLANIUS Mantuæ clinices professor contrariam ^{An phthisis contagiosa?} queri conati sunt. In Etruria tamen, etsi Medicorum Collegium *phthisim contagionis* expertem judicaverit, lege cautum est; ut cubicula, vestimenta, aliæque res, quæ usui phthisicis fuerunt, detractis parietibus veteribus, novisque inductis, expiarentur, & igni reliqua traderentur cremanda.

Diagnosis.

§. LIX.

Quoniam vero *præsens phthisis* vix amoveri potest, plurimum interest eam, antequam accesserit, prævidere, ut avertatur. Itaque futuram portendunt ortus a parentibus hac labe defunctis: pectus angustius; & depressius; humeri elati; collum longum, & tenue; statura procera; vox exilis, aut clangosa; cutis pellucens; color valde candicans, & in genis amœnæ roseus; gracilis corporis habitus; præcox ingenium; spinæ dorsî curvitas, gibber; copiosi phlegmatis matutina præsertim excreatio; crebri catarrhales affectus; & denique morbi, qui antea antecesserunt (a). *Incipientem* autem *phthisim* generatim tria potissimum ostendunt, tussis diuturna; febris hæc ^{Signa futura phthiseos.} tice a pastu invalescens; interdum matutinis horis intermittentes; & musculosarum partium extenuatio. Tussis sæpe quidem ab initio mitis est, modo sicca, modo humida; & catarrhali similis, ^{Signa incipientis.} deinde molestior, in primis post epulas, ita ut eam vomitus ingestorum non raro subsequatur, sive hunc irritato simul œsophago, sive a venticulo per vehementiores diaphragmatis, & abdomi-

dominis contractiones compresso repetendum volueris. Hoc peculiari symptomate tussim phthificam a tatarrhali distingui animadverit MORTONUS, multoque certius eam phthificam vixeris, si accesserit cibi fastidium, sitis; sputum viscidum crassum, & varii coloris, sanguine interdum conspersum, sapore salso, aut dulci, aut amaro, aut quocunque alio alieno præditum, pondus in pectore, præsertim parte vitium insidet; insolita quædam oppressio; difficilis in alterutro latere decubitus, tussim incitans, interdum obscurus alicubi dolor; respiratio aliquantum laboriosa, præsertim post citatiorem incessum, aut ascensum scalarum? sudatinculæ nocturnæ, aut matutinae, hypochondria elevata, & tensa, & proinde quasi gravata; & demum facilis in iracundiam, aut mœstitiam prolapsus. Febris autem ipsa inter initia vix celeriori arteriarum motu se prodit, postea paullatim crescit, quin tamen *lenta*, sive *hectica* modum excedat. Calore ad exxiora satis manifesto, in primis ad volas manuum, & pedum, vigiliis, & generarum subinde rubore stipatur. Interea urina parcius redditur. & coloratior est, facile perturbatur. Macies a primo morbi ingressu plerumque exigua est, lenteque procedit, ut vix animadvertatur. Verum, ubi febris incrementa capit, dejicitur appetitus, digestio deprevatur, & succus, quo ali corpus debet; tunc sane celeriter æger macrescit, ut brevi ad sceleton prope accedat.

(a) HIPPOCR. *Aphor.* 15. *sect.* V., & COAC. *sum.* 17. 138. 444. 469.

§. LX.

Simulac vero febris (§. LIX.) lente naturam amittit, acutiorque facta pleuriticam, aut peripneumonicam imitatur; aut intermittentium accessiones, sed vagas, atque anomalas (*) habet, quod suppurationibus proprium est, & pus verum excreari incipit; tum *confirmatum* jam *phthisim* esse; non est dubitandum. Nam brevi liquatio summa in toto corpore cum a vehementiore febris motu, tum a pure in venas resorpto oboritur. Hunc sudores in primis nocturni, & matutini augentur, & fere perpetui fiunt, quos sæpe excipit alvi fluxus mutuo alternans; urinæ copiosius effluunt liquatam sæpæ pinguedinem in summa superficie ostendentes. Quare celerrimus virium lapsus, atque extrema macies ægro tantam conficit. Quod ad puris sputum attinet, scire licet; ut supra (§. LIV.) jam animadversum est, non raro sputa purulentia copiosa diu excreata fuisse tussis ope molestæ, quin tamen ulcere pulmones laborarent. Quod confirmatur a

*Signa
phthisis
confir-
mata?*

*Liqua-
tio.*

*Sudores
auti &
alvi flu-
xus al-
ternan-
tes.*

*Pus non
semper ab
ulcerato
pulmone
est, juxta
observa-
tiones
præser-
tim C. A-
SIMIRI
MEDI-
CI.*

*Cautio
circa pu-
ris dia-
gnosim.*

FRID. CASIMIRO MEDICO (a), qui cadaverum sectione rarissime post puris sputum invenit ulceratos pulmones, at sæpe induratos; interdum si-
ne ulla labe, licet quotidie ægri ingentem puris vim extussissent; dum contra in abdominis cavo liquidum pus fluctuare apprehendit. Cavere ta-
men oportet, ne pus credatur id, quod minime est, neque negligenter pulmones dissecentur; nam sæpe ulcusculis, & abscessibus parvis hic illic dis-
seminatis, & pene inconspicuis scatent, unde pus dimanare potuit, integra deinde, & intacta pulmonum substantia apparente. Sed hujusmodi

error in viros scientia medica, & longo usu commendatissimos cadere haud dici potest.

(a) *Collectio observationum medic. pract. Tom. 1. p. 279. ad 320.*

§. LXI.

Extremum exitium. Insuper morbo ad exitium properante aphthæ in ore, palato, faucibusque erumpunt, dolorem, ardoremque deglutire volenti excitantes; vox rauca fit, immo interdum perit; fœtor non modum ex ore, verum ab universo corpore emanat; quandoque postulæ metacarpos deturpant; capilli defluunt; ungues incavantur; tempora collabuntur; oculi incavantur; nares gracilescunt; intumescunt pedes, & manus; sola fere cuti ossa teguntur; sputum supprimitur; delira atque absona effutiuntur (a); tussis conquiescit, sed spiritus difficillime, anxieque trahitur; pulsus languent; tenuantur, vacillant, deficiunt, sicque mors (ægro spem adhuc aliquam alente: nam in nullo alio morbo magis sibi blanditur) pedetentim obrepit, finemque miserrimæ vitæ imponit. Mors vero sapissime nec cogitanti dum vel corporis decubitus mutatur, vel repente aeris in austrinum, aut borealem mutatio contingit, quasi clanculum supervenire consuevit. In eorum cadaveribus plerumque pulmones consumpti, exesi, excavati, vastisque cavernis fœdati reperiuntur. Interdum pus etiam in cavum thoracis effusum cuncta corrodens, corrumpensque offenditur. Interdum evenit, ut phthisicus dolore acutissimo lateris affecti corripatur nulli remedio obtemperans. Id ex pure pleuram penetrante, & arro-

In hujusmodi morbo instante etiam morte, ægri non desperant, & inexpectato pereunt.

Unde oriatur dolor acutissimus in affecto latere excrucians.

dente,

dente; nervosque desuper decurrentes, musculosque aditos vellicante fieri, non semel sectione cadaveris cognovimus.

(a) COACAR. n. 437. HIPPOCR. *Aph.* 17. *sect.* VII.

§. LXII.

Sed alia est *phthiseos trachealis* ratio. Hanc, *Diagnosis phthiseos trachealis.*
 sive *ulcera* majoris *laryngis* & *tracheæ* (§. LVII.),
 antecedunt distillatio humoris, acris, aut salis, &
 quidem diuturna; herpetica, aut scorbutica la-
 bes; exsputio sanguinis cum signis (§. XXIII) *Quæ præcedunt, & comitantur.*
 conjuncta; tussicula sublimis, & titillatio laryn-
 gem maxime occupans. Comittantur vero tussis,
 & titillatio eadem doloris, aut ardoris ad asperæ
 arteriæ initium; sputum salivale paucum, spumo-
 sum, non coctum, interdum striis purulentis,
 albisque, interdum filamentis sanguineis inter-
 mixtum, interdum vere purulentum, aut sanio-
 sum, modo inodorum, modo foetidulum, sed pe-
 culiari puris foetore; raucitas; aphonia; & aliqua
 corporis, maxime manuum, & digitorum, exte-
 nuatio. Adsunt præterea *phthiseos* futuræ indicia
 (§. LIX.); absunt vero pectoris oppressio; dif-
 ficilis decubitus; spirandi difficultas, etiam in a-
 scensu scalarum non percipienda; tussis profun-
 dior; & febris assidua, ait si ulla est, exigua
 sane ita est, ut interdum deficere videatur. Ec-
 legmata, & pastilli, qui ore detinentur, & sen-
 sim deglutiuntur, ardorem, punctiones, & tus-
 sim leniunt, & mirifice levant. Tandem si ma-
 lum progreditur, bronchia etiam, ipseque pulmo
 exulcerantur, in veramque *phthisim pulmonarem*
 definit.

*Præsen-
tia quo-
rumdam
sympto-
matum
graviorum.*

*Quibus
ardor,
punctio,
tussis le-
niantur?
Transit
in phthi-
sim pul-
mona-
rum.*

§. LXIII.

Phthisis Phthisi præterea, quam *scirrhi*, *tubercula cruenta* a *scirrhis*, *da*, *indurationesque* pulmonum gigunt (§. LIV.), quædam peculiaris, & propria habet, quibus a reliquis discernatur. Tussis eam plerumque exercet sicca, permolesta nec oleosis, nec bechicis, nec paregoricis sublevanda. Si quid in ea, progrediente morbo, extussitur, id paucum est, spumosum; aquæ in qua sapo solutus sit, persimile; taleque ad morbi usque finem plerumque perseverat; nisi ejusmodi tussim, quod non raro evenit, subsequatur hæmoptysis, cum deinde sputa purulenta superveniunt, cumque illis crudis, & lymphaticis permiscantur. Insuper qui hac phthisi laborant, non modo brevem, & crebram inspirationem habent, sed etiam pectore ad anteriora inclinato spiritum ducere coguntur, crebrasque punctiones modo in hac, modo in illa thoracis parte percipiunt, febricula nec magna, nec vehementi; nec assidua ut plurimum vexati. Sæpe in his glandulæ colli; ut axillares, aliarumque partium, ut inguinum, mesenterii, tument, & strumosæ cernuntur. Ex quibus conjecturam facere licet, similia in pulmonibus reperiri. Atque hæc quidem de *scirrhis*, *strumosis*, *induratisque* pulmonibus intelligantur. Est præterea pulmonum *tuberculum*, de quo mentio fit ab Auctoribus, non totos pulmones, ut in priore casu, sed aliquem tantum ejus locum occupante, quod suppurationis capax est. Qui hoc morbi genere efficiuntur, inquit BAGILIVIVS (a), *de cætero bene se habentes, difficulter spirare incipiunt; difficilis spiratio sensim augetur; inter spi-*

ran-

randum non stertunt, & nihil exspuunt, dolorem quoque in pectore sentiunt continuum, & dolentem in locum decumbere non possunt; tussis sicca laborant; tandem gena rubent; fericula supervenit; & negotio ad suppurationem vergente, alia suppurationis symptomata accedunt. Duo ^{Signa} tamen ^{pathogno-} signa ^{mica} pathogomaxica ^{duo ex} crudi, & adhuc in ^{eadem} incipientis tuberculi sunt tussis sicca, & dolor lenis in alterutro pectoris loco, cui arridet illud divini senis (b): „ & quamdiu quidem tuberculum adhuc crudius fuerit, dolorem exilem, & tussim siccam inducit “.

(a) Prax. medic. lib. II. cap. 8.

(b) Lib. I. de morbis, textu 63.

§. XLIV.

Quamquam supra ostensum est, in phthisi tam ^{Respira-} incipienti, quam ^{tio non} confirmata respirationem lædi; ^{semper} doloreque pectus alicubi plus minus affici; id ^{læditur,} tamen ita perpetuum non est, ut quandoque ^{nec sem-} utrumque non deficiat. Hoc sæpe occurrit in ea ^{per dolor} phthiseos specie, quam sola, & simplex sine alio <sup>phthi-
sim</sup> pulmonum vitio hæmoptysis intulit. Præter ^{comit a-} tussim, puris sputum, febriculam, & maciem vix ^{tur.} ullus unquam dolorem, aut dyspnœam queritur. Immo plerumque ægri, quia sibi bene respirare videntur, nec dolent ullibi, nec difficulter decumbunt, sibi persuaderi non permittunt; ulcus in pulmone vere existere. Neque rarum est, in reliquis quoque phthiseos speciebus dolorem deficere; inventa enim est in cadaveribus magna pars pulmonum corrupta, exesa, suppurata, quin ægri unquam doluerint. Id vel a lenta eorum corru-

ptione, vel a sensibilitate ob peculiare quoddam vitium imminuta; aut deperdita derivandum videtur. Doloris ergo absentia ulcus pulmonum jure non excluditur. Quibus notis phthisis *pituitosa* ab aliis internosci possit, facile ex iis, que *facilis diagnosi.* alibi (§. XLIX.) explicata sunt, cognoscetur.

Prognosis.

§. XLV.

Si ulla salutis spes in pulmonari phthisi affulget, ea tantummodo in *incipienti* locum habere videtur; nam *confirmata* vix unquam curationem admittit. Etenim ulcus aeri perpetuo objectum; in parte situm, ex qua non facilis est puris educio, semper commota, & nunquam quiescente, atque a tussi ipsa crebro concussa; & tumoribus accitis scatens vix sanescere potest. Si tamen hoc *Quando spes curationis sit?* recens sit, nec inveteratum; si pus album, leve, æquale, non foetidum facile prodeat; si nulla, aut exigua febris teneat; tussis non valde dive-
Quando non? xet: appetitus vigeat cum corporis habitu adhuc laudabili, aut saltem mediocri, amploque thorace; neque liquationis phthisicæ signa adhuc se exferant; tunc bonum exitum aliquomodo sperare licet, præsertim si ulcus ejusmodi a pleuritide, aut peripneumonia suppurata relictum (a) fuerit. Phthises enim ex hac causa natas non semel clinici consanascere observarunt. Contraria his, contrarium prælagium. In universum *hereditaria*, vel a mala pectoris conformatione, vel a contagione genita omnem ut plurimum medelam aspernatur. Evitari tamen interdum potest, si mature ars in auxilium vocata ejus adventum arceat,
An labes hereditaria averti possit? aut

aut antevētat. Facilius curatur ex, quæ a toto corporis habitu est (§§. XLIII. LIII.), quam quæ originaria, sive primaria (§. LV.) dicitur. Item originaria periculosior est, quam symptomatrica (§. LV.); pariterque exitiosior quæ celerius ad liquationis statum (§. LV.) perducitur.

Ex aliis
phthi-
sibus, qua-
nam plus
quæve
minus
exitii
porten-
dat.

Hæmoptysi superveniens, nisi ab ictu, aut nifu exspuitio sanguinis orta fuerit, plerumque lethalis (*b*): Deploratissima etiam quæ a calculis, lapidibus, aut ossibus inæqualibus pulmoni innatis (§. LIV.) provenit; quia ab his lacerantur, ut monet BENETUS (*c*), ipsi pulmones; nec coalescere possunt, nisi tussi; ut interdum evenit, expellantur. *Trachealis* (§. LVII) interdum curatur, si statim inter initia rite tractetur, aut a veneno syphilitico foveatur.

Trachea-
lis cu-
randa
quænam
spes?

(a) COACAR. 402. (b) COAC. 438.

(a) *Theatrum Tabidor.* p. 100.

§. LVI.

Quæ sequuntur, cuicumque tabi communia sunt. Tabidis nihil perniciosius est alvi profluvio (*a*). Pessime quoque habent, si cruda multa exspuant, spirandi difficultate haud imminuta (*b*). Autumno; austrinisque constitutionibus magis periclitantur (*c*), quam aliis anni temporibus. Tabes consumptos rigoribus subinde corripit, mortem præ foribus esse significat (*d*). Quibus ex longo intervallo alvus cum corporis macie diffluit, si repente subsistat, & præcordia extollantur, malum quoque prænuntiat (*e*). Lethale signum dixit HIPPOCRATES (*f*), si sputum phthysicorum graviter oleat, & simul capilli defluant, aut id

Cuicum-
que tibi
commu-
nia.

De putre
sputo an
maderet
fones.

ipsum (g) in aquam marinam, sive salitam injectum fundum perat. Illic orta profecto est, teste CORNELIO CELSO, nonnullorum opinio affirmantium (h), purulenta sputa duabus hisce notis a non purulentis discerni. Verum hisce notis prava tantum puris natura significatur, non pus ipsum, ut verba ipsa hippocratica declarant, utque oportune cl. MORGAGNIUS animadvertit. Id vero manifestius ex eo fit, quod alibi HIPPOCRATES boni puris nota recensens, album, inodorum, & leve ipsum esse debere docuerit. Præterea si hujusmodi periculis puris natura detegenda esset, incertam profecto, & fallacem ejus cognoscendi rationem istam multa evincere videntur. Nam sputa scorbuticorum, etsi purulenta non sint, plerumque foetent, eoque magis, si prunis imponantur; quidquam enim animale habet naturam, igni inditum graviter olet. Salsa item plerumque sunt, ideoque ponderosiora, & quædam, si aereis bullulis perquassationem priventur, ita gravia evadunt, ut in aquam marinam, nedum communem, in primis calidam injecta, quanquam non purulenta, in fundum facile descendant. *Puris* igitur *veri* naturam nihil certius significat, quam plurium signorum conjunctio, & concursus, contra quam alii opinantur ancipiti ARETÆI loco confisi (i). Hæc autem sunt peculiaris sputorum habitus: cinereus, aut flavescens color; certa coherendi ratio, qua lymphæ, & pituita secedunt, atque in filamenta, & floccos aqua affusa diffuunt; prægressæ, aut præsentis suppurationis phænomena; atque alia, quæ expertum, doctum, oculatumque Clinicum neutiquam fugiunt. Neque quidquam obstat sputi levitas; nam verum pus leve esse

Gravolentia & pondus sputorum notæ non sunt veri puris.

Veri puris natura.

esse potest, si bonum, & laudabile fuerit, sic, ut facile non modo aquæ falsæ, & marinæ, verum etiam communi, & puræ, quæ levior est, innatet. Fœtor ergo, pondus, aut viror deterioris puris indolem, & qualitatem, non naturam indicant. Neque quidquid ab ulcere emanat, statim pur dicendum esse existimo; cum & sanies & ichor varii generis ab eo sæpe effundatur. Ideo saniosa, atque ichorosa sputa a purulentis probe distinguenda sunt. Neque tandem sputa, quæ exteriori tantum habitu puris speciem referunt, pro purulentis habenda sunt; mucosi enim, & coagulabiles humores mora, & calore ita concoqui possunt, ut pur ipsum imittentur. Tunc sputa *puriformia* rectius appellantur.

Sputa puriformia qualia?

(a) HIPPOCR. *Aphor. XIV. sec. V. COAC. 436.*

(b) COAC. n. 445. (c) *Aphor. X. sect. III.*

(d) COAC. n. 443. (e) COAC. n. 287. 442.

(f) *Aphor. 10. sect. V. COAC. n. 434.*

(g) COAC. n. 435. (h) *Lib. III. cap. 22. n. 25.*

(i) MORGAN. *Epistola anat. med. XXII. ROZIER DE LA CHASSAGNE Maladies de la poitrine p. 255.*

§. KVII.

Itaque phthisis cum morbus sit, qui postquam adoleverit, aut inveteraverit, difficillime vinci possit; mature ei occurrendum est. In tanta tamen causarum (§. LVIII.), & phthisium varietate nulla statui potest curandi ratio adeo universalis, quæ singulis causis, phthisibusque, earumque diversis stadiis, aut gradibus accommodari queat, generatim vero oportet removere causam, quæ *nutrimenti* præstat defectum, aut

Indicationes.

depravationem, aut ejusdem impedit aptam partibus applicationem; morbos tollere, a quibus tabes, sive phthisis originem ducit; sanguinis acritatem temperare; obstructions, congestionesque avertere, aut præsentes discutere, & resolvere; ne inde inflammatio, suppuratio, atque ulcus sequatur; & denique totius corporis, aut partium affectarum laxam compagem firmare.

Curatio.

§. LXVIII.

*Curatio
tabis ab
impedito
alimenti
itinere.*

Quapropter tabes a causis (§§. XLIII. XLIV.) nata postulat ea artis adjumenta, quæ œsophagi, aut ventriculi tumores, fungos, scirrhos, ulcera, rigiditatem, callum, angustiam, paralysem, aut alia vitia, a quibus oriri diximus *dysphagiam* (*), removeant, aut tollunt; cibum uberiores, aut alendo corpori magis idoneum, aperientia, saponacea, lenitèr alvum ducentia, in primis rhabarbarina & demum roborantia, aut quamcumque evacuationem nimiam opportune sistentia.

*Aperientia,
saponacea,
alvum
ducentia,
roborantia.*

(*) Vid. *De morbis imi ventris cap. I. de dysphagia.*

§. LXIX.

*Curatio
tabis dorsalis
prima.*

Tabes dorsalis prima (§. XLX.) ubi curanda sit, continuo ineunte morbo, si HIPPOCRATIS præcepta aliquid valent, ad ea, quæ sursum, & deorsum evacuant, confugiendum est; deinde scro lactis, aut lacte asinino, & tandem vaccino

*lactis
usus.*

per

per dies quadraginta copiose utendum; dandaque pro cœna alica, aut quæ hodie magis in usu sunt, cremores oryzae, hordeique, aut pulmentum ex avenæ, aut *sagon* farina, & similia. Carnes quoque teneriores, & præsertim assatæ, aves, ova recentia concedi possunt. Nec interea fœtus, & tepida balnea negligenda sunt. Sed his nonnulli frigida balnea anteferebant, corticem peruvianum, & ferrum, utpote quæ languentibus, laxisque fibris, & toti nervorum systemati rubor, & firmitatem restitunt. His præ ceteris in hujusmodi morbi curatione potissimum confidit TISSOTIUS (a); Et quidem ferro tantam vim inesse GRAINGERIUS asseverat (b), ut nullum se invenisse scribat remedium, quod cum eo comparari possit. Ferri pariter scrobem in *tabe dorsali* & nimia venere orta commendat. FRID. CASIM. MEDICUS (c), sed cum eo largiorem potum adhibendum præcipit. Præterea per annum ab ebrietate, a venere, ab immodicis laboribus abstinere oportet, exceptis deambulationibus, vectatione, atque moderata equitatione, dummodo in his sol; & frigus evitentur.

Cibus, & potus.

Balnea.

Mars.

(a) *Onanism.* (b) LUDWIG *Comment. de rebus in scient. natur., & méd. gest. Vol. IV. p. 236.*
 (c) *Id ib. Suppl. ad Decad. 2. p. 223.*

§. LXX.

Nec valde differt curatio *tabis dorsalis secundæ* (§. XLVI.), in qua tamen & vinum album molle, & obsonia, & cibi, qui alvum molliunt, & lac cum melle ad dies XLV. conceduntur, ut ex libro *de internis affectionibus* habemus. Ibi pariter præcipitur, si corpus concreseat, sive tu-

Curatio tabis dorsalis secundæ.

Lac cum melle.

meat,

Uisiones meat, ferreo ignito cervici, dorso, & lumbis
crustas pluribus in locis crustas inurendas esse: nam, il-
inferen- lis bene succedentibus, sanitas redit. Hodie ve-
tes. ro, ut obstructa viscera referentur, & universum
 corpus, nervorum in primis systema, firmetur,

Sales neu- sales neutri, uti mirabilis, Glauberi, aut poly-
tri, Ru- chrestus, aut tartarus vitriolatus cum diluto ra-
dio, va- dicis valerianæ, aut ejus decocto, aut extracto,
lerianæ aut pulvere diutissime adhiberi possunt, cum non
dilutum, pauci hæc ratione ab hujusmodi tabe convaluisse
decoctum, visi fuerint; præsertim si veneris usus procul ab-
extracta, fuerit, & corporis exercitatio in ejus locum suc-
pulveres cesserit. Potui tam in hac, quam in præcedenti

Cortex dari potest aptissime, dum cortice peruviano u-
peruvia- tuntur, aut alits tonicis, ptisana DALISBII, quæ
nus. sic habet.

Ptisana R_x. Mala citrea n. ij.

DALIS-
BII.

Eviscerentur; deinde cont. in morta-
marmor., & sensim affu. decoct. hord.
lib. ij. panis tost. unc. ij., syrup. mo-
ror. unic. j., vin. veter. optim. unc. vj.

§. LXXI.

Curatio *Tabi dorsali tertia* (§. XLVII.) ea conveni-
tabis dor- re videntur, quæ primario morbo, gonorrhæa sci-
salis ter- licet, aut *fluori albo* medentur. Quod si ab im-
sia. pura venere morbus sit, mercurius, decocta li-

Caussis gnorum, & lac opem ferunt. Si aliunde: ea cu-
accommo- ratione opus est, quæ caussarum, a quibus mor-
detur. bus illatus est, varietati respondet. Illud sane

Fluxui quærendum est semper, ut fluxus putridus, quo
putrida corpus marcescit, emendetur, consistat; & ces-
meden- set. Alvi ductio, aquæ medicatæ, & in primis
dum. ferri participes, leniterque balsamica, & vulnera-
 ria

ria usu quammaxime comprobantur. Neque hic prætereunda sunt etiam balnea frigida, quorum hodie plerique meminerunt.

§. LXXII.

Quando *tabes*, sive *atrophia* ab *inanitione* alias immodicas evacuationes (§. XLX.) pro causa habet, morborum, a quibus foyetur, curatio instituenda est, alimentique defectui apta victus ratione prospiciendum. Si vero a mala, atque imperfecta ciborum digestionem, & chylicationem corpus contabescat (§. XLVIII.), amarum, incidentibus, tonicisque stomacho dicatis remediis uti oportet. Quando autem sanguinis dyscrasia, & prava ejus indoles materiam alibilem pervertit, aut corrumpit, noto per sua signa peculiari ejus vitio occurrendum est. Demum quando *tabes* a mala solidarum partium affectione est, illudque morbi genus efficit, quod *atrophiam nervosam* MORTONUS (§. XLIX.) appellavit, vis nervea, & reliquarum solidarum partium erigenda in primis est cardiacis, leniter aromaticis, gummi ferulaceis, antiscorbuticis, viperinis, martialibus, iricationibus, exercitationibus, peregrinationibus longis, natatione, & victu optimi succi, & facilis coctionis. Huic præsertim malo obnoxii sunt Angli, a quo institutis longissimis in externas regiones itineribus sæpe liberantur. De hac phthisi loqui SYDENHAMII arbitror, quando asseverat, tantum valere equitationem ad phthisim curandam, quantum chinam chinam ad febres intermittentes. Contraria vero curandi ratio convenit tibi senili, aut cuicumque a nimia solidarum partium rigiditate, & quasi dixerim occallescentia,

Curatio
atrophiæ
ab inanitione.

Vitus
ratio.

Quid, si
a mala
digestione
vel chy-
losis?

Si a dys-
crasia
sanguini-
nis, quid?

Quid, si
ab atonia
solido-
rum, a-

trophia
dicta a

MORTO-
NO.

Huic An-
gli obno-
xii, quo-
modo e-
vadant?

Quando
de ea lo-
cutus vi-
detur SY-

DENHA-
MIUS.

*Quid tubi-
senili a
solitorum
rigidita-
te nimia?* tia, ut emolliantur, laxentur, & pateant in-
fluentibus succis. Quare & balnea tepida, &
inunctiones, & lenes fricationes, & jura rana-
rum, & testudinum, & avenæ, & præ ceteris
serum lactis, immo lac asininum, quod ad aver-
tendam, retardandamque senectam HOFFMAN-
NUS, aliique proponunt; opportunissime in usum
erunt vocanda.

§. LXXIII.

*Curatio
atrophia
perperam
pro tabe
dorsali
habita.* In *tabe* vero, sive *atrophia nervosa* a toto ha-
bitu, quæ perperam pro *dorsali* habita a quibus-
dam est (§. L.), quin potius *phthisis pulmona-
ris incipiens secundaria* dici mereatur, sive cum
medulla spinali obstructa conjungatur, sive sine
ea complicatione sit, tota curatio iis inniti de-
bet, quæ incidunt, aperiunt, resolvunt, & quos-
que humores liquidiores reddunt, roburque fi-
bris impertiunt. Quare, ut auctor libri *de in-
ternis affectionibus* præcipit, vomitus primum a-
qua cum aceto hausta, & penna oleo illita, at-
que in fauces immissa cieatur; deinde succus
tum betæ una cum melle, tum brassicæ cum
sale coctus per mensem propinetur. Interposito
vero mense uno; quo carnibus vescatur æger, &
vinum potet, per alium mensem herbis odorife-
ris, leniterque aromaticis, & stimulantibus, uti
rutha, anetho, mentha, coriando, ocymo, apii
radicibus, similibusque utatur, utpote quæ visci-
dus humores attenuant, & solvunt, vasorum
omnium exitant vim, nervosque quodammodo
recreant. Subinde etiam fomenta adhibeat, aut
balneum tepidum ingrediatur, ut perspiratione
aucta totum corpus expurgetur. Sed cum primis
inter

inter quotidie stasis horis, paulatim augendum, ineat, donec tandem in singulos dies centum & quinquaginta stadia (*) conficiantur. Interea vinum bibat primum album, & dulce, deinde nigrum, atque austerum, & carnes comedat, atque obsonia sensim magis nutrientia, pingua, & cartilaginea. Hac enim ratione curatus sperare potest, se intra annum esse convaliturum. Rationi consonam, præstantissimamque hujusmodi curationem reperit RAULINIUS (a), tamquam certis, probatisque indicationibus innixam; quibus tamen hodie in tanta *materiæ medicæ* ubertate integrum cuique erit pharmacis aliis, atque aliis, prout magis arriserit, satisfacere.

Quotidiana itineratio.

Potus, & tibi ratio.

Huic curationi, quæ RAULINIO optima est, alia etiam mendendi ratio substitui potest æquo iure.

(*) Stadium constat ex CXXV. passibus.

(a) Observationis de medicina &c. Art. V. p. 61.

§. LXXIV.

Tabes demum *dorsalis* quanta (§. LII.), quæ *rhachitidi*, aut *rhachialgiæ* recentium scriptorum, ut mea fert sententia, si minus respondet, similis certe est, eandemque curationem exigit. Amaris igitur, antacidis, aperientibus, gummosis, sudoriferis, thermalibus, aquis, martialibus, nervinis, & roborantibus oppugnanda est. Nec alienum est fricationibus, atque exercitationibus roborare corpus, aere sicco & campestri, victu simplici, nutriente, ac tenuiori quam maxime uti. Speciatim vero rhabarbarum cum sale tartari, tinctura antimonii, radix osmundæ regalis, curcumæ, rubiæ tinctorum, & valerianæ sylvestris, gummi sagapenum, assa fœtida (*), ens Veneris BOYLEI, aut flores salis ammoniaci martiati

Curatio tabis dorsalis quærtæ.

Similis omnino rhachitidi, aut rhachialgiæ morbus, iisdemque remediis oppugnandus.

Quaedam remedia potiora hujus morbi.

Spernis tiati excellere hic creduntur. Sed malum ple-
plerumque rumque omnem contemnit medicinam, & post
omnem diuturnos cruciatus, spasmos, pareses artuum,
et si miti- vesicæ, ani, aliave, quæ lente ad *marasmm*
gatus in- patientem redigunt, morte terminantur. Nun-
terdum quam perfecte curatum vidi, interdum tamen
vita ad mitigatum ita, ut vitæ ad complures annos par-
plures an- ceret. *Atrophia* porro *nervosa* (§. LIII.); quo-
nos par- niam dyscrasim acrem humorum, bilis inertiam,
sat. & defectum, fibrarumque rigiditatem pro causa

Curatio habet; diluentibus, temperantibus, saponaceis,
atrophiae uti ptisana ex radicibus graminis, taraxaci, ci-
nervosa. chorei, agrimonix, addito sale quodam neutro,
Diluen- aut subacido; succis earumdem plantarum cum
tia, tem- fero lactis; aquis medicatis, acidulis, leniter fer-
perantia, ratis, *acre fixo* prægnantibus; emulsis anodynis;
saponace- balneis tepidis, & victu blando, & vegetabili
cea. curari solet. Enemata hic quoque lenia, & mol-

Atrophia somnoperere profunt. Quæ autem ab amore, aut
ab amore, à *nostalgia* fovetur, postulat, ut voti compos ho-
et a no- mo fiat, aut ratione ope animus sedetur, &
stalgia tranquillus fiat. *Secundaria* ab *hysterica*, aut
curatio. *hypochondriaca* affectione profecta curetur ut
Curatio morbus primarius.
secunda-
ria.

(*) *Vid. dissert. de Affa fœtida* JOHANN. PÜNDT.
Gotting. 1178.

§. LXXV.

Curatio Jam vero de *phthisi pulmonari* (§. LIV.) cu-
phthiseos randa referendum est. In hac igitur omni ope
pulmona- eniti oportet, ut quævis exulceratio præcavea-
ris, tur, aut ubi jam pulmones exederit, quam ci-
 tissi.

tissime confanescat. Quorum alterum *incipienti* *Indica-
tiones.*
(§. LIV. LVI. LIX.), alterum *confirmata* (§§.
LVI. IX.) opportunissimum est. Quare ut om-
nis exulcerationis timor arceatur a *phthisi inci-* *In phthisi
incipien-
te.*
piente, uberior ad pulmones humorum appulsus
cohibendus, congestiones discutiendæ, obstructa-
referenda, resolvenda tubercula, omnis ad in-
flammationem, suppurationemque proclivitas re-
movenda, & quæcumque sanguinis acritas, aut
alia prava diathesis emendanda.

§. LXXVI.

Itaque convenientissimum est alvum leniter du- *Alvi du-
cere.*
cere, idque plures ad intervalla repetere (*); *Revel-
lentia.*
sanguinem parca manu, sed iteratis vicibus, præ-
fertim quando suppurationis timor avertendus est,
subinde detrahere (quod non solum *phthisi* futu-
ræ, aut *incipienti*; verum etiam in *confirmata*
migrare minanti remedio esse, experientia ccl.
viror. (a) demonstravit), aliorum per epispasti-
ca; fonticulos, fots, balnea, diuretica, & su-
dorifera materiam morbidam a pectore avocare;
his, quæ diluunt, attenuant, incidunt, atque a-
periunt, caute, prudenterque uti; demulcenti-
bus, oleosis, obvolventibus spasticas, & convulsi-
vas contractiones, & tussis stimulum delinire;
& demum nutrientibus blandissimis, & roboran-
tibus corpus, pulmonesque firmare. Inter diluen-
tia, attenuantia, aperientia non ultimum obti-
nent locum aquæ thermæ, atque acidulæ. Sed *Diluen-
tia, in-
volven-
tia, pare-
gorica,
incrass-
fiantia,
& robo-
rantia.*
cavendum est in earum usu, ne nimia copia pul- *Cautio.*
mones magis magisque infirmentur, aut, si ulce-
rationem jam passi fuerint, eorum sensibilitas,
aut irritabilitas cum ægrotantis non levi detri-
mento

mentò incitetur, quod maxime ab acidulis fieri, interdum observatum est. Ideo lacte addito eas temperare student nonnulli. DESAULTIUS tubercula, a quibus semper hanc pthysim gigni ipse putat, mercurio, ferro, aut chalybe, & millepedibus resolvere nititur, quibus superbibendum radicis urticæ decoctum, & succi nasturtii aquatici, & cheræfolii singulorum binas uncias jubet, & simul equitandum leniter horis medicis (b). Tubercula cruda etiam LANCISIUS mercurio dulci septies sublimatio resolvere tentabat, sed parvis, & diu repetitis dosibus. Immo BRILLOUETIUS (c) fœminam, & virum pthysii pulmonari confirmata laborantes plane restituit sublimato corrosivo methode Swietenia, & succo nasturtii aquatici. Vires vero nasturtii aquatici adversus hujusmodi pthysim crebro usu, optimisque plerumque effectibus, quos in Lotharingia vulgo experiuntur, quam maxime (d) confirmantur.

Observatio BRILLOUETII de viribus sublimati corrosivi Swietenia methode, & nasturtii aquatici.

Formula FERNELII.

(*) FERNELII præstantissima compositio ad alvi ductionem hæc est.

R. Manna elect. unc. j.

Solv. in S. q. aqu. comm., add. aq.

Cassie decoct. unc. j.

Olei amygd. dulc. unc. j.

M. in mortat. marmor. exacte.

Dos. cochl. j. singulis iv. horis, vel j. mane, & vesp. item.

(a) DOVARIUS, & COHAUSENIUS *Essay de med. d' Edimbourg. T. IV. p. 523.* SWIETENIUS in BOERHAAV. *aph. §. 1210.*, LUDWIGIUS *Comm. de reb. in sc. nat. & med. gest. Vol. 2. p. 401.*, BISSETUS *ibid. vol. V. p. 627.*

(b) *Essays de med. d' Edimbourg Vol. VII. p. 121*

(c) *Journ. de Med. Novemb. 1777.*

(d) CLERC *Histor. natur. de l'homme. T. II. p. 35.*

§. LXXVII.

In *phthisi* vero *confirmata* (§. LVI. LX.) ; *Curatio phthiſeos confir-*
quando jam ulcus pulmonem exest, & purulenta *mata.*
labe inficit sanguinem, a venæ sectione præstat
abstinere; nisi eam dolor pleuriticus, febris ve- *An P. 54*
hemens, & difficilior respiratio, novam suppura-
tionem indicans, requirat; ulcus vero abstergere *Ulcus ab-*
mellitis, saponaceis, & sputum moventibus; cor- *stergen-*
ruptioni obſistere subacidis, vulnerariisque antise- *dum.*
pticis; & demum excitantibus, mitissimisque bal-
samicis cicatricem inducere. Sputum movendi
laude non immerito celebratur; *dulcemara*, sive *Dulcem-*
solanum scandens, cujus ex decocto WERLHOFF. *mara.*
FIUS pulmonum ulcere laborans magnum emolu-
mentum percipit, & bene (a) habuit. Magnam
enim vero puris vim expellunt aqua decocti ejus
stipites, sicque pulmonum ulcera validissime re-
purgant. Ad exsiccantia, & balsamica referri de-
bent suffitus (*) grati, & redolentes; aer siccus, *Exsiccant-*
& purus; saccharum e rosis rubris; aqua calcis *tia, &*
tam simplex, quam composita; plantæ vulnera- *balsami-*
riæ, uti sanicula, millefolium, hederæ terrestris, *ca qua*
consolida, veronica, hyperici summitates, equi-
ferum, agrimonia; aliæque id genus. Ad rosas
quod attinet, CLERICUS (b) testatum facit, in
Hispania phthisim, & febres lentas curari solitas
esse AVENZOARIS methodo, videlicet largiori usu
conservæ e rosis damascenis, lactea diætâ, & hy-
drogala potui data. Dignum profecto esset ornitho- *Lat gal-*
gaton, vulgo *lae gallina*, de quo pericula a sa- *lina, si-*
gaci, consummatoque Medico fierent. Nam a *ve orin-*
GEDEONE HARVEJO uti antacidum, abstergens, *thogalon.*
& leniter siccans ad phthisim ulcerosam (c) miri-

fice commendatur. Transylvanis in usu est hēlyanthemi, sive chamaecisti flore albo, aut aureo dilutum, quo solo; ut CRAMERUS narrat (b), phthises cum sputo sanguineo, & purulento, difficilique respiratione depellunt. Dilutum vero hoc, si fuerit saturatius, nauseam, & vomitum movet.

(a) CLERIC. *l. c. p. 35. 36.*

(*) BENETUS, WILLISIUS, NICOL. PISO &c. memorant suffituum utilitatem in Phthisi. BILLARDUS, referente LOVISIO (*Mem. de l'Acad. Royal. de Chirurg. T. V. 1774. p. 549.*), eorum excellentiam extollit, allatis observationibus. Humidos suffitus noxios censet ob laxitatem. Balsamicos vapores utiles admodum esse testatur. Ipse fumit ceræ flavæ & recentis libram unam, & par pondus resinæ communis, aut picis siccæ, aut, quæ præstat, terebinthinæ, atque hæc in terreo vase super ignem imponit in media cubiculi, parte ubi æger degit, sicque medicatis vaporibus aer imbuitur. Addi etiam potest aliquid balsami Canadensis albi, aut Peruviani, aut alius. Hisce vaporibus ipse multum confidit, experimentis felicibus edoctus. Humidos autem, & vapores etiam non damnat in tussi pectorali sicca, phthiseos veluti prodomo, in asthmate sicco, aut convulso, aut in vomica. Ex Sched. Auct.

Sicci suffitus, quales, & quando?

Quando humidus?

(b) *Id. ibid.* (c) *De art. currand. morbos expectatione p. 230.* (d) *Commerc. Norimberg. ann. 1732. p. 19. & ann. 1738. hebdom. 3.*

§. LXXVIII.

Lactis usus utilissimus.

Nihil vero utilius, nihil præstantius ex omnium ferme sententia reputatur lacte ipso cum ad acritates obtundendas, alendumque corpus, tum ad glutinandas ulcerum oras. Id jam perspexerat vetustissimus medicinæ parens HIPPOCRATES,

TES,

res, cum memoriæ proditum reliquerit : *lac tabidis dandum esse* (a); dummodo tamen non valde febricitent, nec capite doleant, ut ego interpretor, ex stomachi quidem imbecillitate; nec hypochondria elevata, scilicet obstructa, aut a flatibus distenta, habeant; nec admodum sitiant; nec quidquam aliud adversetur. Arcendos pariter ab ejus usu monet eos, qui febre acuta torrentur, qui biliosa dejiciunt, aut ob sanguinis egestionem in summo omnium facultatum languore versantur sic, ut metuendum sit, ne digeri queat, sed corrumpatur.

Quibus
noxium
lac.

(a) *Aphor. LXIV. sect. V.*

§. LXXIX.

Lac autem muliebre reliquis antecellere universim creditur, quod ab imbecille quovis, viribusque destituto, utpote tenuius, & minus caesiosum, digeratur, nec ita facile ace scat, cum ob victum animale, quo homines utuntur, natura quodammodo sua ad *alkalescendum* æque pronum existat. Hoc igitur tumpotissimum convenientius est, cum acrimonia acida vel jam præsto est, vel imminens metuitur, uti in pueris, debilibusque corporibus. Cumque tenuius, ferosius, atque etiam nostris humoribus magis affine videatur, facilius, & promptius in succum animale, & alibilem converti potest. Exsugere vero debet e mammis ipsis mulieris, ne quidquam tenuioris halitus, volatilisque principii amittatur. Mulier etiam, quæ lac præbet, juvenis, & sana sit oportet, & cibo salubri, atque ægro- tantis rebus accommodato nutriatur. Post mulie-

Lac muliebre ceteris antefere- dum. Quare?

E mam- mis exsa- gendum mulieris, quæ sana, & juvenis sit oportet.

II. *Lac* bre a nostris commendari solet *asininum*, neque *asininum* a nobis dissentit FRID. HOEFMANUS (a), qui id serosius, & majori *salis essentialis* copia præditum invenit; ideoque ad diluendum, resolvendum, abstergendumque paratissimum judicavit.

III. *Ca-* Asinino succedit ordine *caprillum*, deinde *vaccin-*
prillum. *num*; illud tenuitate, & vulneraria virtute præ-
 IV. *Vac-* stare, hoc crassitudine, & nutriendi facultate,
zinum quia plus butyri, & casei continet, certis com-
 pertum est observationibus, atque experimentis.
 His *ovillum* nonnulli adjiciunt, quod crassius,
 & caseosius, minusque butyri habens passim re-
 putatur. *Equinum* propius ad asininum accedere, communior opinio est. Seligendum ergo est illud, quod indicationibus, rebusque circumstantibus idoneum videatur.

(a) *Dissertat. de lacte asinino.*

§. LXXX.

Ordo, & *ratio sum-*
mendi lu-
ctis. Plerique arbitrantur; immo jubent ab asinino incipiendum esse, deinde ad caprillum progrediendum, tandemque ad vaccinum. Neque statim largiter dari illud oportet; sed paullatim ascendere, quasi tentando, ad eam, qua opus est, quantitatem. Si propinatum hac ratione rite digeratur, non acescat, non corrumpatur, non nauseam creet, nec vomitum, non tormina, non alvi fluxum moveat, non febrim augeat, licet largiori manu, & repetitis haustibus lac ita dare, ut ex eo solo vivat æger per aliquot hebdomadas. Quo vero facilius, & certius feratur, expiandæ primum leni medicamento viæ sunt, deinde crebris enematibus alvus aperta servanda,

Auxilia,
quibus la-
ctis usus
facilius,
tutiusque
feratur
ab ægris.

vanda; nec omittenda ea ex alkalicis, atque absorbentibus, quæ tutiora existimantur; minusque ventriculum, atque intestina gravare possunt. His enim acoris causa, si qua est, quoad fieri potest, prudenter, & provide avertitur. Id saponis tantillo præstare conantur alii; quo illud etiam assequitur, ut alvus blandissime ad egerendum sollicitetur.

§. LXXXI.

Neque desunt qui arte serosius lac reddere student; aut adiitionibus quibusdam medicantur. Desloratum hinc nonnulli propinant, alii aqua Nuceriæ dilutum; decoctis vulnerariis alii, aut saccharo, aut melli admixtum. Duplici vero nomine aquæ calcis adjectio celebratur; quod hac non modo lac a coagulatione, atque aciditate arceatur, verum etiam blandam abstergendî, exsiccandique sordida, ac impura ulcera facultatem sortiatur. Sed præ ceteris cum aquis thermalibus, aut acidulis verno, æstivoque tempore ut plurimum copulari consuevit, quâ de re consuli possunt Practicorum fere omnium non infrequentia pericula. In unum vero collectas lactis laudes, presertim ad phtiseos curationem, ejusque adhibendi methodum spectantes, qui rescire cupit, pervolvat is eruditissimam *dissertationem*; quam non multis ab hinc annis edidit Jo. MICHAL GALLUS (a) Medicus plane non ignobilis. Prætera legi merentur, quæ passim in *Consultationibus* FRANCISCI REDII, JOSEPHI DELPAPII, NICOLAI CYRILLI, JAC. BARTHOL. BECCARII, FRID. HOFFMANI, aliorumque de lactis usu,

Medicatio lactis.

Qui libri legendi de laudibus lactis & ejus summi ratione.

ejusque varia administratione doctissime traduntur (*).

(a) *Dissertazione del vero, e sicuro metodo dell' uso del latte, e suo abuso nella medicina di GIAMMICHELE GALLO.*

NOTA HISTORICA.

(*) Intimam vero lactis naturam, medicasque facultates illustrarunt non pauci, inter quos (ut CL. BECCARII opusculum *de lacte, meamque analysim* (1) præteream) non infimum locum obtinet THOMAS YOUNGIUS, A. M. Brittannus artis obstetricæ P., & FRANC. XAVER. DE WASENBERG Germanus. Illius exstat *dissertatio medica inauguralis de lacte, quam pro gradu Doctoris eruditorum examini subjecit Edimburgi 30. Novembris 1763.* Repetere eam poteris in *Tthesauro dissertationum, programmatum aliorumque opusculorum selectissimorum &c. collectorum* ab EDUARDO SANDIORTIO Vol. II. Art. XXIII. Roterodami 1769. Hujus vero *Examen chemicum lactis* insertum legitur fasciculo secundo operum minorum medicorum, & *dissertationum Vindobonæ* edito anno MCCCLXXV.

(1) Anno 1772. Papiæ edita ab auctore.

§. LXXII.

Lac nisi ratione habitæ causæ proximæ non præbendum in omni phthisi. Et si vero lac phthificis, & præsertim iis, qui ex hæmoptysi in phthisim inciderint, opportunissimum videatur, non tamen indiscriminatim cui libet ea laboranti, nec quocumque tempore promiscue dandum est. Nam præter ea, quæ ex HIPPOCRATIS monito (§. LXXXIII.) considerata primum docuimus, magni etiam interest diligenti examine disquirere, an pulmonum ulcus cum obstructione viscerum abdominalium, vel

vel cum tuberculis crudis, strumis, scirrhisve complicetur, aut ex illis suppuratis ortum fuerit. Tunc enim a caseosa lactis parte, quæ glutine, & mucagine abundat, augeri malum potest, & fieri deterius. Interdum etiam tanta puris copia ulcus scatet, ut non omne excerni per sputa possit, aut ita alte later, ut minime cum bronchiis communicet. Utroque casu sanguis resorpto pure inficitur, cacochymia purulenta colliquescit, sicque depravatus lac ipsum citissime corrumpit, novumque ex hoc fomitem suppeditari malo non pauci perhibent (a). Plerumque alvi fluxus, qui liquationem hujusmodi aut consequi, aut comitari solet, immodice, si jam præsens fuerit, incrementum, augeturque; vel, si nondum accesserit, celerrime provocatur. Nec juvat tum lacti incoqui rosas rubras, aut chalybe ignitio aquam alteratam admisceri, aut alia adstringentia adjici, ut non nulli præcipiunt. Rarum enim est per hujusmodi præsidia lactis corruptionem, alvi que profluvium, quo vires prosterunt, satis averti, aut præcaveri. Attamen si acida, aut putrida saburra in primis viis causam præbet lacti, quæ corrumpatur, interdum eccoprotica, amara, & absorbentia eam remonent, unde lac porro bene cedat. Inter amara post lenia purgantia cortex peruvianus excellit. DELISLIUS etiam prudentem emetici usum admittit (b). Satiùs tunc est ad diætam avenaceam, ad cremores hordei, aut oryzæ, ad serum lactis dulce HOFFMANNI, ad panis albi decocta, aliaque hujusce generis confugere. Lacti etiam substitui solent jura ex ranis, caudis cancrorum fluviatilium, & cane testudinum nemorensium parata, quæ ni morbum tollant, saltem efficiunt, ut quamminimùm afferat detrimenti.

Si a scirrhis, strumis, obstructionibus ulcus oriatur, vel cum vis com. plicetur; tunc lac noxium.

Item, si ulcus nimio pure scatens, vel ita profundum sit, ut minime cum bronchiis communicet.

Alvi fluxum adstringentia lacte remixta rarissime sistunt.

Quando nam eccoprotica, profunt?

Quæ lacti substitui possint utilia.

(a) RAULINIUS *Observat. de medic. sect. III. Artic. 3. & 4.* ROZIER DE LA CHASSAGNE *l. c. p. 308.* DELISLIUS *l. c. P. III. Cap. 3. p. 287.*

(b) *De la Phthisie pulmonaire P. 2. chap. 2. p. 225.*

§. LXXXIII.

*Phthisis scrophularis, & phthisi scorbutica, aut scrophulari, ut vocat, in scorbutica qua febris vel omnino abest, vel exigua vel non continua est, sputumque glutinosum, atque asth-
maticorum simile ejicitur, curationem non modo ab initio, sed morbo etiam provecto, mirifice promovent, adjuvantque pilulæ balsamicæ*

Pilulæ balsamicæ MORTONI.

Reformata ab Auct.

Sapo venetus.

Suctus antiscorbut. plantar. recens.

Cum hoc in casu (§. LXXXII.), tum in *MORTONI (*)* quæ incidendo, & resolvendo causam morbi proximam subigunt (a), extirpantque. Quoniam vero earum vis irritans aut tussim, aut phlogosim, aut febrim quandoque exasperare potis est, idcirco reformari, prout res postulat, oportune possunt. Mihi in usu est, eas ex gummi ammoniaco, & millepedum pulvere, succoque concreto hederæ terrestris, aut scabiosæ subactis componere, omissis reliquis, quæ nimium calefaciunt, & motum sanguinis concitant. Interdum sapone veneto utilissime usus sum. Hic etiam locum merentur succi recenter expressi ex plantis aniscorbuticis temperationibus, & decocta leniter aperientia ex iis, quæ pectori potissimum accommodatam existimantur.

Formula pilular. MORTONI.

(*) *R. Pul. milleped. pp. drachmas iiij. Gummi ammon. optim. depurat. drach. j. semis. Florum benzoës scrup. ij., vel drach. j. Extract. croc. balsam. Peruv. an. scr. j. semis. Balsami sulphur. Tere-*

Terebinth., vel *anisat.* q. s. *M. f. pil. mediocr.*
deaurandæ.

(a) MORTON. *Phthisiolog.* l. 3. c. 8. p. 62. GEOFFROYIUS *mater. med.* T. I. p. 100.

§. LXXXIV.

In ea verò phthisi, quæ a pulmonum atonia, *Corticis peruviani usus prodest in phth. si pulmonari, quæ ab atonia est.*
 à laxitate proficisci videtur (§§. LIV. LX,) cortex peruvianus egregia opem sæpe præstitit;
 LEBRECHTUS in se ipsu ita prospere eo usus est;
 ut neque sanguinem amplius extussiret (a), Non
 semel puris, & sanguinis sputum, quò imminens
phthisis pulmonaris non obscure significabatur, in
 iis, qui ex hypochondriaca passione in id mali
 genus inciderant, & macie jam confici cœperant,
 paullatim diluto corticis peruviani, modo sine la
Quibus præsertim conveniamodo solum, modo lacte mixtus.
 ctis additione, modo cum lacte adjecto compres-
 sum, exsiccatumque feliciter vidimus. Sed mul-
 to certius ejus mirifica virtus elucet in illis, qui
 a puerita strumosis affectibus laborarunt, si quan-
 do ad phthisiti pulmonarem inclinare observen-
 tur. Imminens enim malum *divino hoc auxilio*
 ab eisdem arceri, auctor est MEADIUS (b).

(a) Vid. *Commen. de reb. in Sc. N. & M. gest.*
Vol. V. p. 116. GEOFFROY. l. c. T. I. p. 282.

(b) *Monit., & præcept. medic. cap. 1. sect. X.*

§. LXXXV.

Neque in *phthi si confirmata* tutum est emeti
 cis (a); aut catharticis, acrioribusque diureticis
 uti. Vires enim, quæ jam propemodum fractæ
 sunt, facile his, penitusque exsolvuntur: corpus
 vero, quod undique diffluit, atque arefcit,
 magis *In phthi si confir- mata ab emeticis, catharti- cis & a diureticis acriori- bus absti- nendum.*

magis magisque liquatur, atque emungitur. Hac ipsa de causa sudorifera, proprie dicta, suspecta esse debent, & jure merito reprobantur. Novi quidem decocta ligni guajaci, sassafras, radicis *Nec tanta sudorifera proprie dicta; etsi a multis commendantis.* sarsaparillæ, aliorumque ad resolvendas congestiones, & cacochymiam serosam, aut lymphaticam repurgandam, sanguinemque purificandum a compluribus commendari; immo ad ulcera ipsa pulmonum cum detegenda, tum exsiccanda, ubi a malo totius corporis habitu, pravacue humorum colluvie permanere videntur, magna emolumenti spe adhiberi solita esse. Verum hæc humores nimium exagitant, corpus magis siccant, maciem augment, & febrim exasperant, præsertim in calido & sicco temperamento præditis & habitu gracilioribus, aut jam morbo emaciatis. *Quare reprobata?* Quapropter, si unquam, incipiente tantummodo phthisica affectione, & nondum corporis habitu destructo, & in hominibus succosioribus, & prope pituitosis locum habeant, potiusque ad antevertendam, quam curandam phthisim in usum veniant.

Si quando usum habere queant?

(a) HIPPOCR. *Aphor. VIII. sect. IV.*

§. LXXXVI.

Quæ tamen mitius agunt, quæque ex radice chinæ, similacis asperæ, arudinis montanæ, aut lappæ majoris, quam *bardanam* vulgo vocant, hordeo, carne vitulina, ranis, similibusque parantur, atque addita boragine, soncho, cichoreo quodammodo contemperantur, aut cum lacte remiscuntur, non penitus improbantur. Acritates enim diluunt, solvunt, mitigant, & per

Mitiora proponuntur.

urinæ

urinæ, ac diaphoreseos vias tutissime propellant, Nil vero antiquius, frequentiusque est, quam in phthisi ulcerosa, aut ejus appropinquantis metn balsamica medicamenta nedum a medicis, verum etiam ab imperitis quibusque & passim proponi, & temere usurpari. At plerumque apud nos ab exercitatoribus, sapientioribusque rejiciuntur, quippe quæ ventriculo nocet, febrim adaugent, calorem intendunt, & oras ulcerum inflammant. Nec a nobis dissident aliarum regionum clinici prudentiores (a), cum crebra nimium viderint exempla tristium effectum, quos genuit eorum propera, imprudensque administratio.

*Balsami-
ca impro-
bata, &
merito
rejecta.*

(a) GEOFFROY *Mat. med. T. I. p. 444.* FOTHER-
GILLIUS *Comm. de reb. in Sc. N. & M. gest. Vol.*
XVIII. Par. 3. p. 400.

§. LXXXVII.

Attamen ulcera pulmonum ita quandoque pure scatent, scordibusque obducta, atque oppleta videntur, ut balsamicis detergi, & mundificari debeant. Tanta item non raro est cacochymia purulentæ diffusio, ut eidem coercendæ balsamorum adjumento opus sit. Itaque si quando iis uti hisce de causis liceat, tutiora tantum adhibeantur, nempe mitissima; uti balsamum toltanum; syrupus balsamicus pharmacopœæ londinensis, aut terebinthinæ; terebinthina veneta leviter aquæ incocta, itemque aqua thedæ, sive de goudron, vel de catrame vulgo dicta; quæ etiam acore quodam mitissimo putridæ dissolutioni obssit. Sed nihil fere ulceribus mundandis, claudendisque, aut corruptioni cohibendæ, & præpe-

*Balsami-
cis (si
quando
conve-
niunt)
quibus
uti li-
ceat.*

dien-

diendæ aptius, valentiusque putaverim, quam camphoram liberali manu, diuque intrinsecus datam, a qua vix noxa, quam balsama afferre possunt, metuenda est.

§. LXXXVIII.

Non possunt hic silentio præteriri duo medicamenta, quibus video passim tribui antiphthisicam nescio quam facultatem, muscum nempe, sive *lichenem islandicum*, atque *elixirium vitrioli anglicum*. Quo jure ea celebrentur, non de-
Lichen Islandicus, & elixir vitrioli anglicum, a nuperis laudati.
 finiverim. Temporis potius, atque iteratæ experientiæ judicium esto. Quod attinet ad muscum, de ejus vi purgante jam BORRICHIVS mentionem aliquam fecit (a). Sed de ipsius *antiphthisica* virtute qui aliquid dixerit ante LINNEUM, non novi. Succos enim ex lichene islandico cum lacte pulmentum non ingrati saporis parare, quod adversus phthisim utuntur, ex ejus dissertatione *de usu muscorum* anno 1760. publice propugnata intelleximus (b). Primam vero coctionis aquam abjiciunt, ne alvum ducat. Verum id beneficii non lacti potius acceptum referamus. Deinde eo non modo sues, equo, & boves intra breve tempus saginari, sed etiam cum lacte decocto egregius in phthisi, rhachide: cachexia præstitos effectus fuisse in *anno secundo historico naturali Lipsie edito ann. 1769.* narat SCOPULUS, & pluribus observationibus confirmare nititur. Vim ergo ei tribuit nutrientem, & roborantem, ((c)), At peculiarem, atque insignem in eo medicam facultatem insidere adversus morbos pectoris, quando omnis inflammatio, & febris abest, repetitis periculis patuit JOHANN. HENRICO SCHOEN-

HEYDERO (d). Is enim duodecim pueros, qui ex morbillis in tussim purulentam cum dolore & oppressione pectoris, & macie, appetitu tamen integro, inciderant (oxymelle scillitico, kermes minerali, vesicatoriis pectori admotis, linimentis oleosis, theriaca *andromachi*, & cortice peruviano frustra usos), tandem musco islandico (*) pristinae sanitati restituit. Initio statim dolor imminutus est; deinde post unam, vel alteram hebdomadam omnia in melius vertebantur; donec intra quinque hebdomadarum spatium omnino convaluerint. Quibus diarrhoea movebatur (nam ab eo alvum solvi monuimus) emulsione rabica compressa fuit. Animadvertendum vero est, tusses hujusmodi, etsi sputis purulentis stipatas, post quoddam temporis spatium, quod percurrere solent, plerumque sine ulla aut certe communi artis opē sponte desinere; idque monitum, velim, ne remedio plus quam par est virtutis inesse, ab ejusmodi observationibus concludatur. Ceterum remedium acre est, atque irritans, videturque hac proprietate & alvum ducere, & obstructa referare, & urinas ciere. An hic veres antiphthificæ?

SCHO-
ENHEY-
RI obser-
vatio de
curatione
eodem
præstita.

Auctoris
monitio,
ne ni-
mum
tribuatur
laudate
observa-
tioni.

(a) *Act. Hauffnien. ann. 1674.*

(b) LINN. *Amœnit. acad. Vol. VII. n. 145.*

(c) *Ann. II. Hist. nat. pag. 107.*

(d) *Collect. Soc. med. Haunien Vol. I. p. 126.*

(*) Formula, qua utebatur, erat hæc: *R. Musci islandic. unc. j. Decoq. in aqu. communis unciis xvi. ad remanentiam unc. xii. Colaturæ adde syr- rupii scillitici unciam dimidiam. Detur unc. j. quovis trihorio. Vid. Cap. I. de Tussi §. XVI.*

§. LXXXIX.

vires elixirii vitriol. Expenduntur.

Pericula in agris a PATE instituta; ejus laudes.

Laudatur in Anglia, inquit cl. HAENIUS (a); *elixir vitriolicum in dyspnœa, & suppurationii pulmonum morbis*, Estat, in *pharmacopœa londonensi* ejus descriptio (*), quæ tincturam quamdam aromaticam exhibet, acido vitriolico quodammodo temperatam. Hinc aromatica vis quæ suspecta esse potest, acido vitriolico infringitur; & vicissim vitrioli acidum a spiritu vini aromatico, ne prevaleat, egregie edulcatur. Pericula in *phthisicis purulentis* facta adeo prospere cesserunt; ut cl. PATE Clinicus londinensis doctissimus, qui nec remedium ab initio admittere audebat; nec curationibus eodem præstitis fidem adhibebat, experientia tandem victus ejus strenuus laudator evaserit. Frequentissimus autem usus hujus *elixirii* fieri perhibetur in *phthisi*, quæ diuturniores febres insequatur, quæ linguae sorditiem, quæ virium collapsum, nocturnoque sudores habeat conjunctos, præstantiaque ipsius aliquorum annorum spatio in aliquot centenis agrotis orbi universo innotuisse (b). Datur autem istud remedium a guttis duodecim ad quinque & viginti semel, bis, vel ter in die in ea aqua copia, quæ acidum saporem vix reliquam faciat. Pueris ex melle, & aqua propinatur. In his sensim a parca dosi ad guttas xl. in singulos dies ascendi potest. Sed in remedii usu ad duos, tres & ultra menses persistere oportet, immo etiam ad annos, si morbus non omnino cesserit, & tantum imminutus sit. Angli eodem tempore adhibent decoctum *chinae cum lacte remixtum*; nec ullum noxam inde oriri asserunt, uti timeri potest a lactis coagula-

gulationi. Testatur HAENIUS pluribus annosioribus etiam *phthysicis* id remedii dedisse cum emendatione omni spe minori, sputorum autem, tussique multa imminutione; sed in primis in ea *phthysi*, in qua inflammatoria, & suppuratoria materies universi corporis in integros pulmones colligitur (§. LX.), sputorumque forma ejicitur, plurimum prodesse, hancque sanguinis diathesim patenter elixirio hujusmodi emendari, multiplici exemplo comperisse. (c).

Laudes-
jus aliis
HAENII
periculis
confir-
mata.

(a) Rat. med. P. XII. cap. VI. pag. 239.

(*) R. Tinctur. aromat. M. lib. j. Spirit. vi-
triol. fortis, olei dicti P. unc. iv. M. gradatim,
& postquam fæces subsederint, per chartam cola.
Tinctura vero aromatica sic paratur.

Formula
elix. ve-
trioli
pharma-
cop. lon-
din. &
Tinct. a-
romat.

R. Cinnamom. drachm. vj. Semin. cardamom. mi-
nor. decorticat. drachm. iij. Piper. long., Zingib.
singulor. drachm. ij. Spirit. vini tenuioris m. lib.
j. Digere sine calore, & cola.

(b) HAEN. *ibid.* p. 243. (c) ID. *ib.* p. 250.

§. XC.

Nec deficient suæ laudes juribus, & carnibus
viperarum peculiari artificio paratis (*), quid-
quid non experti de earum medicis viribus con-
tra sentiant nonnulli vel celeberrimi (**). Plu-
ris enim faciendam ducimus GALENI (a), ARE-
TÆI, (b), ANTONII MUSÆ (c), CÆLII AURE-
LIANI (d), MEADII (e), MORGAGNII (f), HAE-
NI (g) aliorumque complurium auctoritatem; at-
que experientiam, quam derisorum quorundam
ineptias. Neque in *phthysi* solum incipiente, quam
cachexia, aut cutanei ulcerosique morbi foverint,
sed in *confirmata* etiam atque, in *abscessibus in-*
ternis

Jura, &
carnes vi-
perarum
commen-
dantur;
& defen-
ditur eo-
rum usus
auctori-
tate, &
ratione.

ternis viperarum usus mira præstat, ut observatibus loculentissimis, præsertim MORGAGNIUS (b), & HAENII (i) edocemur. Vis enim iisdem inest analeptica, nutriendi; roborans, lenissime diaphoretica, qua vires, & color, & nutritio redintegrantur, sanguinisque vitia, atque acritates tolluntur.

*Methodus
veterum
utendi
viperis.*

*Methodus
superiorum.*

*Juris &
carnium
usus præ-
stans.*

(*) GALENUS vel *vinum*, in quo *viperæ* macerate essent, vel *viperas in olla coactas* anguillarum in modum adhibebat. ARETÆUS *coactas, & sale, oleoque conditas* in cœna obsonii loco dabat. Edendas pariter (fortasse piscium instar coctas) ad ulcera persananda jubebat ANTONIUS MUSA, qui in Italia AUGUSTI medicus degebat, quique id remedii a CRATERO, cujus forte discipulus fuit, ut putat MEADIUS, didicisse videtur. *Pulverem* nostri, & *jura* conficiunt. Sed in pulvere vix ulla vis superest. Non ita in *jure*, & *carne* ex viperibus recentibus. Decoquitur *viperæ* dimidium, vel tota cum pulli aut vituli carnibus vase clauso in balneo maris cum ea, quæ par est, aquæ quantitate, & jus inde factum propinatur mane vel vespere, vel utroque tempore ad longum tempus. Addunt alii ranas, vel testudinis terrestres carnem, vel plantas morbo accommodatas; sed etiam sine his suas exferunt vires viperæ. Carnes vero conciduntur, & concisæ cum pane trito, carnibus tenerioribus minutum dissectis, & ovi albumine commiscantur, proutque in modum coquitur, & *usu* dantur. MORGAGNIUS, quem imitatus est HAENIUS, viperæ carnes a decocto reliquas cum saccharo, quod vocant, rosato veteri subigi, & dari curabat, eique superbibi jus, quod decoctæ suppeditaverant.

(**) Vide *notam* * ad §. CXLII. Vol. III.; in hac enim auctor contra vituperatores hujus remedii, inter quos etiam cl. TISSOTIUS, ejus præstantiam vim pluribus persequitur, ac defendit.

(a) De *simpl. medicam. facult. lib. II. cap. 1.*

(b) De

§. C.

Similia propemodum patitur is, qui *pleuritide* *Pleuritis*
& ejus
nota. correptus fuerit. Nam a GALENI usque temporibus (a) hæc in pleuritide concurrere crediderunt; febrem acutam continuam; difficilem respirationem; tussim molestantem; sputum crudeum, interdum cruentum, aut striis sanguineis variegatum; pulsum durum, & *serratum*; & dolorem non profundum, nec obtusum, uti in peripneumonia, sed acutiorem, & sæpe pungentem in aliqua thoracis parte, aut in alterutro latere, quavis inspiratione, & tussis concussione ita exacerbantem, ut inspirationem, & tussim ægrotantes præ dolore cohibere cogantur, qui dolor modo febrem antecedit, modo subsequitur, prout nimirum *pleuritis* primaria est, aut secundaria. Hinc *pleuritidis* peculiaria symptomata, quibus, si minus definiri, describi certe potest, a CULLENIO sic enumerantur: *pyrexia*; *dolor lateris pungens*; *inspiratio dolens*; *decubitus*, plerumque in *latus* *Patho-*
gnomi-
cum si-
gnum do-
lor, &
vehe-
mens. *affectum*, *molestus*; *tussis dolentissima*, *initio sicca* postea *humida*, sæpe *cruenta* (b). Dolor ergo vehementior, & semper præsens differentiam, si ullam, facit inter *peripneumoniam*; & *pleuritidem*.

(a) RIVERIUS *Prax. med. lib. VII. cap. 3.*

(b) *Gen. morb. Ord. II. Phlegmas. gen. 12.*

§. CI.

Pleuritis tamen lateris, aut pleuræ costas succingentis inflammatio habita a plerisque fuit, ut *De sede*
pleuriti-
dis dis-
sensus.

eam a *peripneumonia*, quam in pulmonibus inflammatis locabant, apposite distinguerent. Alii vero, cum utramque *pulmonum* esse morbum dissectione cadaverum (a) cognovissent, causam quærentes, cor in altera dolor nullus, aut obscurus tantum esset, in altere vero atrocissimus sæviret, sibi eam visi sunt convenisse in loci affecti diversitate. In exteriori enim pulmonis ambitu, quem a *pleura* involucro sensibiliorem putabant, *pleuritidem* collocandam duxerunt (b); *peripneumoniam* vero in interioribus pulmonum recessibus, quos obtusiori sensu præditos ob *pleuræ* ibidem defectum credebant. Verum nec *pleura* tanti doloris sedes esse potest, cum paucos, aut nullos nervos habeat, nec a *pleura* ideo pulmo sensibilior est, neque interiores ejus partes, quas nervi copiosius perreptant, obtusiori sensu donantur. Discrimen igitur omne inter *peripneumoniam*, & *pleuritidem* cum doloris atrocitas fa-

*Pleura
non est
sedes do-
loris acu-
tioris in
pleuriti-
de.*

*Unde a-
trocitas
doloris
criatur,
probabi-
lior con-
jectura.*

*Vana hy-
pothesis,
bronchia-
lem in
pleuriti-
de, in pe-
ripneu-
monia
vero pul-
monarem
arteriam
magis in-
flamma-
ri.*

ciat, verosimillimum cum MICHAELE SARCONE arbitramur, in illa plerasque pulmonum partes minus sentientes, lentiusque ab inflammationis causa affici; in hac vero aliquam ex illis, quæ exquisitiori sensu donantur, nervisque insignioribus instruuntur, quales interiores esse videntur; aut proximius, vehementiusque ab acri inflammatorio nervos ipsos attingi, & vaxari. Quid ergo opus est, ut nonnullis placeat, sibi cingere, in *pleuritide* arteriam *bronchiale* magis, in *peripneumonia* *pulmonarem* potius inflammatio-
ne tentari (An ita distinctæ sunt harum arteriarum distributiones, ut sejunctim procedant? ut nullibi inter se communicent? ut nullibi sibi mutuo jungantur?

(a) Vid. ZECCH. l. II. de corp. human. structur. & atque

aeque *Append. consult. med.* 26. LINDESTOLP. de *venen.* p. 314.; quibus accedit MORGAGNIUS cum plerisque recentiorum.

(b) Inviictissima vero argumenta, quibus demonstratur, *pulmonem* esse *pleuritidis* sedem, legantur apud TISSOTUM in *Epistola* ad cl. HIRTZELIUM pag. 28. & seqq. Ex sch. auct.

§. CII.

Non tamea inde inficiamur, *pleuram* interdum rubescere, & quaquaversum inflammari, quod sane ex innumeris cadaverum sectionibus comprobari facile potest; sed solum contendimus, eam ob fere nullum, aut plane modicum, quod donatur, sensum tanto dolori excitando, quantus in pleuriticis (§. XCVIII.) esse consuevit, ineptam prorsus esse; nec tantam spirandi difficultatem, nec tussim, nec sputum copiosum, & cruentum efficere posse, nisi simul pulmo, aut nervi per posteriora cellularia spatia decurrentes, aut muscoli intercostales una afficiantur. Compertum enim est iteratis observationibus, quando *pleura* sola inflammatione corripitur nec dolorem adeo acutum esse, nec inspiratione (quia inspirando ipsa potius laxatur) exacerbari, nec tussim adeo frequentem & molestant excitari, immo saepe eam abesse (a). Immo non desunt cadaverum sectiones a viris celebrioribus institutae, ex quibus patuit, inflammatae quidem *pleurae* fuisse, quin tamen ullum dolorem questi fuerint ægrotantes (b). Hanc *pleurae* inflammationem multi cum veterum, tum nuperiorum aperte docent; *veram* proprie *pleuritidem* esse, quod *pleura*, a qua nomen eam accipere arbitrantur, reapse insideat. Rarissimum esse morbum ultro quidem fatentur, ne-

*pleura
inflam-
matio.*

*Inepto
per se
acutissi-
mo pleu-
ritico
dolori
excitan-
do.*

*Inflam-
matio
pleurae
absque
dolori.*

*An hac
vera
pleuritide*

que mirum videri ajunt, si sectio cadaverum ostenderit, raro in *pleuritide* pleuram inflammata[m] reperiri. At in *pleuritide* hac cuncta ne *pleuritidi* propria symptomata (§. XCVIII.) occurrunt? An tanta doloris acerbitas, an tanta spiritus difficultas? an tussis, sanguinisque expunitio, ut vera *pleuritis*, qualem clinici describunt (§. C.), dici possit?

(a) ZEVIAN. *Della parapleuritide cap. III. p. 30. 31.*

(b) FRID. MEDICUS *Collect. observat. med. T. I.*

§. CIII.

Mediastini inflammatio, cujusque symptomata. Interdum *mediastinum* seorsum inflammationi subjicitur, morbusque *pleuritidis* instar affligit. Eo inflammato, plerique affirmant dolorem cum reliquis *pleuritidis* symptomatibus (§. XCVIII.) *mediam* fere, atque anteriorem pectoris regionem excruciare, si videlicet anterior *mediastini* pars, qua sterni adnectitur, inflammatione correpta sit; posteriorem vero, si posterior spinæque proxima; vel utrumque locum, si utraque pars afficiatur. PETRUS vero SALIUS DIVERSUS (a), qui in hujusce morbi signa plurimum inquisivit, animadvertit, *angustiam, & offendiculum quoddam ad sternum*, dum ægri inspirant, potius percipi, quam dolorem (quod sane exiguæ *mediastini* sensibilitati rite respondet); atque, ubi dolor reapse affligit, neque insignem, neque vehementem esse; *spirationem* vero frequentem admodum, & celerem, non tamen valde difficilem, aut anhelosam. Præterea asserit, se vidisse, ejusmodi ægros *febri acuta detineri*, ad quam accedebat magna jactatio, atque ingens sitis, & cetera,

Mediastini inflammatio, cujusque symptomata.

signa ejusdem a P. S. ALIO DIVERSO de prompta.

tēra, quæ febres ardentes comitari solent; in thorace maximum incendium conqueri, unde & frigidum aerem inspirare desiderarent, & calidum spiritum resfarent; tussī omnes vexari, sic- ta in principio plerūque, deinde humida; quæ excernebantur colorata, vel rubra, vel flava; plurima flavi coloris, paucissima rubri; pulsum- que eos præferre, qualis pleuriticorum esse so- let. Remque peculiari observatione cujusdam æ- grotantis, cujus sectionem affert, illustravit; ad- dens, syncopem tum concurrere, cum inflamma- tio mediastini ad pericardium se diffuderit. Pe- ricardium etiam, immo cor ipsum per se, & se- junctim inflammatur interdum. Quod ubi in- cidit, præter dolorem & anxietatem, æger pati- tur frequentes lipothymias, atque ingētes æ- stuationes; febrem acutissimam; sitim ardentem, immo ardentio- rem, quam in pleuritide, & pe- ripneumonia (b). Pulsus vērō sunt vehementes, celerrimi, inæquales; & quandoque intermit- tentes (c). Neque rarum est, pulmonum inflamma- tionem ob partium contiguitatem, aut connexio- nem ad plenam, diaphragma, mediastinum, pe- ricardium, atque ad cor prodagari; & contra ab his ad pulmones protendi, & pro locorum, & partium, quæ afficiuntur, ratione magnam dolo- ris atrocitatem, tussim assiduam ac vehementem, orthopnœam, delirium, singultum, convulsio- nem, miras pulsum perturbationes, summamque anxietatem subsequi. Id mali genus, quando tot partes simul occupantur, a quibusdam appellatur pleuroperipneumonia (d); sensu nimirum latiori, quam passim (§. CXII.) hoc nomen accipi so- leat.

Pericar-
dii, &
cordis in-
flamma-
tio; eju-
sque si-
gna.

Inter-
dum a
pulmone
ad reli-
quas par-
tes, &
ab his ad
pulmo-
nem in-
flamma-
tio pro-
pagatur.

Tunc
pleurope-
ripneu-
monia a
nonnullis

(a) De affect. particular. cap. vi.

(b) Ibid. dista.

(c) RIO-

(c) RIOLAN. *Enchirid. anatom. med. l. 3. p. 206.*

(d) HALLERUS *opusc. patholog. obs. 13.* MOR-
GAGNIUS *de sedib. & caus. morb. epist. anat. med.*
XX. & XXI. HAENIUS *Ratio medend. P....*

§. CVI.

*Signa
pleuriti-
dis reli-
qua.*

*Varia
doloris
ratio.*

*Causa
varietas
sum do-
loris ab
HIPPO-
CRATE
assigna-
ta.*

Etsi autem multa cum peripneumonia commu-
nia habeat *pleuritis*; in hac tamen, ut supra di-
ctum est, acutus & lancinans dolor urget, in
primis si sinistrum latus laboret,isque modo sur-
sum ad jugum, modo ad claviculam, modo ad
omoplatam, modo deorsum ad præcordia, siue
hypochondria procurrit, modo in utroque latere
sedem figit. Interdum tunc solum se exserit,
cum æger in dexterum, vel sinistrum latus re-
clinatus fortiter inspirare, aut tussire jubeatur.
Eum enim ut inspiratio, & tussis præsentem ad-
auget, sic abditum, & latentem excitat, deteg-
gitque. Quando id evenit, *occultam* discunt *pleu-
ritidem*. Causam vero, cur dolor ad varia lo-
ca percipitur, aut propagatur, secundum HIPPO-
CRATIS mentem in *Coacis prænotionibus* (a) hi-
sce verbis affertur: *Quibus ad unam claviculam*
*dolor subit, iis una superior pulmonis ala labo-
rat: quibus vero ad ambas claviculas dolor ex-
tenditur, amba superiores pulmonis ala laborant:*
quibus ad mediam costam, media: quibus vero,
ad quam partem pulmo extenditur, dolor per-
meat, inferna ala laborat: quibus una tota ala
laborat, quæ ei parti respondent, omnia agrotant.

(a) N. 400., & alibi.

§. CV.

In ipsa febris accessione, quam sæpe horror, & rigor antecedit, subsequiturque calor, & sitis, quandoque vomitus, aut vomendi conatus infestat, atque urinæ tenues, multæ, postea paucæ futuræ & rubræ, redduntur. Respiratio est frequens, & parva, immo difficilis, sed non semper ita, uti in peripneumonia. Difficilis quoque ut plurimum in sanum latus decubitus; tunc enim difficilior redditur inspiratio, increscit tussis, atque anxietas, & sæpe etiam dolor recrudescit. Quod facile explicatu est. Pulmo enim inflammatione affectus tumet, & descenditur, & ob congestionem solidior, graviorque est. Si in sanum latus reclinatur, mediastinum urget, impellit contra pulmonem liberum, eum comprimit, coarctat, irritat, sic ut respirationi minus servare possit. Hinc difficilior sanguinis per pulmones trajectio, a qua tussis, atque anxietatis augmentum. Quando vero dolor simul invalescit in hujusmodi decubitu, probabile est id evenire ob aliquam pulmonis cum ipsa pleura adhesionem; pondere enim suo pulmo, dum ad latus sanum reclinatur, qua pleuræ adhæret, distratus, & quasi discerptus magis etiam doleat oportet; eoque vehementius, si plura & muscoli intercostales, quibuscum concrevit, inflammatione una affecti sint. Pulsus vero, ut supra posui, plerumque durus & *serratus* est; nunc magnus & vehementer; nunc parvus, debilis, & inæqualis; nunc etiam mollis, undosus, & bis feriens.

*Alia sympto-
mata ex-
plican-
tur.*

*Cur diffi-
cilis in
latus sa-
num de-
cubitus?*

*Pulsuum
natura.*

§. CVI.

*Sputorum
varietas
secun-
dum va-
rios mor-
bi gra-
dus.*

Initio vel nihil, vel tenuis tantum pituita ; vel crassum quid & tenax, & rotundum extussitur, sanguine tamen plerumque tinctum. Procedente morbo sputum facilius & copiosius educitur, atque ex liquido crassius, ex cruento albidius fieri incipit. In stadio, cui *status* nomen est, concoctum, album, æquale, levans, evadit. In declinatione denique dolor, febris, tussis, & spirandi difficultas sensim evanescent, signis co-

*Quando
pleuritis
in peri-
pneumo-
niam
transire
dicitur.*

ctionis in omnibus excretis apparentibus. Contra vero si inflammatio (nequidquam natura, atque arte reluctantis) ingravescat, latiusque pulmones occupet, aut ex pleura, & latere thoracis, quo incederit, ad pulmones metastasi feratur, tunc *pleuritis* in *peripneumoniam* migrare dicitur, Infarctis enim glutine inflammatorio pulmonibus, plerumque non solum dolor sensu quodammodo obruto, ac retuso se remittit, & respiratio bre-

*Pessimis
congestio-
nis effe-
ctus.*

vis, sublimis, orthopnoica evadit, pectus opprimitur, ac ebullit & stertit; verum etiam sanguis in ventriculo, auriculaque cordis dextera, & venæ cavæ truncus restitare, & congeri coactus obicem refluenti ex quacumque pectoris plaga humori opponit. Vi autem cordis in vasa pulmonaria sic oppressa adactus ea dilatat, ex poris inorganicis, aut ex lateribus vasis mucosum glutem exprimit, loca omnia obstruit, ac replet; unde vesiculæ aeræ compressæ nec dilatari possunt, nec circuitum per pulmones adjuvare, & promoveri. Hinc interrupto vitali sanguinis circuitu

*Suffoca-
tio, &
mors.*

vitam subita suffocatio, & mors excipit, antequam suppuratio, aut gangræna consequatur. Præ-

terea

terea in tanta pectoris anxietate, & viarum interceptione mucosus humor undique per exhalantia vascula copiosius extillat, non vero ab absorbentibus recipi potest; cum plenissima sint; quo fit, ut circa pulmones, mediastinum, pleuram, pericardium & cor collectus, frigidato post mortem cadavere concreascit, & dissectoribus deinde sub muci cujusdam puriformis specie, quo partes illæ plus minus obducuntur, sese exhibeat. Immo quandoque ob circuitum sanguinis sic retardatum & quasi cohibitum serosa ejus pars a reliquis secedens in cavum thoracis exsudat; hydrothoracem (*) peripneumoniam adjiciens (*hydro-pneumoni-
am* vocant), & pressis undique jam laborantibus organis spiritum, & vitam elidit. Quod ubi evenit, urinæ parcius fluunt, aut supprimuntur, inexpectata supervenit anxietas, atque tanta spirandi difficultas, quæ intra paucas horas suffocet ægrotantem. Quod vero ad sanguinem e vena eductum attinet, is tam in *pleuritide*, quam in *peripneumonia* postquam refriguit, concrevit in massam duram, coherentem, & paucio sero circumdatam. Plerumque si non in prima venæ sectione, sane in altera, aut tertia ad summam superficiem apparet mucosa albida quædam crusta, quam vocant *inflammatoriam*; interdum ita coriacea, compacta & concreta, ut vix dividi, aut pertundi possit, & in medio concava, circum retorta sursum, & reflexa videatur. Interdum non alba est, sed flava, & subviridis; interdum cinerea, aut ex albo, & coccineo colore coalita. Rubent quoque maculæ rosæ, & macula, multo frequentius ex eo latere in quo inflammatus pulmo est. Nec linguæ inspectio est negligenda, nam præter siccitatem, & sitim,

Post mortem circa præcordia concretiones.

Hydrothorax peripneumonia quando adjici-
tur.

Ejus nota præcipua.

Crusta sanguinis inflammatoria.

Malum morborum.

Lingua & sitim, quæ acutos morbos comitari solet, ejus
albedo, & asperitas. albedo & asperitas animadversionem merentur.
 HIPPOCRATIS In Hippocraticis quippe oraculis scriptum est; In
aphorismi. pulmonis inflammatione, si lingua tota alba fiat,
 & aspera, ambæ pulmonis partes inflammatione
 vexantur: quibus vero dimidiata lingua, qua
 parte id apparet, inflammatio affligit (a).

(a) COACAR. n. 400.

(*) STORCKIUS, MONROOUS, SCOMINHERUS,
 & ZIMMERMANNUS (Tom. p. 31.) tradunt, sæpè
peripneumonice accedere *hydrothoracem*, & vicissim
huic peripneumoniæ. Ex fch. auct.

§. CVII.

Causa remota peripneumonice & pleuritidis.

Causæ, quæ utramque (§. XCVII.) gignunt, sunt illæ ipsæ a nobis alias recensitæ, a quibus reliquæ oriuntur inflammationes; sed in primis vehemens corporis, pectoris, pulmonumque exercitatio, tempestate potissimum rigente, aut æstuantē, aut aere ventis exagitato; potus frigidissimus excalefacto corpori ingestus; repentinæ austrinarum constitutionum in boreales mutationes; catarrhi & rheumata graviora neglecta; hyemale & vernale tempus*; venenati, caustici, adstringentis, coagulantis, vel cujusvis incogniti principii acris, miasmatis, vaporis, halitus inspiratio, aut ingestio; metastases morbigenæ materiæ, morbi pectoris prægressi tum acuti, tum chronici; phthisis; asthma; hydrothorax, respiratio diutius compressa aut cohibita; prava thoracis, & pulmonum constitutio; ac demum peculiaris sanguinis diathesis, quam inflammatoriam vocant, licet hæc quandoque non causa: sed inflammationis effectus esse possit.

(*) Ver-

(*) *Vernales, & hiemales* multum inter se differre pluribus demonstratur in *Comm. de reb. in Sc. nat. & Med. gest. Vol. VII. P. I. p. 155. Videtis. Ex sch. auct.*

§. CVIII.

Peripneumonia, & pleuritis, quas hactenus descripsimus, *vera, exquisita, & legitima* appellantur. Extant vero etiam *notha, sive spuria* ex eo ita nuncupata, quod nec gradu, nec symptomatum numero illarum adæquent gravitatem. Interdum tenuis & acer humor, sive lymphæ tenuis & acris confertim in pulmones illabitur, & catarrhi instar ardorem præter naturam excitat, æstum, & febrim inferens. Tunc & tussi, & spirandi difficultate, lenta febre conficitur æger sine cruenta exspuitione, sine abscessu, aut ulcere. Hanc cum veterum plerisque *peripneumoniam spuriam* esse tradit NICOLAUS PISO (a), ab *exquisita, sive vera* tum ratione causæ, tum symptomatum mediocritate plane diversam.

(a) *De cognoscend. & curand. morb.*

§. CIX.

Est alia *peripneumonia notha, sive spuria species*, quam cum RIVERO (a), & SENNERTO (b) *pituitosam* licet appellare, quia a crassa, viscida, & lenta pituita in pulmones ruente, eosque interficiente videtur oriri. Senes verno ut plurimum tempore corripit frigidos, pituitosos, vino deditos, aeremque palustrem incolentes, cachecticos præsertim, qui hieme perspiratione usi sunt. Hæc exorditur a tussi catarrhali, non tamen assidua,

rau-

raucedine, frigore, & calore se mutuo excipientibus; febre quidem manifesta, sed mitiori senioreque, quam in *peripneumonia vera* esse solet.

*Ejusdem
notæ.*

Pectoris oppressio; pondus; obscurus, & gravativus dolor; sputum album, viscidum, spumosum; raro cruore conspersum; pulsus mollis, non valde creber, sæpe parvus; & debilis; sitis exigua; lingua mucō albo obducta sunt ejus reliqua symptomata, quibus plerumque adjungitur soporosis

*Peripneumonia
notha
SYDENHAMI.*

somnus. Hanc credo observatam esse a SYDENHAMIO (c), seduloque sub *peripneumonia notha* nomine descriptam. Sed ipse animadvertit, monetque; agrotantem in ea vertigine etiam tentari; caput ei inter tussendum dissilire videri, doloribus toto pectore passim vexari; vomitu omnia, quæ bibuntur, rejicere, & sanguinem e vena missum crusta pleuritica contegi. *Peripneumonia*

Alia notha nomen a BOERHAAVIO ei quoque tribuitur *BOERHAAVII*. pulmonum infarctui; qui plerumque morborum finis esse consuevit, mortemque communiter antecedit. At SYDENHAMII ut incertum, & dubium

utraque morbum rejicit LIEUTAUDIUS (d), & BOERHAAVIO opinioni non subscribit, nemini, ubi occasio tulerit, parcere solitus.

(a) *Prax. med.*... (b) *Præf. l.*... P...
(c) ... (d) ...

§. CX.

*Pleuritis
vera, &
spuria
quorumdam.*

Qui *pleuritidem* in pleuræ, & lateris inflammatione (§. CI.) consistere docent, hi (*) *veram* repetunt a pleura, & musculis intercostalibus externis inflammatis; *spuriam* vero habent eam, quæ a musculis intercostalibus externis in-

flam-

inflammatione correptis pendeat. Verum tanta est
 earum partium propinquitas, & connexio, ut vix
 seorsum inflammari possint, aut certe si id acci-
 derit, non facile singularum morbus distingui.
Pleuritidem igitur *notham* vocabimus eam inflam- *Pleuritis*
notha
qualis
auctori.
 mationem, quæ latus ipsum occupat, musculos
 in primis intercostales, eorumque involucria; ne-
 que multum interest quærere, an simul pleura
 ipsa, quod probabile est & interdum accidit, af-
 ficiatur. A *vera* enim *pleuritide* (§. XCVIII. ad *Diagno-*
sis.
 §. CVIII.) longissime abest *spuria* hæc, quod in
 hac dolor tactu, pressioneque ingravescit; æger
 in latus effectum ob doloris incrementum nequit
 decumbere, commodius in sanum convertitur; *Decubitus*
difficilis.
 interdum exteriora tument, calent, & non raro
 ruborem etiam aliquem exhibent, Febris, & spi- *Externus*
tumor.
Febris
ratio.
 randi difficultas minor est, quam in pleuritide
 vera, neque pulsus adeo durus est, & *serratus*. *Respira-*
tio qua-
lis?
 Tussis vel nulla, vel exigua & sicca, nisi una
 concurrat pulmonum labes, esse consuevit. Immo *Tussis*
qua?
 ZEVIANUS *tussi* & *sputum* abesse a *pleuritide* *Interdum*
nulla
tussis.
pleuram occupantem affirmat (a), quod ego quo-
 que non semel observavi.

(*) Inter hos primi veiunt RIVERIUS, LOM-
 MIUS, NICOLAUS PISO, & SENNERTUS.

(a) L. cit.

§. CXI.

Quibusdam (*) *pleuritis notha* est etiam *dolor* *Alia*
pleuriti-
dis spu-
ria spe-
cies.
Rheuma-
tica.
lateris rheumaticus, quem plerumque aliarum par-
 tium, ut cervicis, scapularumque dolores vagi an-
 tecedunt, nullaque, aut certe exigua, atque ex
 lymphaticarum genere febris adesse solet. Dolor *hic*

Scorbutica, venerea, hypochondriaca, flatulenta.

Gastrica.

Verminosa.

hic pressione, inspiratione profundiori, & trunci motibus recrudescit quidem, & crescit, non tamen tussim movet, nisi cum tussi catarrhali morbus copuletur; aut tussim siccam movet tantum, & sine sanguinis sputo. Quo spectant *dolores laterales scorbutici, venerei aut hypochondriaci*; aut *flatulenti*, sub costis spurii defixi, qui febre carent, & sæpe vagi, ac incertæ sunt sedis. Huc quoque refertur illi lateris affectio, sive *notha pleuritis*, quæ ex cruditatibus primarum viarum, cibis crassis, & pituitiosis, fungis, bulbis, aliisque similibus ventriculum, & intestina irritantibus, ac per consensum loca superiora afficientibus oriuntur (*a*): *Pleuritis* quoque *verminosa*, nempe a verminibus orta huc spectat, quæ profundius hypochondria excruciat, sympathiceque pectus, & quandoque pulmones affligit. Nec desunt, qui *pleuritidem spuriam* vocant quemcunque dolorem, qui costas spurias tenet; divexatque; quia illuc neque pleura, neque pulmo perveniunt.

(*) Hæc est *Pleuritis notha* PLATNERI, LIEUTAUDII, aliorumque.

(a) Vid. NIC. PISO *de cognosc. & curand. morb. lib. II. p. 186.*

§. CXII.

Pleuroperipneumonia BARONII. Pleuritidis differentia.

Fieri etiam potest, ut *pleuritis* (§. CX. CXI.) cum ipsa peripneumonia tum a principio, tum in progressu conjungatur, conficiatque morbum, quem VINCENTIUS BARONIUS (*a*) speciatim & pressius *pleuroperipneumonia* vocavit. *Pleuritis* porro ratione loci, quem dolor tenet, dividitur in *ascendentem & descendentem* (*b*), item in *posteriorem, sive dorsalem* (*c*), & *anteriorem*.

Hir.

HIPPOCRATES (d) aliam etiam proponit pleuritidis differentiam, qua in *siccā*, & *humidā* distinguitur. Pleuritis præterea æque ac peripneumonia vel est *primaria*, vel *secundaria*, vel *symptomática*. In secundariis, aut symptomatice principes sunt *putridæ*, *biliosæ* (*), *gastro-arthritica*, *phthisica*, *exanthematica* (**), *miliaris*, & *symptomática*. *variolosæ*, *morbilosæ*, *ardentes*, *convulsivæ*, *catarrhales* (***), *periodica*, *metastatica*, *hydrothoracica*, *lactea*, *lochiales*, & sic porro. Quanquam vero ex his, quæ *biliosæ* dicuntur, ut plurimum sint *secundariæ*, & *symptomatiæ*, interdum tamen *primariæ* sunt, & cum ipsa febre incipiunt. Talem descriptam legere est apud cl. GUIDETTUM (e), qui animadvertit, in ejusmodi *biliosis pleuritidinibus* dolores fuisse vagos; tussis siccas, & molestas cum paucō sputo seroso, vel subflavo, vel subcruento & spumoso, difficillime & nonnisi per magnum tussendi conatum ejiciendum; pulsus valde celeres & frequentes, calorem intensum; genarum ruborem roseum; anxietatem vehementem; sitim permolestam; vigilias, & jactationes assiduas. Sanguis in his missus semel, iterumque eleganter rubellus remanebat; & ægri post sanguinis missionem in deterius ruebant. Quinta autem peribant. Non secta vena, septimo, nono, aut undecimo moriebantur. Sola emesis remedio erat. Hiems frigida præcesserat, & vel austrinum successerat. *Erysipelatodes* fuisse auctor laudatus arbitrat (f).

Sicca, & humida juxta HIPPOCRATEM.

Primaria, secundaria, & symptomática. Quæ secundaria.

Biliosa pleuritis interdum primaria est.

Ejus signa a GUIDETTIO descripta.

(a) De pleuroperipneumonia &c., HAUXAMIUS des plures &c. p. 305. DEPLAIGNE Recuil d'observationis de medecin. &c. Juillet 1757. T. 7. p. 168.

(b) HIPPOCR. II. acutor.

(c) Id III. de morb.

(d) Id. I. acutor.

(*) De

(*) *De pleuritide, & peripneumonia biliosa* vid. TISSOT. *Epist. ad ZIMMERMANUM*; MORGAGNIUM *de sed., & caus. morbor.*; MANETTI *consulto con annotaz. e giun.*; ANGELUM GALLI *adversaria medica*; DALLARMIIUM *saggi di med. pratic.*; ALOYSIUM TARGIONIUM *gazzetta salutar. n. 12. 13. 14. &c. an. 1783.*, præter BAGLIVIIUM, LANCISIUM, SYDENHAMIIUM, laudatum GUIDETTIUM, aliosque bene multos. *Ex sch. auctor.*

(**) *De secundariis exanthematicis suis locis* noster Auctor opportune differit. Videtis *de morbillosa Vol. II. §§. 135. 146. De variolosa ibid §§. 249. 254. 276. &c. Item de miliari nonnulla eod. vol. §§. 403. 405. 408.* Omnia huc transferre licet, utpote *primariæ* etiam accommodata. *Editor.*

(***) Vid. *Vol. I. de Feb. §§. 346. 356.*, & alibi, ubi de *intermittentibus* eodem volumine sermo est.

(e) *De pleuritide biliosa dissertat. II.*

(f) *Id. ibid.* Vide etiam DEPLAIGNIUM *l. c.*, a quo tum *semptomata*, tum *curatio morbi* describuntur. *Ex sch. auctor.*

§. CXIII.

*Benignæ,
& mali-
gnæ.
Peripneu-
monia
gangre-
nosa.*

Aliæ item dici possunt *benignæ*, aliæ *malignæ*, prout signis malignitatis carent, aut stipantur. Ad malignas refertur peripneumonix genus, quam ob celerem in *gangrænam* transitum *gangrenosam* (a) vocant. Plerumque epidemica est interdum uni tantum hominum generi, aut loco, aut domui, aut cœnobio infesta, & sæpissime lethalis. Hæc a miasmate venenato, aut putrido, aut e caustico quodam acri, & siderante principio pulmonibus inspiratio, ac adhærente, aut sanguini primum infuso, & postea per febrim moto, & ad pulmones delato, quod eos celerrime sensibilitate. atque irritabilitate exuit, oriri videtur.

Sæpe

*signa
ejus.*

Sæpe a bile corrupta, aut primis viis adeo infectum, & necroticum principium suppeditatur. Sed plerumque tunc *symptoma* est febris *gastrica*, aut *biliosa*. Ægri ea correpti queruntur de immenso pectoris pondere, difficillime respirant, tussunt, plerumque nihil exspuunt, aut tantum biliosa siccera, admodum liquida, spumosa, minime cocta, interdum etiam saniem fere subatram. Nonnulli vix tussunt, suspiria tamen trahunt, ut anxietatem, & pondus, quo opprimitur pectus, quodammodo sublevant, luctum facie, atque oculis præseferentes. Pulmones tunc videntur, sensibilitate jam, atque irritabilitate destructa, propemodum emori, & vitam emittere. Pulsus insuper habent initio validos, sed mox debiles, languidos, interdum raros, ac inæquales. Non raro exanthemata superveniunt maligna, & peticulæ violaceæ. Quod communius est omnibus malignis morbis, huc etiam non deest, nimium virium languor.

Interdum symptoma febris gastrica, aut biliosa.

Quando irritabilitas, ac sensibilitas deletri videntur.

Exanthemata interdum apparent. Virium languor.

(a) Vid. GALENUM..., BARTHOLETTUM..., TRIILERUM..., HUXHAMIIUM *Essai sur les fièvres, dissert. sur les pleurisies, & peripneumon. chap. 2. p. 239., & observat. de aere Vol. II. mens. Jan. Feb. Mart. 2746. Vid. etiam Saggi di med. prat. di P. P. DALL'ARMI P. 3. p. 235. usque ad p. 241.*

§. CXIV.

Sanguis in his e vena primum missus apparet coccineus, & diu feri tenax, sed mollis, tener, parumque cohærens. Altera vice detractus *crassamentum* lividum exhibet, maxime laxum, plurimo flavo, turbido, aut subviridi, aut subrubicundo ianatus sero. Tertia vero nigrum fere, sanguinis e vena missi phænomena in hac gangranosa peripneumonia.

niosum, dissolutum. Si qua contegitur inflammatoria pellicula, flava hæc est, & mucosa; ac tardissime concreescens. Sic se res habet plerumque. Vidi vero non semel in quibusdam hujusmodi *peripneumonia malignæ, & gangranosa constitutionibus* sanguinem crusta phlogistica densissima tectum, fortasse quia venenatum miasma nondum sanguinis texturam corruperat. Neque perpetuum est in hujusmodi malo vires sub initium, ut in reliquis malignis, deficere, sæpe enim ante morbum, eoque incipiente satis valent; etsi progressu orta gangrana, ut par est, resolvuntur.

Observatio auctoritatis.

Virium languor an perpetuam symptomata?

§. CXV.

Erysipelas pulmonum. ALIUTAUDIUS an jure negetur?

Erysipelate interdum prehendi pulmones, auctor est HIPPOCRATES (a), & post eum BALLONIUS, BAGLIVIVS, alique non pauci (*). LIEUTAUDIUS negat id fieri posse, quod erysipelas cutis morbus tantum esse videatur, non interiorum partium. Sed tanti ejus auctoritas a nobis fieri non debet, ut ceteris magnis viris fidem denegemus (**). *Pleuritides* enim, & *peripneumonias erysipelatodes* dari, nos quoque comperit habemus, *siccas* plerumque; quas, ut ait BALLONIUS (b), serum acre, subtile, malignum efferum, coctionem, atque anacatharsim eludens, efficit, & id phlogosim potius vagantem, quam phlegmonem fixam excitat, a qua pulmones repente quasi fiderantur. Morbum præsentem ostendunt rubores genarum fugaces; tussis inanis; magna linguæ ariditas; interior viscerum ardor; assidua anxietas, & jactatio; virium subitus lapsus; & exiguus dolor. HIPPOCRATES (c) vero addit dolores acutos, pungentes, modo ad spinam

Signa morbi præsentis.

Dolores ad dorsi spinam,

nam

nam dorſi , modo ad ſternum excurrentes , ſed & ſter-
 vagos , & tranſitorios , quales egomet ipſe non *num*
 raro obſervavi . GORTERIUS (*d*) præterea his ac- *quando-*
 cenſet pulſum velocem , non valde durum , uri- *que, teſte*
 nas flammeas , facilem metaſtaſim , & cruſtæ pleu- *HIPPO-*
 riticæ in ſanguine e vena miſſo abſentiam . Se- *CRATE,*
 ſtio cadaverum oſtendit pulmones vehementes ru- *decur-*
 bros , aut nigricantes , & gangræna affectos ; ſed *rentes.*
 molles , & flaccidos , non duros , & infarctos , ut *Ex GOR-*
 in vera pleuritide , & peripneumonia . Nec rarum *TERIO*
 eſt , febrem ardentiffimam eſſe , pulſum vehemen- *alia ſi-*
 tem & velociſſimum , & ſpiritum ore præcalidum *gna.*
 exire ; neque hæc , ſanguine pluries etſi omiſſo , *Quid ex*
 qui ruberrimus , & ſpumofiſſimus plerumque eſt , *cadave-*
 quidquam de ſuo vigore remittere . Qui hoc mor- *rum ſe-*
 bo corripuntur breviffimo tempore pereunt , im- *ſtioni-*
 mo repente nec cogitantes , teſtante BAGLIVIO *bus?*
 (*e*) , jugulantur ; quod ſane noſtra experientia
 confirmamus . An hæc *varietas* eſt peripneumoniæ *Moſ. ci-*
 gangrænoſæ (§. CXIII.) ? Nonnulli , inter quos *ta , &*
 SUAVAGESIUS (*f*) , pleuritides bilioſas confun- *fere re-*
 dunt , quæ ſæpe gæſtricæ ſunt , & ſymptomaticæ . *pentina.*
 Bilioſas quoque eryſipelatodes fuiſſe credit , GUI- *Quæſtio .*
 DETTIUS (*g*) . *Pro bi-*
lioſa ple-
uritide a
quibus-
dam hic
morbus
habitus .

(*a*) *Lib. de intern. affection. n. 8.*

(***) SCHENCKIUS *Peripneumoniam eryſipelato-*
ſam recentent obſervat. 46. in ſcholio.

(****) MORGAGNIUS (*de ſedib. & cauſſ. morb.*
Epist. XX. n. 12.) pulmonis inflammationem in ru-
 bore furace aliquando conſiſtere non negat , quando
 nimirum eſt de genere *legitimi eryſipelatis* . HÆ-
 MIUS quoque eandem ſententiam tuentur (*Part. IX.*
cap. IV. p. 125.) , cum inflammatos quidem pulmo-
 num infimos lobos obſervavit , non tamen ut re-
 liquis peripneumoniis , aut pleuritidibus duros .

(*b*) *Epid. I. p. 83. , & III. p. 20.*

- (c) L. c. (d)
 (e) *Append. de pleuritide*
 (f) *Nosologie* (g) *Dissertat. 2. cit.*

Prognosis.

§. CXVI.

*Signa
fausta, &
prava.*

Peripneumonia semper plus habet periculi, quam doloris, & tunc quotissimum fere mortifera est, cum ad summam spirandi difficultatem delirium etiam accedat, aut quando ex angina nascitur, aut acuto alicui morbo supervenit; nam vel intra *septimum* diem occidit, aut in abscessum, & tabem abit. Interdum sub graviore casu, si sanguis e naribus ubertim fluat, & venter biliosa multa, & spumosa deponat, spes aliqua salutis affulget: contra *quarto* die, aut, quod longissimum est, *septimo* morte finitur. *Malum autem est, phrenitidem* (a), aut *nervorum rigorem* (b),

*Urine
nota vel
bona, vel
mala.*

aut *alvi profluvium* (c), quod sputum supprimat, supervenire; aut *agrum residere velle*, (d) aut *urinam celeriter post potionem prodire* (e), aut quæ ab initio *cocta* erat, post *quartum* diem *tenuem*

*Si levis
inflam-
matio est,
quomodo
solvatur?*

evadere (f). Sæpe ubi levis inflammatio est, neque multum diffusa, solvitur solo sputo copioso, facili; leviter sanguineis filamentis distinctio; interdum urina multum sedimenti habente; non raro solo sudore; rarius diarrhœa mucosa cum striis sanguineis commixta, aut biliosa. Sed illud frequentissimum est, quod, cum inflammatoria congestio resolvitur, pars quædam in bronchia sibi viam parat, ut per sputa expelli possit, pars vero alia in venas traducta & circumacta variis excretoriis se applicat, ut excernatur. Renes ve-

ro sæpius eam recipiunt, atque excernunt urinis crassis, turbidis, & copiosis emissis, quæ sedimentum rubrum, & lateritium deponunt. Futuram autem hujusmodi inflammationis resolutionem pleurumque indicant urinæ saturetiores, & jumento-
 læ, quæ ad latera vitrei vasis, quo continentur, & refrigescunt, albam, adhærentem, mucosamque materiem demittunt, cuticulamque in superficie exhibent ejusdem naturæ, circulum quasi formantem, qui vasi adhærescit. Nec rarum est, *Exanthemata miliaria signum bonæ criseos.*
Quid resolutionem inflammationis prænunciet?
 peripneumoniam, & pleuritidem quarto, vel septimo die, vel paullo tardius erumpentibus pustulis miliaris (*) critice judicari, & solvi; quod sæpius vidimus.

(a) *Aphorif. XII. sect. VII.* (b):....

(c) *Aphor. XVI. sect. VI.* (d) COAC. PRÆNOT. n. 497. (e) COAC. n. 579. (f) COAC. n. 515. 580.

(*) Vide *Saggi di med. pratic. di PIETRO PAOLO DALLARMI P. 2. Giunta all' osservaz. XXXI. Cl. LE ROY vidit pleuritidem cum sputo sanguinis, difficultate cubandi in latus sanum, & sudoribus multis & frequentibus, non tamen foetidis, judicatam die quanto eruptione pustularum miliarium rubrarum, multarum, & prurientium. (Melang. de physique, & de medec. Prem. mem. sur les fièvres aiguës. p. 209.) Ex sched. auct.* *Observatio cl. LE ROY.*

§. CXVII.

Sputa optimæ notæ esse consueverunt, quæ alba, lævia, atque inodora sunt; quæ quarta die maturescunt (*), atque alba, & subcitrina fiunt, quæque facile, & copiose prodeunt. Si tertia die appareant, brevem morbum; si tardius, longum futurum significant. Neque inter initia terrere debent

Sub initio morbi an rufus, sanguinisque color maior?

Sputum malæ notæ.

debent sputa rufo colore, & sanguineo tincta, dummodo facile excernantur, respirationem levant, & mitiorem habeant febrim comitem. Quæ die septima non maturescunt, fere lethalia, aut certe ancipitem exitum reddunt. Liquida, & salivæ instar morbi longitudinem indicant; mala sunt spumosa, viscida, aut aquosa, quia inutilia; deteriora, si cruenta, & sincera. Liquida, viridia, nigra, aut putrida *gangrenam* ut plurimum, & mortem imminentem prænuntiant (**).

(*) *Sputum concoctum est duri simile non claro, non viscido, nec nimium flavo, nec nimium cruento, nec viridi, nec livido, ut ait HIPPOCRATES de vic. acutor. sect. IV.*

(**) Vid. COACAR. PRÆNOT. n. 13. 14. 15. 16. 17.

§. CXVIII.

Alia fausti, infastique exitus signa.

Lingua biliosa, si inter initia appareat, malum septem diebus desitutum, si vero *tertio*, aut *quarto* talis fiat, ad *nonum* perventurum esse portendit. Quibus autem dolores ab initio leves sunt, & *quinto*, & *sexto* interduntur, hi plerumque ad *duodecimum* producuntur, raroque servantur: præcipue septimo, & duodecimo periculum subeunt. Quod si *decimum quartum* eva-

Auris dolor, & abscessus ad interiora?

serint, sani fiunt. Sani quoque fiunt illi, quibus *interiora auris dolor*, & *abscessus oboritur*, & *pus inde dimanat*, ut BAGLIVIVS testatur. Plerumque etiam non infastus exitus est, si sanguine emisso morbus levetur; etsi deinde iterum recrudescat. Spes enim est, repetitis venæ sectionibus cessurum esse.

§. CXIX.

Sicca, sine videlicet sputo, *pleuritides* certam ^{Sequun-}perniciem plerumque minantur, nisi urinæ pro- ^{tur pro-}fluvium eis superveniat. Metuendæ quoque sunt ^{gnostica}ad superiora, aut posteriora tendentes, nisi hæ ^{signa tam}spuriæ sint, & musculis exterioribus insideant ^{prava,}
(§§. CIX. CX.). Quæ vero *quatuordecim* die- ^{quam}bus non repurgantur (*a*), sæpe suppurationem ^{bona.}subeunt, ni suffocent. Discipuli vero HIPPOCRATIS (*b*) tempus hoc extendunt ad *duos & vigin-* ^{Quid de}
ti dies usque, quibus si non repurgentur, sup- ^{senibus,}puratio imminet. Senibus, atque utero gerenti- ^{Et utero}bus plerumque perniciosæ sunt, aut abortum, & ^{gerenti-}partum sollicitant; nec minus periculi afferre iis ^{bus?}consuerunt, qui in illas recidunt, aut pluries ^{Quid in}eodem morbo laborarunt, quanquam ex his quo- ^{recidi-}que complures evadere non rarum sit. ^{vis?}

(*a*) HIPPOCR. *sect. v. aphor. VIII.*

(*b*) *Lib. I. de morb. n. 24.*

§. CXX.

Nec tutum est, dolorem prius evanescere, ^{Metastasis,}quam febri. Eo enim desinente, si febris per- ^{sis, aut}sistat, neque ab alia causa pendeat, aut quod ^{suppura-}pejus est, subinde ingravescat, atque aliæ partes ^{tionis}novis, gravibusque symptomatibus affici incipiant, ^{nota.}alterutrum fieri solet, nimirum aut *suppuratio*, qua dolor fuit, aut tetra ad eas *metastasis*. Si ^{Signa}vero pulsus fiat parvus, frequens, atque inter- ^{gangra-}mittens cum sudore frigido, & post *duodecim* ^{ne.}horas delirium subsequatur, inflammationem gan-

grana excipi, & terminari perspicuum est. Si de-
 mum febris, quæ adhuc pergit, cum horrore cir-
 cuitus quosdam habeat, aut vespere ut plurimum
 recrudescat, dolorque subinde, præsertim in ac-
 cessionibus, iterumque delitescat, *suppuratio* certe
 in suspicionem venit, quam certius prædixeris;

*Certiora
 suppura-
 tionis in-
 dicia.*

si strangulatus se hisce adjungat, & febris jam a
 multo tempore teneat, & sputorum sapor sub-
 dulcis percipiatur.

§. CXXI.

*Malus
 pleuriti-
 dis in
 peripneu-
 moniam
 transi-
 tus, &
 quare?*

Malam *pleuritis* in *peripneumoniam* mutatio-
 nem dixit HIPPOCRATES (a), & jure profecto;
 nam laius inflammationem per pulmonem diffun-
 di id ipsum significat. Inflammatione autem la-
 tius diffusa, cellulosus textus, quo vesiculæ pul-
 monares colligantur, & vasa eorum minima in-
 flammatorio glutine tenaci, & polypofo ita re-
 plentur & inferciuntur, ut ipsa aerea spatia, &
 vesiculæ compressæ aerem ad inspirandum non
 amplius admittere possint; quo fit, ut non so-
 lum, quia pulmones nequeunt expandi, sanguis
 per minimam arterias trajici non possit, atque a-
 deo pulmonum infarctum augeat; verum etiam
 nervis ubique fortius sive distractis, sive diface-
 ratis, sive quasi prælo contusis, & pressis, om-
 nis doloris sensus pereat, eique mortalis succe-
 dat anxietas. Et reapse pulmones e flaccidis, &
 mollibus duri, & compacti fiunt, hepatis substan-
 tiam omnino emulantes; uti eorum, qui obie-
 runt, cadavera ostenderunt. Mala quoque est

*Stilla
 sanguinis
 e naribus,
 vel nimia
 malum.*

sanguinis e naribus stillatio, si pauca sit, aut si
 uberior vires infringat. Pessimum denique signum
 erit, si multum materiæ in pulmonibus strepat,

facies

facies inærentem referat , atque oculi aurigine suffundantur .

*Pessimum
signum
quale ?*

(a) *Aphorif. XI. sect. 2.*

§. CXXII.

Pulsui vero , qui varius , ut supra monitum est , esse potest , etsi magno , & valido , ac æquali , non temere fidendum est ; potest enim ad ultimum usque vitæ momentum spem alere , & repente nec opinanti deficere . Interdum enim ex duro , inæquali , & parvo fit mollis , æqualis , & magnus , qualis esse solet qui *criticus* appellatur . Interim tamen , aucta magis magisque spirandi difficultate , æger fere inter loquendum , aut dum loci mutationem parat moliturque , extemplo animam efflat . Itaque ad respirationem magis respiciendum est , quam ad reliqua signa . Illa quo facilius , eo prosperiorem eventum spondet ; & vicissim .

*Pulsui
bono non
fidendum
& cur ?*

*Difficilior
respiratio
in pro-
gnosi
maxime
atten-
denda.*

§. CXXIII.

Exitiosum quoque censent BAGLIVIVS , LANCI-
SIUS , & BOERHAAVIUS , si sanguis e vena mis-
sus floridus sit , & crusta albida , sive *pleuritica*
careat : materiem enim crassam tenacem concre-
scentem , quæ prodire deberet , pulmonibus in-
hærere credunt , graviusque malum inde reddi .
At si quid ego judicem , non semper hujusmodi
crusta phlogistica absens pejorem morbum porten-
dit , quia sæpe altera , aut tertia , immo quarta
venæ sectione demum apparet , & quia multa
sunt , ut demonstravit in primis SYDENHAMIVS ,

*Crusta
phlogisti-
ca defi-
ciens ex
BAGLI-
VIO ,
LANCI-
SIO , &
BOER-
HAVIO
quid por-
tendat ?*

*Cur e-
rum opi-
nio im-
probetur ?*

& HAE-

Periculum ex defectu crustæ phlogistica non pendet ab eadem intus re-
senta.

& HAENIUS, quæ glutinis inflammatorii concretionem quominus in conspectum veniat impedire possunt. Nec ubi ab ejus defectu (§. CXIV.) periculum imminet, id eidem intus retentæ tribuendum forte est; a tenui enim, atque acri humore, eoque ad dissolvendum idoneo tunc inflammatio *erysipelatis* instar pulmones occupat, & cito ad *necrosim* perducit.

§. CXXIV.

Prognosis complicatarum, uti Pleuroperipneumoniae & Inflammationis Mediastini & Pericardii.

Multa ex his accommodari etiam possunt diversis, multiplicibusque horum morborum complicationibus, hoc tantum discrimine, quod si *simplices peripneumoniae, & pleuritides* ingens periculum continent, tanto majus inerit *pleuroperipneumoniae*, quocumque sensu accipiatur (§§. CIII. CXII.), aut inflammationibus utrumque pulmonem infestantibus. De *mediastini* vero, & *pericardii* (§. CIII.) inflammationibus par erit ratio. Utraque enim iisdem obnoxia est vicissitudinibus, sed præterea sputorum caret, atque excreationis auxilio. Altera vero etiam ob cordis viciniam, & complicationem multo deterior est.

Curatio.

Indicationes.

Quod vero attinet ad curationem, singulae ferre eandem exposcunt, quam *peripneumonia* (§§. XCVIII. IC.), & *pleuritis* (§. C. & seq.). Cumque ea iisdem indicationibus, quæ cujuslibet inflammationis propriæ sunt *, inniti debeat, protinus ab initio larga sanguinis missio imperanda est, & parvis interjectis aliquot horarum intervallis eo osque repetenda, donec pulsum durities

vs.

Iteranda usquequo?

ties ac impetus , & symptomatum , inflammationisque furor , atque acerbitas se remittant ; eorumque loco resolutionis , & coctionis signa (§. CV.) appareant . Remitti autem inflammationem novimus , quando dolor plurimum imminuitur ; respiratio liberior redditur ; tussis mitior fit ; pulsus ad pristinam mollitudinem redit ; æqualior , rariorque evadit ; febrisque mitigatur ; & simul sputum facilius excernitur , & urinæ crassæ subsidunt , aut universa cutis sudore madet . Itaque maturæ , & liberaliter , præsertim in *pleuritide* , quæ largiorem sanguinis missionem præ *peripneumonia* requirere , & ferre existimatur , sanguis detrahendus est , modo vires , ætas , temperamentum , habitus corporis , anni tempus , & constitutio non repugnet . Ad uncias XII. vel XV. vel etiam XX. *prima* venæ sectione educere non dubitant clinici exercitiores ; immo aliqui interjecto exiguo temporis intervallo eandem quantitatem effluere ex eodem vulnere sinunt (a) , testanturque , sic confestim morbum jugulari . Vi-

Coactionis signa.

Quantitas sanguinis mittendi.

Cautio.

rium autem habenda potissimum ratio est , utpote quæ ad coctionem , atque excretionem , quæ per sputa plerumque in morbi *statu* , & declinatione fieri debet , necessaria sunt . Præstat autem ex loco parti affectæ proximiori , sive ex latere dolori respondente sanguinem mitti , cum certior , promptiorque hinc sequatur *revulsio* , uti omnium ferme clinicorum experientia (**) compertum est ; atque ea repeti potest , donec doloris acerbitas , respirationis angustia , & pulsus durities exposcere videntur .

(*) Vide *Commentarium de inflammatione Vol. I.* , & *alibi* .

(a) SIMSIUS *Malad. Epidem. chap. V. p. 123.*

(**) Et si

Monitum
ex excep-
tione re-
gule cir-
ca san-
guinis
missionem.

(**) Etsi sanguis ab affecto latere emissus communiter magis prodest; id vero non ita perpetuum est, ut quidam sibi persuadent. ROZIERIUS enim (*Traite des maladies de la poitrine* p. 65.) monet, GESNERUM observasse, in *pleuritidis epidemicæ*, & *malignæ* specie sanguinis missionem e brachio inutilem, e pede vero plurimum salutarem fuisse. *Ex sch. auct.*

§. CXXV.

Jugularium
quoque
sectio,
quandocumque
oportet?

Quod si tanta videatur pulmonum repletio, ut non solum *inspiratio* multum laboret, verum etiam sanguinis e capite reditus retardetur, inhibeaturve, ideoque venæ jugulares turgeant, facies cum livore rubeat, inexplicabilis anxietas cum pulsu obscuro, & depresso, delirioque accedat, non suppetit præstantius auxilium, quam alteram ex *jugularibus* incidere, ac aperire. Sectio hæc quam citissime caput relevat, & propius a *pulmone revellit**, venam *azygam*, atque adeo venam *bronchiale*m exonerando.

An revulsio in
morbis
pectoris
fieri possit?

(*) *Revulsionem* in pectoris morbis nullam haberi posse contendunt plerique. At falluntur. Nam *arteria bronchialis* vel ab aorta sub arcu ejus, vel a prima intercostalium inferiorum, vel ab intercostali superiori oritur. Sanguis refluxus per venam bronchiale, & venas intercostales ad venam azygam fertur. Depletis autem axillaribus, bronchialibusque per basilicam sectam venis, sanguis uberius in respondentes arterias derivatur. Hinc minus in intercostales, atque adeo in bronchiales arteriam influunt, En *revulsionem* ab ipso *pulmone*, quam nonnulli negant. Sed & *vena cava*, aliquantum hac ratione detumescendo, dat venæ azygæ spatium, in quod se citius exoneret, facitque, ut possit ab arteriis, quæ in eam desinunt, majorem sanguinis

copiam & recipere, & absorbere. En quomodo inflammatus cum pulmo, tum thorax a vena sive *brachii*, sive *colli* secta sublevetur. Arteria demum *bronchialis* communicat ubique cum arteriæ *pulmonaris* ramusculis. Ergo etiam ab his fiat *revulsio* necesse est. Sic animadvertit cl. PLACENTINUS in libro *de venæ sectionis usu* p. 88., & 89.

§. CXXVI.

Si vero id auxilii nequaquam juverit, aut *ni-* *vs. syn-*
mia colli pinguitudo, quo minus administretur *cronia in*
 impedimento fuerit, nonnulli cum ARETÆO, & *utroque*
 HUXHAMIO suadent, sanguinem uno eodemque *brachio.*
 tempore ex utroque brachio mittendum esse, si-
 mulque aerem frigidiorē inspirandum expiran- *Aer fri-*
 dumque, quo facilius humor e pulmone excutia- *gidus &*
 tur (*). Nec inutile est, vaporem aceti aqua *vapores*
 calida temperati per os haurire; fomentis abdo- *inspiran-*
 men laxare; pedes, & manus in balneum tepi- *di.*
 dum demittere; ligaturis, frictionibusque artus
 quodammodo irritare. *Revel-*
lencia.

(*) *Arteriotomiam* a nonnullis hic proponi, pos- *Arterio-*
 seque eam emolumento esse, animadvertit cl. RO- *tomia*
 ZIERIUS loco citato. Sed monet, hanc vix sine *que loco*
 periculo, nisi in *arteria temporali* fieri. Non enim *facien-*
 imitandum censet AVENZOAREM, qui pectoris in- *da.*
 flammatione laborans, sibi *radialem* arteriam bono
 eventu secuit. *Ex sch. auct.*

§. CXXVII.

Interdum accidit ob celerem virium vitalium *Cautio*
 lapsum, qui sanguinis missionem in malignis præ- *circa ve-*
 sertim subsequitur, ut vena quousque opus esset *na sectio-*
 secari non possit, aut peculiaris ægri, aut epide- *nem, si*
 micæ *virium*
laxus
auct.

Cucurbitula tam secca, quam scarificata.
 micæ constitutionis conditio eam non ferat. Tunc post primam, vel alteram levio rem sanguinis missionem, vel etiam continuo ab initio expedit, cucurbitulas tam siccas, quam scarificatas dorso, & pectori admove re, aut hirudines hæmorrhoidibus, in iis præcipue, qui earum fluxui assueti

Hirudinum applicatio hæmorrhoidibus.
 sunt, applicare; & tantum sanguinis haurire, quantum vires ferant & urgens morbi vis requirat. Cautissime etiam sanguis mittendus est in ea, quæ a *metastasi* oritur, *peripneumonia*, si vires jam fuerint fractæ, & pulsum magnitudo, & totius habitus bonitas animum non faciant.

Cautio circa sanguinis missionem in peripneumonia a metastasi.
An post quartum diem?
Non semper fit coctio morbi intra 4. diem.
 Sunt etiam qui non ultra diem *quartum* secandam venam præcipiunt, metuentes coctionem, sputorumque, quibus morbus solvi solet, excretionem impedire. At quamvis intra diem *quartum* sæpe morbus ad coctionem perveniat, id tamen non omnibus commune est. Non raro hocce limites excedit morbi vis, & longius produ citur ejus cruditas. Quando id incidit, quovis tempore (dummodo gravia symptomata inflam mationis crudæ & sævientis, præsertim dolor, difficilis respiratio, febris magna, & pulsus vehe mentes, atque duri perseverent) detrahendus sanguis est, quemadmodum expertissimi clinico rum facere consueverunt. Immo id omitti haud debet etiam tum, cum inflammatio, postquam jam conquieverat, iterum recrudescat, quæcum que demum fuerit dies, *septima* nimirum, *quar tadecima*, & *vigesima*, aut alia ulterior.

Sanguis mitti potest re crudescente morbo, etiam post VII. XIV., XX., & amplius dies.

§. CXXVIII.

Sanguinis igitur missio cum inflammationibus habeatur auxilium longe præstantissimum, sic ut
 in ea

in ea maxime confidendum sit, & sine ea vix
 aliquid boni præstent cuncta alia artis adjumen-
 ta; sequitur, ut vel in ipso peripneumoniæ im-
 minentis metu locum habere debeat ad hanc vi-
 delicet præcavendam. Interdum tamen morbus
 adeo levis est, febris ita exigua, & moderata;
 respiratio vix laborat; sputum protinus ab initio
 flavum, & striis sanguineis intermixtum libere
 prodit; aut urina hypostasim albam, copiosamque
 deponit; aut biliosa multa alvo egeruntur; &
 cutis universa sudore perfunditur, atque hinc pe-
 ctoris gravitas, aut dolor ita remittitur, ut in-
 flammationem resolvi pateat, quo in casu san-
 guinis missionem prætermitti posse plerique au-
 tumant, ne utile ipsius naturæ opus inopportune
 inturbetur. Idque eo magis tenendum est,
 quominus resolutioni se opponere videatur laxa
 solidarum, & fluidarum partium constitutio, &
 corporis benigna temperies.

*vs. ad
 præca-
 vendam
 peripneu-
 moniam.*

*Absti-
 nendum
 a vena
 sectione,
 quando
 natura
 suis viri-
 bus opus
 salutis
 perficiat.*

*Quo in
 casu id
 maxime
 atten-
 dendum?*

§. CXXIX.

Alienum quoque est in eo casu (§. CXXVII.)
 quamcumque aliam evacuationem moliri. Id u-
 num tunc curandum est, ut salubres naturæ mo-
 tus, conatusque perficiantur. Quod præstat aeris
 tepor, ejusque iterata renovatio; atque calidæ
 vapor inspiratus potus diluens, saponaceus, tem-
 perans calide haustus; blandi clysteres in anum
 immissi; abdomini admota fomenta quæ molliunt
 animi, & corporis quies; victus tenuis; atque
 omnia alia, quæ meatus laxant, & referant,
 humores temperant, mulcent, & solvunt, & ma-
 teriæ hærentis, aut corruptæ per sputa, urinas,
 sudores, excretionem promovent, atque adjuvant.

*Tunc in-
 utilis
 qualibet
 alia eva-
 cuatio ab
 arte pro-
 mota.
 Quid ars
 præstare
 debeat.*

§. CXXX.

§. CXXX.

*Quæ do-
lori le-
niendo
conve-
niant?*

*Emol-
lientia,
& discu-
tientia.*

*Campho-
ra, cro-
cus, sa-
po &c.*

*Cucurbi-
tula, cuti
profunde
inciden-
da, appli-
catio.*

*Cantha-
rides.*

Dolori autem pleuritico leniendi valent ex-
trinsecus admota quæ molliunt, & discutunt,
aut reprimunt; spongia nempe ex decocto mal-
væ, chamæmeli, meliloti, florum sambuci (ace-
ti tantillo adjecto) expressa; vesica oleo, aut
lacte semiplena; cataplasmata ex radicibus al-
thææ, foliis malvæ, seminibus lini, & fœnu-
græci lege artis parata; linimenta ex unguento
populeo: aut oleo, violarum, nymphææ, hyposcia-
mi, similibusque: & si valentius discutere veli-
mus quam relaxare, his camphoram, & crocum
adjicere oportet. SWIETENIUS pannes laneos de-
cocto emollienti cui sapo adjectus sit, aut lacte
aqua diluto imbutos admoveri jubebat, renova-
rique sæpe, ne frigescendo nocerent. Immo la-
teres calentes desuper dabat hunc in finem. Do-
sis saponis est semunciæ pro qualibet libra deco-
cti. Si vero per hæc dolor non remittat, nec
cedat, dolenti loco, cute profunde incisa, ad-
moveri cucurbitula debet, & quantum fieri po-
test sanguinis detrahi. Sic enim quam proxime,
& sine virium discendio inflammatæ parti, sive
ea sit interior, sive exterior, succurritur. Uti-
lissime etiam, ut jamdiu notissimum est, empla-
strum ex *cantharidibus* imponitur, quod egregie
cum discutit, & resolvit, tum ulcere inducto
extrorsum humorum allicit cursum. Sed hæc uti-
lius adhiberi in ea *pleuritide*, quæ continentibus
thoracis partibus insidet (§§. C. & CX.), &
præsertim, quæ a dolore *rheumatico* (§. CXI.)
fit, & frigore suscepto orta est, quam in ea,
quæ *pulmones* solum tenet, verosimillimum est:

quan-

quanquam negari haud possit, aliqua revellendi laude præstare in hac etiam, atque in ipsa *pleuroperipneumonia* (§§. CIII. CXII.), quod advocata fortasse ad thoracica exteriora vasa majori sanguinis copia, tanto minor fiat ejus ad interiora, & speciatim ad arteriam bronchialem, ideoque ad pulmonem appulsus. At quacumque demum id ratione contingat, illud experientia compertissimum est, hujusmodi præsidia citissime, atque incantamenti instar dolorem interdum fugare. At si cantharides nulla præmissa venæ sectione, aut post sanguinem semel tantummodo missum applicitæ extemplo dolorem discusserint, nec sudore, aut alia critica excretionem morbida materies e corpore prodierit, prudentis medici erit, venam iterum aperire, ne metastasi malum alias partes corripiat (a).

*Ani-
madver-
sio.*

(a) ROZIER. l. c.

§. CXXXI.

Quod si dolor atrocius excrucians perpetuas vigilias inferat, aut nervorum consensu cor spasmodice, ut ajunt, laceSSI ita incipiat, ut pulsus parvi, celeres, profundi evadant, respiratioque præcludi videatur, necesse est, ut ad * *παρεγοικη* confugiatur. Ex his opium crudum, aut laudanum liquidum SYDENHAMII, aut pilulæ de cynoglossa, aut diascordium FRACASTORII, aut syrupus de meconio tanquam usu, & nostra etiam observatione sæpius comprobata in primis excellunt; eoque erunt opportuniora, si tussis quoque molestior compesci debeat. Tanta enim est interdum inflammatoriæ causæ acritudo, &

* *Pare-
gorica.
Proba-
tiora.*

tanta partium laborantium irritabilitas, ut perpetuum ad tussim siccam incitamentum percipiatur, omnemque pectori, atque ægrotanti adimat quietem. Quo in casu utendum est præterea demulcentibus, anodynis, atque oleosis. Decocta igitur radicis althææ, aut hordei, aut saleb; mucilagines gummi tragacanthæ, aut arabici; aut seminum psyllii, fœnugræci, bismalvæ; emulsiones ex amygdalis dulcibus, & seminibus papaveris albi; linctus ex oleo lini, aut amygdalino recenti, & syrupo papaveris erratici, vel althææ in usum veniant. Ubi vero magnus pulmonum infarctus est, a quo si somnus vi accersatur, suffocationis periculum instare possit; aut ubi coctionis signa adsunt, facilisque sputorum excretio est, cavendum est ab iis, quæ opium habent, aut certe iis cautissime utendum. Sputa enim suppressi, & æger suffocari opio possunt (*).

Decocta.
Gummi.
Emulsa.
Linctus.
Cautio circa usum opii.

(*) *Opio vis narcotica adimitur, si methodo utaris a cl. BOUCQUETO tradita, quam describit noster in adnotatis ad §. 232. C. VII. Vol. III.*

§. CXXXII.

Post unam, vel alteram sanguinis missionem, si amarus oris sapor, lingua viscido muco obducta, nausea, aliaque cruditatis, aut putridæ in primis viis saburræ adsint indicia, aut alvus compressa sit; lenienti aliquo medicamento eam solvere oportet. Inanis autem timor est quorundam; ne per alvi ductionem exspuitio in hisce morbis pernecessaria inhibeatur, dummodo alvus in principio, & morbi cruditatem mitioribus medicamentis, quæ nec exagitent, nec valentius agant,

Quando alvus ducenda?

An alvi ductione exspuitio impedietur?

gant, subducatur. Oleum ex seminibus lini, olivis, aut amygdalis dulcibus sine ignis ope expressum; manna; cassia; passulæ præparatæ; sal mirabile *Glauberi*; serum lactis cremore tartari, aut tamarindis incoctis alteratum; syrupus aureus *solutivus* commodissime adhibentur, & tunc præsertim, cum coacervata, & stagnans in duodeno, vicinisque locis biliosa colluvies deturbanda sit. Tutissima vero omnium etiam in morbi progressu; omnibusque ejus stadiis sunt enemata. *Enemata.* Hæc innoxie alvum servant apertam, & clausam opportune aperiunt non sine magno morbi levamine.

§. CXXXIII.

Præter sanguinis iteratam detractionem (*); quousque refracta sit inflammationis vis, & præter alvi ductionem, quæ a sordibus primæ viæ liberentur, humorumque fluxus ad inferiora provocetur; illud quoque sedulo curandum est, ut solidis partibus laxitas quædam inducatur; sanguinis fervor temperetur, acritudo obtundatur, lentior si quis est, diluatur, solvaturque pituita ex hordeo, vel avena affatim, & calide potui data; dilutis florum violarum, papaveris rhœados, bellidis minoris, sambuci, verbasci; decoctis radicum graminis, glycyrrhizæ, malvæ, althææ, passularum, jujubarum, emulsis ex seminibus frigidis: quibus pro re nata adjicienda sunt; quæ leniter attenuant, incidunt, & saponacea virtute resolvunt, uti nitrum purificatum, aut stybiatum, mæx, oxymel simplex, roob baccarum sambuci, syrupus ex aceto, & succo mali medici, violarum, ribesiorum, berberum, aliorumque simili- *Temperantia, demulcentia, & resolventia.* *Decocta, & diluta.* *Incidentia, & attenuantia.*

lium fructuum, quibus non solum facilius hærens inflammatoria materies discutitur, verum etiam sanguinis, serique ad concrendum proclivitas emendatur.

*Monitum
de san-
guinis
mittendi
quantitate.*

(*) Quantitas sanguinis, quæ detrahi debet, varianda sane est pro diversa ætatis, temperamenti, habitus corporis, tempestatis, constitutionis ratione. In adultis SYDENHAMIUS XL. uncias non excedebat, Sed nostris in regionibus, quando *exquisita*, & *legitima* est *pleuritis*, aut *peripneumonia*, & *peritior* perstat, & vires satis firmæ, & validæ, temperamentumque sanguinem concurrant, sæpe ad LX., LXXX., & ultra ascendere solent. Neque pueritia ab ejusmodi evacuatione secludenda est. Pueris enim, servata proportione, non semel tantum, sed iterum; & tertio vena similiter secari debet, secarique solet maximo cum emolumento.

§. CXXXIV.

*Alia in-
videntia,
& resolu-
ventia.
Calegualæ
Poly-
galæ.*

*Carduus
benedi-
ctus, a-
liaque
diapho-
retica
quando
utilia?*

*c. c. ge-
lantina.*

*Futilia
quedam
aut pleu-
ritica.*

Eo etiam spectant antimonium diaphoreticum non ablatum; camphora; spiritus MINDERERI; radix calegualæ, palygalæ virginianæ vel nostratis (*), filicis maris ex aqua decocta; diluta summitatum cardui benedicti (**), genepi taurinensium, herbæ scabiosæ, veronicæ &c.; quibus illud etiam conficitur, ut sudor leniter motus a centro ad circumferentiam vim morbi utiliter advertat, expellatque. Quod præcipue proficuum est, quando coctionis signa jam in urinis saltem appareant. Neque omnino hi excludendæ videntur *gelatina* c. c. acido succo citrii, aut mali medici imbutæ, & in longiori aquei potus copia solutæ, utpote quæ diaphoresim promovere dicuntur. Laudantur passim oculi cancerorum, dens apri, sanguis hircinus, quæ hodie uti vana & fu-

& futilia antipleuritica jure a sanioribus medicis flocci fiunt. Hisce addunt nonnulli sperma ceti; de cujus tamen molliendi, resolvendique facultate existant apud clinicos documenta non levia:

Quid de
spermate
ceti.

(*) *Polygala* utraque tam *virginiana*, quam *nostras* incidens, & exspectorans est. Ejus laudes celebrant D. TENNENT *mem. de la Societe Roy. ann. 1739.* & magis adhuc D. BOUVART *ibid. ann. 1744.* In primis laudatur in curatione pleuritidis *siccæ*, videturque quidpiam continere *specifici*. Vomitus prima vice excitare solet; deinde alvum movet, sputa elicit, citoque etiam urinam, ciet. Modus eam adhibendi hujusmodi est. R. *Polygalæ virginianæ unc. unam. Decoq. in aq. com. pinta j. ad medietat. consumption.* Calatur. dentur ij., vel iij. cochlearia singulis hori. Etiam D. PAUL eam plurimum commendat in suo *de peripneumon. tractatu.* Vid. *Extract. litterat. Europ. T. III. ann. 1762. Ex sch. auct.*

(**) „ In gravissima pleuritide, præmissa larga sanguinis missione (*inquit LANGEUS Miscell. veritat. fascicul. I. p. 75. 76.*), ac pro circumstantiarum ratione repetita in latere dolente, non obstante fato, senectute, diætæ vitio, aut contagione virulenta solo extracto cardui benedicti ad minimum in dies singulos ad scrup. iv. dato sanitatem millies reddi. Id vero jam GEOFFROYO notum fuit, qui hujus plantæ necessitatem Parisiis in pleuritide observavit. „ *Ex sched. auct.*

§. CXXXV.

Sputum; quo solvi sæpe morbus debet, non raro ob nimiam visciditatem, & cohærentiam vix educi potest, immo difficillime excreatur. Interdum etiam irritabilitate, aut sensibilitate

Expecto-
rentia
præci-
pua.

fatulentibus omnino supprimitur. Tunc, præter saturatius polygalæ, aut dulcamaræ decoctum, cujus aliquot cochlearia subinde danda sunt, ad oxymel scylliticum, syrupum nicotianæ, de erysimo lobelli, ad spiritum fuliginis, salis ammoniaci, ad kermes minerale, radicem helenii, aut iridis florentinæ prudenter confugiendum est. Nonnulli tincturam cantharidum intrinsecus etiam dare non reformidant (a). Verum tutius est cantharides cuti admoveere, ut vesicas excitent. Sic enim non modo extrorsus malum avocant, & linguentem solidarum partium vim sollicitant; sed lentos quoque humores immisso sale caustico dissolvunt, atque ad excretionem organa omnia incitant (*).

*Vesican-
tia.*

(a) FANTINI *Breve istoria di due mediche osservazioni ec. Faenza 1777.*

(*) Usus vesicatorium in pleuritide commendat D. MARET (*Mem. de l' Acad. de Dijon T. I. p. 93.*) Monet tamen in spuria adhiberi posse, quin præmissa sit venæ sectio, quam in vera necessario requirit. *Ex sch. auct.*

§. CXXXVI.

Quam ob rem pectori, brachiis, femoribus, suris, plantis pedum opponi possunt etiam in morbi principio, ubi venæ sectioni minor locus sit (§. CXXXI.), aut ubi sputa agre prodeant (§. CXXXIV.); aut dolor atrocius urgeat. Tantæ enim iis vires sunt, ut quamplurimos ab orci faucibus eripuisse pluries visæ sint. Non parum vero constitutio & temporum, & regionum, & ægotantium confert, ut hæc beneficia præstent. Nam interdum his nihil omnino proficitur, nisi etiam

*Quo loco
applican-
da &
quando?*

etiam velis noxam afferri, Scire autem licet, sputa quandoque alia de causa, nempe recrudescente inflammationis acerbitate, supprimi. Quod ubi accedit, febris, & dolor, & spirandi difficultas, & reliqua symptomata excandescunt. Tunc si pulsus sint validi, duri, aut magni, viresque non deficient, nihil præstantius sputo revocando est, quam sanguinem iterum detrahere, deinde ad ea properare, quæ supra (§. XXX., & seqq.) proposuimus.

Quando
sputa
suppri-
mantur,
quomodo
revocan-
da?

§. CXXXVII.

Huc usque de vera peripneumoniæ; & pleuritis curatione. At non omnia semper præsidia, quæ recensui, in usum trahi opus est. Sæpe sola venæ sectio, & copiosus aquæ diluens potus sufficiunt. *Peripneumoniæ* vero *spuria veterum* (§. CVIII.), quam Nic. Piso descripsit, parcam & repetitam sanguinis missionem, demulcentia, & involventia, sive incrassantia; lenia ecoprotica ex cassia, & manna; epispastica; revellentia; atque attemperantia, uti serum lactis, & lac ipsum videtur requirere. *Peripneumoniæ* autem pariter *spuriæ*, quam *pituitosam* RIVERIUS, & *notham* SYDENHAMIUS vocavit, conveniunt quidem sanguinis missiones, sed non ita repetitæ; veluti etiam lenia cathartica, aut certe mitia emetica, & omne genus revellentium, incidentiumque (§§. CXXXIII. CXXXIV. CXXXV.). *Maligna*, & *gangranosa* (§§. CXIII. CXIV.) vix unicam fert sanguinis missionem, & quidem statim ab exordiis administrandam. Repetita enim vires plerumque prostermit; anxietatem adauget; vigilias, deliriumque mox affert tremores item, sudores frigidos,

Curatio
peripneu-
moniæ
spuriæ;
veterum.
Parcior
s. m.

Demul-
centia,
invol-
ventia
&c.

Revel-
lentia, &
tempe-
rantia.

Curatio
pituitosa
RIVERII
sive no-
thæ SY-
DEN-
HAMII
Parcior
s. m.

Revel-
lentia.

Curatio
maligna,
& gan-
grænosa.
V. S. vix
una ini-
to morbi.

gidos, ac mortem denique inter gemitus, & colloquia inopinatam. Interdum tamen constitutiones quædam epidemicæ observantur, quæ magis favent sanguinis missioni. Sed hic quoque summa prudentia opus est. Ceterum post sanguinem illico inter initia missum, vomitus tartaro emetico magna aquæ copia diluto, & partitis vicibus propinato; vel oxymelle scillitico; vel ipecacuanha semel, iterumque cieatur. Deinde alexipharmaca, & antiseptica usurpentur. Camphora, chinachina, scordium, chamæmelum hic excellent. Vapor præterea ex aqua spiritu salis ammoniaci imbuta, ex resinis leviter crematis assidue inspiratur. Mature autem cantharidibus pectori; & cruribus admotis vis morbi extrorsum elicienda est. In his etiam gangrænosus, malignisque pectoris morbis paullo largius nutrirî ægros expedit; & vino etiam dato recreare.

§. CXXXVIII.

Ita vero variant hujusmodi morbi (§. CXXXVI.) peculiare constitutiones ab auctoribus in lucem editæ, ut singulas recensere longissimum esset (*). Et quod caput est, sæpe vel præstantissimam medendi rationem eludunt; immo illud, quod olim profuit, in alia, novaque epidemia nequaquam bene vertit. Hinc medicus, licet peritissimus, sæpe hæret dubius, hoc potius, an illo utatur artis auxilio. Itaque inquirat necesse est in peculiarem morbi grassantis indolem, epidemicamque characterem, & quasi tentando naturam ipsam interroget, ut aptum possit invenire, & seligere curationis genus.

(*) In-

(*) In laudato *Recueil d'observations de medec.* sæpe occurrunt *epidemicæ constitutiones* legendæ. Præter supra allatam a DEPLAGNIO l. c., describitur *ibid.* Octob. 1757. p. 295. alia, quæ observata Telone est. Vide ibi. *Ep sched. auct.*

§. CXXXIX.

Nunc venio ad eam speciem, quam *erysipelas pulmonum* (§. CXV.) vocant. In hac cautissimæ sanguis educi debet: sæpe enim nocet. Nocet quoque in *biliosis* pleuritidibus tam *primariis*, quam *secundariis*, in quibus emetica, & eccoprotica præstant. Cum enim summa humorum tenuitas, & *calida acritudo* morbum faciat, non gluten illud phlogisticum, quo sanguis ad concrendum, coherendumque pronus est, reperitur; nec viscera defunctorum mucosa membrana (§. CVI.) obducuntur, ut calore opus sit, quo diffluat. Præter parciores igitur sanguinis missionem, tunc frigidis potionibus (*) uti præsertim licet, quandoquidem regio, temperamentum, ætas, anni tempus vehementer fervent, vel solidæ partes ita languent, ut ad pristinum robur nisi frigido potu redire nequeant. Tunc etiam eccoprotica diluentibus interponenda sunt, subacida in primis, ut biliosa, sive fervens colluvies alvo deturbetur. In his tamarindi, cremor tartari, serum lactis acidulatum primas tenent.

Erysipelatis pulmonum curatio.
V. S. sæpe noxia.
Item in biliosis tam primariis, quam secundariis.
Cur noxia V. S.

Frigidus potus.

Eccoprotica; & subacida.

(*) Aqua frigida usus est in pleuritide (fortasse *erysipelatode*) BERTINUS feliciter. MAR. GHISI *Lett. med. Lett.* I. p. 33. *Ex sch. auct.* Videsis DEPLAIGNII methodum. *Recueil d'observations de medec.* T. VIII. *Juillet* p. 168.

§. CXL.

Acida fossilia tam in erysipelate pulmonis, quam in biliosis, ardentibusque pleuritidibus. Interdum non modo in *erysipelate pulmonum*, sed etiam in *peripneumoniis*, & *pleuritidibus biliosis*, & ardentibus quibuscumque febris adeo vehemens est, ut sanguine etiam pluries detracto, parum aut nihil remittat, & arteriæ creberrimis validissimisque micatibus tangentis medici digitos repellere pergant, Ad hunc febris concitatio-rem motum compescendum aptissimum credo spiritum sulphuris sextuplo syrupi violarum edulcatum, & singulis horis ad cochlear unum sumendum, longa semper aquæ copia desuper hausta; quod remedii genus a Tissotio etiam propositum video. *Acida enim vero omnia vim cordis irritabilem potenter imminuunt, acritatem alkalescentem emendant, sanguinisque fervorem egregie refrænant (*).* Quare ubi immoderatus motus excedit, facile hisce refringi poterit. Verum *acida acriora tussim exasperant, & quæ e fossilibus depromuntur etiam sanguinem cogunt, aut ad concrescendum reddunt proniorem (**).* Cautissimus igitur eorum usus sit, neque sine prudentis hominis examine indiscriminatim proponendus.

Vis acidorum irritabilitati officit.

Cautio circa usum acidorum fossilium.

(*) Vid. *Vol. I. de Febr. §. CCXCV.*, & *Vol. II. §. CCLXXI. in nota *** ibi apposita.*

(**) Vid. *Vol. IV. de morb. pector. §. XXXIV.* & *l. c. Vol. I., & Vol. II. §. CXXX.*

§. CXLI.

Curatio pleuritidis Pleuritidi a nobis *nothæ dictæ (§. CX.)* fere eadem conveniunt, quæ adversus *veram* jam §. CXXIV.,

CXXIV. , & sequentibus commendavimus . *At* dum *no-*
nisi hæc resolvetur, facile in abscessum abit, qui *tharum.*
ad exteriora prorumpens molli tumore sæpe se *Notha*
prodit, & ferro tunc aperiri debet ad citam pu- *auctoris.*
ris evacuationem (*). *Notha* vero, quæ *rheu-*
matica etiam dici potest (§. CXI.), ut *rheuma-*
tica. *tica* affectiones curanda est, nempe una vel al-
tera sanguinis missione, cucurbitulis tam siccis,
quam scarificatis, fomentis emollientibus, lenibus
eccoproticis, & demum diluentibus, ac blande
diaphoresim promoventibus. *Dolores* porro fixi, & *Doloris*
sine febre, qui *scorbuticos*, *venereos*, atque *hy-*
pochondriacos (§. CXI.) affligunt, cum alterius *scorbuti-*
ci, vene-
morbi effectus sunt, a morbo primario curatio- *rei, &*
nem expectant. Hinc medicus antiscorbuticis, *hypochon-*
driaci
antivenereis, anthypochondriacis, carminativis,
atque alvum lenientibus eos oppugnet. Quando- *qui cu-*
que dolor lateris etiam sine febre adeo acerbus *rantur?*
est, adeoque defixas radices habet, ut illinc amo-
veri non possit, nisi applicitis (§. CXXX.) & præ-
sertim cantharidibus, ulcereque inducto diutiusque
manante. Id auxilii genus etiam profuit, quan- *Si sine*
do dolor nervis costalibus insederit, *convulsivus-*
que videretur. Ceterum *convulsivus* emollientia, *febris*
dolor.
anthysterica, atque anodyna expostulant. Emeti-
cis, & alvum lenientibus, atque anthelminticis
præcipue locus est, cum a cacochyliâ, a bile, ver-
mibus (§. CXI.) malum oritur. Si a febre in-
termittente gignitur, & periodice recurrit, post
sanguinis missionem, expiataque primas vias au-
dacter ad corticem peruvianum deveniendum est
(**). *Variolis*, & *morbilis* (§. CXII.) superve- *Curatio*
nientis secta quam citissime vana profligari debet, *doloris*
convul-
ne dilata ope, subitanea morte negligentia mul- *sivi.*
tetur. Reliquæ *secundariæ*, & *symptomaticæ* (§. *Gastricæ,*
& ver-
minosa.
Sympto-
maticæ
febris in-
termitt-
entis?
Superve-
nientis
morbil-
lis, &
variolis.
Cita v.s.
CXXII.

Aliarum, quæ symptomaticæ & secundariæ sunt. CXII.) sic tractandæ sunt, tanquam a febre putrida; aut biliosa, aut gastrica; ab arthritide; aut rheumatismo; a phthisi pulmonari; a miasmate miliari; a catarrho; a metastasi; ab hydrothorace; a lacte; aut lochiis suppressis; aliisque morbis pendentes. Hic vero opportunum videtur animadvertere, non satis diligentes, accuratosque medicos; cum in pleuritides putridas biliosasque incidunt; quæ a primarum viarum putrida saburra originem ducunt, aut febrim biliosarum symptomata sunt; sæpe eas pro primario morbo & sumere, & curare, neminem fere servantes. Id in epidemicis quibusdam constitutionibus præsertim evenit, in quibus qui morbi naturam assequuntur, parciori & cauta manu sanguinem fundunt, aut emeticis, aut eccoproticis magis confidunt, sicque plerosque ab exitio præservant.

(*) Vide nostram additionem, sive = *Giunta alla osservazione XXVIII. della Par. 2. de' Saggi di medicina pratica di PIER-PAOLO DALLARMI.*

(**) Vide item aliam = *Giunta al consulto 3. Par. III. ejusdem operis Faventis editi in 4.*

DE VOMICA, EMPYEMATE SCIRRHO, & GANGRÆNA.

§. CXLII.

Morbi transitus in alios morbos tronicos.

Quæcumque tamen adhibita fuerit curandi ratio, interdum tanta vis morbi est, ut vel brevi occidat, vel in lenta alia mala transitum faciat, Itaque pulmonum, aut thoracis inflammatio, quando intra dies quatuordecim, aut viginti & duos non resolvitur, nec per exspuitionem repurgatur, HIPPOCRATE monente (a), in suppurationem

nem abit. Si pus inde confectum non excreetur *Suppuratio.* simul, ac conficitur, sed intra pulmones peculiari in loco, quasi in cystide quadam coacervetur, *Vomica* is abscessus dicitur (*); quemadmodum *Vomica* etiam appellari solet similis puris collectio, quæ *tubercula* pulmonaria, aut catarrhalem congestionem suppuratam, vulnus, contusionem, hæmoptysim subsequitur, aut quocumque alio in viscere fit. Si vero pus in thoracis cavum e pulmonibus, aut pleura delabatur, spatiumque illud vacuum oppleat, morbus sit, quem *ἐμπύεμα* * *Empyema.* vocamus; quanquam *empyematis* quoque nomen obtineat pus in cavo thoracis collectum, undecumque profluxerit, sive a, *mediastino* sive a *pericardio*, sive a *diaphragmate*, aut *hepate* aut *liene* ipso, sive ab effusis in cavum pectoris humoribus, ibique putrescentibus pronascatur. *Empyema* ex suppurato, atque exeso *pericardio* vidit FRID. CASIMIRUS MEDICUS (b); a pure ex *hepatitis* abscessu per arrosam diaphragma in cavum thoracis effuso refert MORGAGNIUS (c); ex *liene* simili modo pus in sinistrum pectoris cavum per erosum, perforatumque diaphragma eructante vidi egomet ipse, & sectione cadaveris confirmavi. Cognovi vero ex tumore *lienis*, qui dolore inflammatorio laboraverat, repente evanescente, & inde aucta difficili respiratione, majoreque puris copia ex foramine, quod in latere thoracis sinistro ob *suppuratam pleuritidem* apertum fuerat, profuente.

Observationes. Suppurati pericardii, & lientis.

Observatio auctoris. Quomodo cognoscitur.

(a) Lib. I. de morb. n. 24. (b) *Observ. med.* T. II. p. 648.

(c) De sed. & caus. morb. Epist. 26. n. 4.

(*) GAROMUS RICHÆ (*Constit. epid. Taurin al-* RICHÆ *observa-*
ter. (describit pleurides, & peripneumonias, quæ tiones de
ery-

*vomicæ-
rum na-
tura.*

erysipelatibus epidemice vagantibus subsequatæ sunt, facile in *vomicas* transeuntes. Ibi §. LXI. narrat, monialem quamdam *folliculum vomicæ* etiam expulisse. Vocat *vomicas folliculatas* eas, quæ ex aliqua pulmonari vesicula expansa, & pure plena confiunt. Putat vasa circum vesiculas ludentia effundere posse sanguinem in ipsarum aliquam, ibique collectum pus conficere. (1) Et §. LXIII. pus fieri inquit vel a sanguine, vel a lymphâ, & pro varia materie, unde fit, varium quoque esse. Distinguit etiam verum pus a purulento. *Ex sch. auct.*

(1) Etiam in pericardio effundi sanguinem posse sine ulla ruptura, patet ex *observatione* GUILL. THOMPSON, quæ exstat in *Comm. Lips. Vol. XVIII. P. 3. p. 404. Ex sch. auct.*

§. CXLIII.

*Suppuræ-
tionis in-
dicia.*

Fieri autem suppurationem (§. CLXII.) indicium est, si dolore, qui prius torquebat, cessante; febris non desinat, quinimo sine manifesta causa inordinate exacerbetur; interdum mitior, vesperi gravior; rigoribusque interdum, geniarum deinde rubore stipetur; demum doloris loco, quæ antea erat, pondus percipiatur. Præterea si sputum, quod exigua quidem copia ejicitur, jam ab initio magna tussi excreetur, & falsum sit, deinde dulcius videatur; atque anima fœteat, respirationisque difficultas perseveret. Facto jam pure, sive suppuratione absoluta, sudore multi & tenues circa pectus, aut collum, & cervicem erumpunt; tussis & tussiendi cupiditas sine notabili exspuitione vexat; oculi cavi; atque ungues adunci fiunt; maxillæ rubent; summi digiti præter modum calent; appetitus prostermitur, & deficit; alvus quandoque liquescit; & passim postulæ toto corpore erumpunt, Quod si in alterutro tantum

*Puris fa-
cti.*

tum latere suppuratio contigerit, ægrotans, quando in sanum se convertit, percipit quasi desuper suspensi, ac impendentis ponderis sensum; latus etiam; in quo suppuratio facta est, & pondus insidet, altero calidius esse consuevit; & sæpe dolet, exteriusque intumescit: Effusum porro in thoracis cavum pus fluctuatione, aut strepitu; dum corpus vel concutitur; vel circumvolvitur, se prodit; nisi plenissima omnia; sint, quo casu nulla fluctuatio nullusque strepitus percipi posse videtur. Sed tum summa saltem inspirandi difficultas, & febris lenta perpetuo tenet; diaphragma deprimitur; depressumque hypochondriorum, atque epigastrii regionem cum ponderis sensu attollit, extrorsumque propellit, ut obstructions, aut asciteni (a) mentiatur, quod sæpe observare mihi contigit; pedes, & sæpe etiam facies tumunt; urinæ aliquid sedimenti albi, fœtentis, aut visceri deponunt; sapor quidam putridus os inficit; similisque halitus inde emanat; macie corpus contabescit, atque alia sunt, quæ tabis propria sunt. Difficilem vero respirationem; quæ *empyematis* indivisibile signum quibusdam visa est, interdum abesse, facilemque in utrumque latus decubitus in hujusmodi morbo fuisse testantur cel. virorum observationes (b). Denique, si AVENBRÜGGERO (c) fides habenda est, thorax in *empyemate*, inferiori & postica parte percussus, obscurum & mutuum sonitum reddit.

Empyematis signa.

An difficilis respiratione pathognomicum signum?

(a) SWIETENIUS §. 302. 303.

(b) PANAROLII nimirum, MARCHETII, DRANII, MOEGAGNII, aliorumque. Vid. *Giornal. medic. veneto* T. II. p. 350 (c) p. 79.

§. CXLIV.

*Vomica
quando
erumpi-
tur.*

*Boni exi-
tus signa.*

Vomica plerumque rumpuntur *vigesimo* die, ex quo primum dolorem, aut gravitatem æger sensit, aut febricitavit, aut rigore prehensus est; interdum *quadragesimo*, immò etiam *sexagesimo* uti ex *Coacis prænotionibus* habemus. Multo etiam tardius eas nos dirumpi videmus, nimirum *tertio* usque a morbi principio *menſe*, ægro deinde perfecte restituto. Illi autem servari solent, qui statim post vomicæ ruptionem a febre liberi evadunt, pus album, oderis expers, leve, non variegatum, coctum facile, & cito exscreant, alvi fluxu corripuntur. Secus, quibus contraria accidunt,

§. CXLV.

*Vomica
lantes, &
a nulla
caussa
manife-
sta geni-
ta.*

*Hujus
notæ ab
HOFF-
MANNO
descri-
ptæ.*

Quæ sensim, & sine manifesta causa, sive sponte gignitur *vomica*, ita interdum latet, ut, monente TULPIO, vix ulla sui proferat indicia. Ceterum primum tussicula sicca, deinde humida eam comitatur. Postea spiritus difficilius trahitur, deficit anima, atque emarcescit corpus, licet interim nec sanguinem sputa præseferant. HOFFMAN-
NUS vero (a) hisce notis eam significari scribit; diuturno, fixo, & comprimente spiritus dolore, qui nec per sputa, nec per sectionem venæ, nec per alia remedia resolventia mitescit, nec tollitur, sed cum tussi sicca, pulsu celeri, halitus fœtore, marcore corporis, virium languore, appetitu dejecto, largo sudore persistit. Magnitudo vomicæ ex majori spiritus angustia, ingenti anxietate, pulsu duro, quandoque erecto corpore inter-

intermittente dignoscitur. Verum cl. UNZERUS *Non tamen certa ejus signa sunt.*
 (b) signa vomica incerta omnino esse, multiplici experientia demonstravit. Illud tamen fere constantissimum est, rigorem & febrim accedere, quando ruptioni propior est.

(a) *Med. Systematic.*

(b) *Promptuar. Hamburg. T. IX. p. 309. Vide Commentar. Lipsien. Vol. II. P. 3. p. 480.*

§. CXLVI.

Rupta vero vomica vel subito pereunt suffocati, dum copiosum pus repente impellit, obstruitque aerea pulmonis vasa; vel si primum hoc discrimen effugerit, paullo post, illico prostratis omnibus vitæ viribus, deficiunt (a), aut lenta (*) tabe pereunt. Constat tamen testimonio, ac observatione ccl. virorum, longe plures evadere ex vomica, quæ peripneumonia, aut pleuritidi succedit; licet ingens puris copia simul, & semel erumpat, quam ubi pus ex minoribus abscessibus effundatur (b) Empyema raro absorptione, & Quomodo resolvitur empyema?
 diadoche solvi visum est; rarissime per exesos pulmones sibi viam parat, expuiturque; sæpius pleuram, musculosque intercostales trajicit, forasque sensim producitur.

(a) SWIETENIUS §. 1204. 1205.

(b) HIPPOCRAT., MEADII, SWIETENII, aliorum, Vomica chronica exempla
 & nostra quoque experientia. Vid. SWIETEN. §. 1206.

(*) Vid. DALLARIUM *Saggi di di med. pratic.*
 T. 3. p. 262., & 263. WILLISIUS observavit quamdam speciem vomicarum, quæ callosæ sunt, & fundunt pus per plures annos. Vid. RICHÆ §. LXII.
 cit. *Constitut. epidem. Taurinen. Ex sch. auct.*

Tom. VII.

L

§. CXLVII.

§. CXLVII.

Curatio vomicae disrupta. Cognita per suas notas (§§. CXLII. CXLIII. & seq.) *vomica* ; ejus disruptio bechicis ; lubricantibus , emollientibus ; vapore aceti ; vel vini calidi inspirato ; cantu ; concussione corporis ; scalarum ascensu ; sternutamentis ; quin immo vomitu promoveri a nonnullis consuevit . Verum cautissime se gerant medicus in tribus ultimis præsiidiis administrandis viresque ægri , & reliqua symptomata prudenter prius expendat . Puris evacuationio , ubi jam inceperit ; adjuvanda iis est , quæ alibi , ubi de *tussi* (*cap. I.*) ; aut *phthisi* (*cap. III.*) *pulmonari* actum est , proposuimus . Purgato probe vomicæ cavo vulnerariis ; victu vegetabili , lacte , & peruviano cortice utendum est , ut coeat (*) . Aquam etiam calcis vivæ , ubi vomica diutius pus amandat , exsiccarique non facile potest , vel sola , vel lacti mixta ab auctoribus non infirmæ notæ celebratur . Ad ipsum , ut detergens & simul consolidans medicamentum ; commendat nicotinam ETTMULLERUS (*a*) .

Exsiccantia.

(*) Vid. DALL'ARMIO Saggi di med. prat. p. 2. osservaz. xxvii. , & quæ sequuntur ; item osserv. xxviii. (*a*) In Schroder...

§. CXLVIII.

Curatio empyematis. Paracentesis. *Empyemati* autem paracentesi , quæ interdum feliciter cessit ; succurrendum mature est (*a*) . Hæc in dorso intra nonam decimam costam quinque vel sex digitis à spina instituitur . Veteres vero intra sextam , & septima costam e latere

genus

genus hoc chirurgiæ adhibebant. Interdum etiam eo in loco fit, quo latus tumet, & prominet.

HIPPOCRATES diaphysim alicujus costæ perforari præcipiebat. Suppurata pleuritide laboranti perforatum est latus affectum; & perbelle convaluit; vixitque plures annos (b), Nec minus prospere

*Costarum
diaphysis
ex HIP-
POCRA-
TE.*

hujusmodi punctiōnem pluries cessisse, observatum a nobis est (c). Sed accidit quandoque, ut nihil ea profuerit. In agro quodam pleuritide biliosa, quam sæpe hydrothorax excipiebat, chirurgus paracentesi eduxit magnam feri copiam, sed

*Prospera
paracen-
tesis ob-
servatio-
nes.*

die postera mors eum abstulit (d). Id potissimum evenit; quando pulmo magnam partem corruptus, exesusque est. Paracentesim vero nonnulli vituperant; rejiciuntque ex eo, quod cum sæpe pleura pulmoni adhæreat, ea vulnerari pulmo possit.

*Quando-
nam im-
prospere
cedat?*

Quo casu non punctiōne quidem, sed incisione latus aperiatur, deinde digitis, aut manubrio scalpelli leniter removendus pulmo est (*). WIL-

*Quando
punctiōne
præstat
sectio a-
teris?*

LISIUS fonticulo, qua thorax pertundi consuevit, inusto, ac diu manante nonnullos restituit (e). Veteres ustione idipsum præstabat. Apud Ægyptios; ut narrat ALPINUS (f), ustio sic peragitur. Gossypii pyramidem linteo lineo involvunt. Basim ejus loco inurendo imponunt, atque affigunt. Deinde apici flammam admovent, sinuntque comburi, donec cutis subjecta, quantum opus est, inuratur. Quale demum pus ex sectiōne, vel ustione prodire debeat, ut prosit, docuit HIPPOCRATES, quando dixit (g): Qui sup-

ustio.

purati uruntur, aut secantur, si quidem purum exeat pus & album, evadunt: si vero subcruentum, & cœnosum, & graveolens pereunt. Sed dum hæc aguntur, intrinsecus danda profecto sunt antiseptica, & blandissima balsamica; & si-

*Methodus
Ægyptio-
rum in
ustione
peragen-
da.*

Quamnam intrinsecus, &

*Puris
diagnosis
ex HIP-
POCRA-
TE.*

Quamnam intrinsecus, &

*Quamnam
intrinse-
cus, &*

extrinsecus
adhibenda?

mul extrinsecus injicienda quæ abstergenti, ac vulneraria virtute pollent. Nec aliter ferme tractandi qui suppurationem *mediastina*, aut *pericardio* (§. CIII.) subierunt. Pus enim sub sterne collectum educitur *perforato sterne*, vel *pyulco* exhaustur (b). Qua vero ratione e *pericardio* educi debeat, tradetur *capite* sequenti §§. CXC. CXCI. CXCII.

(a) SWIETENIUS, LUDWIGIUS, BAYROTUS DE JONQUERES *Thef. Paris. a 1762.*, ORTESCHIUS *giornal. di Medic. t. 11. p. 350.*

(b) GUIDETTIUS *dissert. 11. p. 187.*

(c) DALLARMUS *Saggi de Med. part., ubi a BURSERIO in additionibus exempla afferuntur.*

(d) GUIDETTI *l. c. §. 12. p. 187.*

Observatio
WERNERII.

(*) JOSEPH WERNERUS curavit *empyema* incisione in dextro thoracis latere instituta. Nam inter *decimam & undecimam* costam quatuor circiter digitis procul a vertebris ita scapellum infixit, ut secundum costarum directionem, & propius a margine superiori *undecimæ* costæ, ne *intercostalis arteria* læderetur, incisionem perageret. Statim ac musculos intercostales disseccuit, xx. puris uncia effluerunt. Digito vero intra thoracis cavum immisso, nullibi pulmones pleuræ adhærentes detexit. Illico ab emissio pure symptomata remiserunt, nec multo post æger convaleuit. *Vid. Comm. Lipsiens. Vol. III. P. 1. p. 45. Ex Sched. Aut.*

(e) (f) *De medic. Ægyptior. lib. III. cap. 12.*, ORTESCHIUS *l. c. an. 1764. n. 44. p. 350.*

(g) *Aphor. 44. sect. VII.*

(h) RIOLANUS *Enchirid. anatom. lib. III. cap. IV. p. 206. Consulatur quoque si libet cl. LOURDIUS, cujus doctrina de paracensis optimo effectu, & exitu exponitur sequenti capite ad calcem §. 191. Vide ibi.*

§. CXLIX.

Cum vero inflammatio (§. CVIII.) neque re-
 solvatur, neque in suppurationem (§. CXLII.)
 desinat, neque illico, aut intra paucos dies vitam
 & spiritum (§§. XCIX. CXV. CXVI.) inter-
 cipiat; tum vel *scirrhus*, vel *gangræna*, sive *ne-
 crosis* inflammationi finem imponit. Illud ubi e-
 venit, lentum & diuturnum malum relinquitur;
 præsertim si indurata pars non exiguo spatio con-
 tineatur. Ibi enim ponderis cujusdam sensus per-
 cipitur; difficilis respiratio est, quæ dum corpus
 movetur redditur difficilior; decubitus vel in al-
 terutro tantum latere, vel in dorso possibilis,
 quia aut dolore, aut tussi, aut spiritus oppres-
 sione ægri corripuntur. Si vero parvi, & sparsi
 sint per pulmonum varia loca scirrhusi tumores,
 qui ab inflammatione relictæ sunt; tunc potius
 tussi sicca, frequenti, ad quemvis motum aut
 longiorem sermonem ingravescente, quam aliis
 signis dignoscuntur. Sæpe etiam in his pulsus
 parvus est, inæqualis, & justo celerior. Sed ma-
 lum plerumque id est, cui *neque gummi, neque*
sapo, neque cicuta, neque alia vel ab ipso *mer-
 curio deprompta* tollendo plerumque valent (*).
 Si alterum vero, nempe *gangræna* contigerit, le-
 thale est. Id accidit, quando inflammatio vehe-
 mentis in initio aut neglecta fuit, aut calefacien-
 tibus remediis exasperata. Ubi igitur *gangræna*
 incipit, jam dolor evanescit sine manifesta caus-
 sa, ejus loco pondus in pectore percipitur; vi-
 resque summo opere dejiuntur; pulsus fit omnino
 parvus, debilis, celer, inæqualis; facies pallida,
 tetra, interdum rubro-cærulea, extrema frigent;
 sputa

Quando
in scir-
rhus vel
gangræ-
nam de-
sinat.

Diagno-
sis scirrhi
tam eran-
dis, quam
parva
molis.

Prognosis.
Curatio
nulla
ferme.

Gangræ-
ne pro-
gnosis, &
caussa.

Diagno-
sis gan-
græna.

Quid
præca-
vendæ
condu-
cat?

sputa livefcunt, nigricant, sæpe etiam fœtent; la-
tus interdum, quod dolor vexavit, macula ni-
gra, aut livida fœdatur; mens movetur; & bre-
vi mors scenam complet. Imminens hujusmodi
malum vix præcaveri potest. Non tamen omit-
tenda sunt pleraque antifeptica, & cardiaca, de
quibus mentio (§. CXXXVII.) jam facta est.

(*) Hic in mente revocentur, quæ ab auctore
tradita sunt §. 78. *Comm. de inflamm.*, vol. 3. §.
389., & alibi.

P A R A P L E U R I T I S.

§. CL.

Historia
morbi.

Interdum *pleuritis notha* (§. XC.) (quæ ve-
ra quidem inflammatio est, sed *pleuram*, *exterior*-
esque thoracis partes afficiens) neque in *absces-*
sum, neque in *gangranam*, neque in legitimum
scirrhum terminatur, neque demum ex toto re-
solvitur: verum plerisque symptomatibus remissis
æger ita videtur restitui, ut nihil aliud eidem
superfit, quam dolor, qui eum diu tenet, ve-
xatque modo levior, modo gravior. Sed inte-
rim hujusmodi lateris dolore angitur, & vires
vix potest pristinas acquirere. Deinde non multo
post tempore circa vesperam de insolito quodam,
& molesto calore queritur, qui paullatim in con-
tinuam febriculam degenerat, horis pomeridianis
quotidie invalescentem. *Amphimerinam* dicunt.

Ejus pro-
pria sym-
ptomata.

Dolor

Febris
ratio.

Sudoris
ratio. ?
Differt a
phthisico
sodore.

In ejus augmento sudor emanat, viribus valde
officiens. In remissione vero, quæ circa matuti-
num tempus accedit, nullus erumpit, contra ac
phthisicis evenire solet.

§. CLI.

Præterea qui hoc affectu laborant vix in affectum latus possunt decumbere ; spiritumque ita moderantur , ut quamminimū fieri potest pectus moveant , attollantque , ne videlicet dolorem , qui inspiratione pleniore exacerbatur , intercostalibus musculis agentibus , ut costas elevent , reddant multo acerbiores . Fieri tamen non potest , ut in tanta pectoris compressionē pulmones non satis expansi sanguine congesto turgeant , & suspiriis , aut oscitationibus frequentibus egeant , ut quodammodo ab anxietate liberentur . Nulla iis raucitas est , sed longo sermone si velint uti , defatigantur , anhelantque . Pulsus quacumque hora explorentur , crebri , duri , & parvi sunt . Sanguis e vena missus arcte coit ; induratur , crustaque pleuritica contegitur . Atque hæc sunt propria , & quasi perpetua hujusce morbi phenomena .

*Quomodo
ager de-
cumbat ,
& spiri-
tum du-
cat ?*

*Qui pul-
sus ?*

*Crusta
pleuriti-
ca in
sanguine.*

§. CLII.

His (§. CLI.) interdum adjunguntur tussis inanis ; aut sputa plerumque tenuia ; pauca , & striis quandoque sanguinis tincta , ob difficilem nempe per pulmones compressos humorum circuitum ; dolor capitis ; oscitandi frequens necessitas ; & demum aliqua macies , quæ tamen tardissimo passu supervenit , & tunc solummodo , cum morbus ita processerit , ut sputa purulenta , & sanguinea uberibus excreari cœperint .

*Alia si-
gna mi-
nus pre-
cipua , &
frequen-
tia.*

*Macies
quando ?*

§. CLIII.

Qui pri-
mus hunc
morbum
parapleu-
ritidem
vocavit.

In quo
sepe, ex
ZEVIA-
NO con-
sistat pa-
rapleuriti-
tis.

Periodus
morbi, &
exitus.

Hanc pectoris affectionem ZEVIANUS veronensis non incelebris in opusculo, quod de eadem evulgavit anno 1766., novo quodam vocabulo nuncupavit *parapleuritide*, quæ tamen, ut ipse animadverit, sæpius consistit in solo lateris dolore a *pleuritide notha* relicto nunc continuo, nunc intermittente, nunc ad tempestatum mutationes tantum, aut ad validiorem corporis motum sensibili. Is non raro post aliquod temporis spatium per se solvitur, & omnino cessat; nonnunquam vero plures menses eo ipso, quem supra exposuimus; circuitu miseros ægrotantes excruciat, donec in pectoris interiori pariete, in ipsis pulmonibus lethalia ulcera induxerit.

§. CLIV.

Differt a
phthisi
secunda-
ria inci-
piente.

Nec cuiquam in mentem veniat, hujusmodi morbum phthisim pulmonarem incipientem secundariam esse. Nam differre eam a phthisi contendit cl. ZEVIANUS; quod in *phthisi* pulsus debilis, & mollis plerumque est; sudor aut noctu, aut post somnum, præsertim matutine tempore, oboritur; facilius in latus affectum decumbitur; sputa crassa, & purulenta prodeunt; dolor obtusior, & interior (si ullus est) videtur; maciesque celeriter progreditur. In *parapleuritide* vero pulsus subdurus, & validior est, & omnia symptomata (§§. CL. CLI. CLII.) contrario pene modo se habent, ut prænotavimus.

§. CLV.

Quoniam igitur a congesto, hærentique inflam- *Curatio.*
 matorio glutine in latere, quod pleuritis invase-
 rat, proficisci ea (§. CL.) videtur, ideo venæ *p.s. ite-*
 sectione prudenter iterata potissimum discutienda *rata.*
 est. Sanguis enim e vena missus crustam pleuriti-
 cam præfert. Neque metuendum est, ne per
 eam vires magis magisque elidantur; cum expe-
 rientia ostenderit, id auxilii & optime ferri, & fe-
 liciter administrari. Præterea, ut malum penitus *Remedia*
 extirpetur, ea quoque in usum vocanda sunt, *tempe-*
 quæ attenuant, incidunt, & resolvunt, & præ- *rancia,*
 fertim quæ contra pleuritidem (§§. CXXXII. *inciden-*
 CXXXIV.) commendata fuerunt. Quandoque e- *tia, &*
 tiam in pertinaciori casu properandum erit ad sa- *resolven-*
 ponem venetum; millepedes, gummi ammoniacum, *ti.*
 lignum assafras, radices bardanæ, smilacis, *Quæ præ-*
 chinæ, arundinis montanæ, ad diluta foliorum *stantiora*
 absynthii alpini; *genepi* vulgo dicti, cardui bene- *sint?*
 dicti, similiumque. Sæpe enim hæc a nobis ad-
 hibita magno cum ægrotantium emolumento fuisse
 testamur. An *parapleuritis* illa phthiseos incipien- *Quæstio*
 tis species est, quam juxta cel. auctores expu- *de para-*
 gnant parvæ, sed repetitæ sanguinis missiones.] *pleuriti-*
de.

INFLAMMATIO DIAPHRAGMATIS.

§. CLVI.

In *pleuritide* non raro *diaphragma* simul inflam- *Dia-*
 matione occupari, alibi (§. CIII.) monuimus, At *phragma-*
 diaphragma etiam solum inflammari, & quidem *tis in-*
 primario, verosimile omnino est. Id rarum esse *flamma-*
 passim *tio.*

An rara sit, vel frequens? Opinio LIEU. TAUDII. passim asserunt. HUXHAMIIUS vero sapius hujusmodi morbum offendi, quam vulgo creditur, auctor est. LIEUTAUDIO autem non videtur a *pleuritide* prorsus differre. Illud sane certum est, quædam

Paraphrenitis BOERHAAVIO est, aliisque.

Signa ejus diagnosticæ.

peculiariora, cum diaphragma inflammatione correptum est, symptomata observari, quæ a pleuritide sive vera, sive notha longissime absunt. *Diaphragmatis igitur inflammationem*, quam proprie *paraphrenitidem* nonnulli appellandam volunt, indicant acutissima febris; dolor immanis circa costas spurias ad lumbos, dorsumque se extendens, & quasi cingulo circumambiens; tussis sicca, dolorem exacerbans; respiratio ut plurimum parva & frequens, rarissime magna & minus frequens, interdum inæqualis, ac inordinata, genarum rubor; palpitatio in hypochondriis; hypochondria distenta, dolentia, sursum introrsumque (*) sæpe retracta; suspiria, aut suspirii desiderium; pulsus celerrimus, exilis, durus, tandem tremor; tendinum subsultus; convulsio; risus sardonius; anhelatio; singultus; & non raro delirium, & furor.

An delirium semper comes paraphrenitidis.

BOERHAAVIUS (a) delirium cum *inflammationem diaphragmatis* semper copulari censet. At MORGAGNII observationes, aliorumque BOERHAAVII sententiæ adversantur (b). MICH. SARCONUS (c) opportune animadvertit, diaphragmatis inflammationem neque delirium perpetuum, neque risum sardonium, nec alia attulisse, quæ cum BOERHAAVIO docuit SWIETENIUS (d). Ego etiam observavi, hæc a vera diaphragmatis inflammatione abfuisse (e). Jure igitur MORGAGNIUS concludit, modò delirium ab ea abesse, modò cum eadem reperiri (f).

a) *Aphor. de cognosc. & curand. morb.* §. 909.

b) *De sedib. & caus. morbor. epist.* VII. n. 14.

(c) *Par.*

- (c) *Par. I. p. 209. Istoria ragionata de' mali ec.*
 (d) *In BOERHAVII aphorism. §. 909.*
 (e) *De morb. capit. vol. III. §. CCXIV. & seqq.*
 (f) *L. c.*
 (*) *Introrsum hypochondria trahuntur tum a diaphragmate contracto costasque spurias intro adducente, tum a peritonæo, quo inferius diaphragma & ipsa hypochondria obvestiuntur, inflammato crispato & attracto: quod RIOLANUS existimavit. Encheirid. anatom. lib. III. cap. V.*

§. CLVII.

Exitiosum, lethiferumque malum efficacissimis statim præsidiiis oppugnandum est. Quo enim vehementiores causæ intulerit, quo major sanguinis acritudo concurrerit, eo majus periculum. Tota fere spes in venæ sectiones, in clysmatibus, in fotibus, atque antiphlogisticis remediis posita est, & locata (a). At HUXHAMIIUS sanguinis unciiis ferme centum intra quatrimum detrahitis, multisque aliis adhibitis artis adjumentis non potuit quempiam *diaphragmatis inflammationem* laborantem servare (b). En quantum morbi magnitudo quancumque artis, medici præstantiam eludit!

Prognosis, & curatio.

V. S.

largior, fotus, chlysmata, & antiphlogistica remedia.

HUXHAMII observatio.

(a) *Vid. vol. III. de morbis capitis harum institutionum §. CCXV. & seqq.*

(b) *Epidem. T. II. p. 118.*

CAPUT V.

DE HYDROPE PECTORIS,
PERICARDII, ET PULMONUM.

§. CLVIII.

Uberior serosi, lymphaticque humoris in ali-
Definitio quod corporis cavum effusio, atque in eodem
hydropis.
Hydrops: congestio, & stagnatio proprie * Ὑδρωπς appella-
 tur. Hinc si in cava capitis, thoracis, pericar-
 * *Hydro-*dii, abdominis, uteri, omenti (*), tunica va-
cephalum. ginalis testium serosus humor confluat & coacer-
 * *Hydro-*ginalis testium serosus humor confluat & coacer-
thoracis. vetur, * Ὑδρωκέφαλον hydrops pectoris, sive **
 *** *Hy-* Ὑδρωθώραξ; hydrops pericardii, sive *** Ὑδρω-
drocar- καρδιά Ἀσπίτης Ὑδρωκήλη proveniunt, de quibus
dia asci- partim alibi (a), partim in præsentiarum.
tes, hy-
drocele.

(*) Hydrope omentum corripitur, qui solus in-
 terdum, & sine ascite reperitur. Initio fluctuatio
 tantum in eo percipitur, quæ evanescit, cum la-
 minæ fuerint induratæ per aquarum pressionem.

Ex POR- PORTALUS *mem. de l'Academ. Roy. ann. 1770.*
TALIO & 1771. p. 541. Disrupto autem omento, quod sit
observa- etiam emeticis, oritur ascites. Idem *ibid.* Exem-
tydrope plum pariter hydropis peritonæi legitur in *actis*
omenti *Helveticis* T. VI. p. 186. Similia habentur apud
sine asci- LITTRIUM (*mem. de l'Acad. Roy. T. VII. p. 142.*
te. edit. vonet.), & apud CHOMELIUM *ibid.* p. 170. Ex
sch. auct.

(a) Vid. Vol. III. cap. II. de hydrocephalo, &
 spina bifida &c.

§. CLIX.

Sunt vero quidam veluti gradus ad *hydropem* proprie dictum, quos noscere oportet, quousque cum hydropse ipso nonnulli confundunt. Si enim vasa quæcumque sero turgeant, ut totum corpus candicet, morbum pariunt, qui * *Λεucoφλεγματία* dicitur. Hanc alii ad * *Καχεξία* tantum, alii ad ** *Ανασάρκω* referunt. *Cachexia* autem est malus totius corporis habitus, & depravatus ejusdem color, & nitor. *Anasarca* vero fit, ut quibusdam videtur, si humor viscidior non tantum in vasis, præsertim lymphaticis, hæreat, verum etiam per cellulosa tela spatia diffundatur, tumentemque corporis habitum ita reddat, ut digito alicubi pressa cutis non tam facile cedat, nec impressum vestigium, siue foveam diu retineat; quamquam fatendum est, de hoc inter omnes non convenire. LUDWIGIUS enim in *leucophlegmatia* duriorem tactui tumorem, in *anasarca* molliorem existimat, qua in re consentientem habet cl. SWIETENIUM (a). Hic enim in *leucophlegmatia* scribit *pituitosum* magis humorem, in *anasarca* *tenuiorem*, & *acquosior* peccare; in *leucophlegmatia* magis æquabiliter totum corpus intumescere, ideoque laxius esse, & pastæ instar mollius; in *anasarca* ab inferioribus incipere tumorem, & sensim ascendere.

(a) In BOERHAAV. aphor. §. 72.

§. CLX.

Quod si vasa pleraque; & cellulosa tela inter spapedines humore aqueo in aliqua tantum corporis parte,

Tumores
varis ad
hydropem
dispo-
nentes.

* Leuco-
phlegma-
tia.

* Ca-
chexia.

** Ana-
sarca.

Quid ca-
chexia?

Anas-
cu quid?

TUD-
VIGII,
SVVIE-
TENII
opinio.

OEdema
quid sit,
& quo-
tuplex.

parte, veluti in *pedibus*, *capite*, *facie*, *palpebris*, *genis*, *faucibus*, *scroto*, aliisque locis repleantur; & tumeant, tumorque sit mollis; frigidus, albus, impressi digiti vestigium retinens, *œdematis* obtinet *nomen*; estque *hydropis* quoddam initium. Itaque pro varia partium ratione, quas serosa occupat colluvies, varia etiam *hydropis* genera oriuntur; & speciatim si totum corpus afficiatur, *universalis*; si pars, *particularis* hydrops exsurgit.

Diviso.
Hydropis
particu-
laris, &
univer-
salis.

§. CLXI.

Duplex autem cujusque *hydropis* origo; & causa est, vel ab *universi* sanguinis vitio, vel a solidarum partium mala constitutione: Ab universi *sanguinis* vitio; si serosa ejus pars supra ceteras immodice excreseat, aut a reliquarum mixtione secedat; exuberetque, ut vel e vasorum tunicis per poros, quos vocant inorganicos, exsufflet, vel vasa lymphatica præter modum opteat, urgeatque, vel per arteriolas exhalantes in cellulas, cavæque corporis transfluat; ibique congesta consistat; aut si acritudine tanta peccet, ut minima erodat vascula, atque inde in vacua spatia exstillet. *Solidarum* vero partium culpa; si vasa minima ita laxentur, nimiam serosi humoris vim admittant; tantumque ejusdem in cava effundant; quantum nec recipere, nec revehere venæ inhalantes possint; aut ita repleantur, extendanturque, ut in hydatides pene expansa, & conversa demum lacerentur, liquoremque continenter eructent.

Causa,
& origo
morbi
duplex.
Sanguinis
vitia
que &
quot?

Qua, &
quo soli-
dorum
vitia?

§. CLXII.

Effusus autem humor a venis inhalantibus re- *Alia*
 sorberi haud poterit, si crassus & viscidus ille sit; *Causse*
 si ostiolâ earum obstructa, aut contracta viam in- *hydropis*
 gressuro denegent: si atonia atque inertia laborent *genera-*
 ideoquæ ejus propulsionem non adjuvent; si ali- *tim sum-*
 quod impedimentum in venis majoribus, harum- *pti.*
 que truncis reperiatur; *obstructio* nimirum, *tu-*
mor, *polypus*, *compressio*, *magna organica vitia*, *Vitia ve-*
 atque alia, quibus *reditus sanguinis ad cor*; *narum*
 adeoque *venarum absorbentium in venas majores* *majorum,*
exoneratio retardetur; aut penitus *inhibeatur*. *quibus*
 Id præfecto sæpissime patet ex cadaverum disse- *sanguinis*
 ctionibus, in quibus frequentissime detectum est, *reditus*
 causam *hydropis*; præcipue *pectoris*, & *pericardii*, *ad cor-*
 de quibus hic potissimum agimus, aliquod in ve- *retarda-*
 nis majoribus circa præcordia vitium, quo liber- *tur.*
 humorum in cor refluxus cohiberetur, existisse. *Frequen-*
tior caus-
sa hydro-
thoracis;
& hydro-
cardia ex
anatomo-

§. CLXIII.

Ex his (§. CLXI. & CLXII.) facile intelligi- *Causse*
 tur; quam multiplices remotæ *hydropis* causæ *remota*
 universim esse queant; uti febres intermittentes, *hydropis.*
 aliique diuturniores morbi; immôdicæ, sanguinis
 præsertim; evacuationes; hepatis; lienis, pancrea-
 tis, & ceterorum abdominis viscerum labe, at-
 que obstructio; suppressæ perspirationis, atque uri-
 næ excretiones; nimius potus, præsertim frigidus
 calente corpore (a); scabies retrôpulsa; asthma;
 tumores varii, præsertim glandulæ induratæ; æ-
 neurysmata; varices; polyposæ concretiones; ma-
 la thoracis conformatio, aliasque sanguinis libe-
 rum

rum cursum, aut congruam ejusdem in pulmonibus & corde miscelam, & elaborationem pervertentia, & in primis pulmonum inflammatio, scorbutus &c.

(a) MORGAGNIUS *Epist.* XVI., & HIPPOCRATES *Epidemi.*

§. CLXIV.

Hydrothorax His generatim præmissis, propius ad *hydrothoracem*, sive *hydropem pectoris* progredimur. Hic etiam * HIPPOCRATI ὁ ὕδρωρ dictus est. Serosus autem, sive aqueus humor aut in *alterutra*, aut in *utroque pectoris cavea* continetur; vel in *cyfide* quadam, sive *sacco* includitur, quando nimirum, cellulosa quædam interstitia pone pleuram, aut circa pulmones & pericardium, aut ipso *mediastino* ita expanduntur, aqueumque humorem sic recipiunt, ut *vesicas*, *sacculosque* utris in modum aqua pleni referant. Prior *hydrothorax* simpliciter, sive *non σάκκωτος* idest *non saccatus*; posterior *hydrops σάκκωτος*, sive *saccatus* nominatur. Uterque quidem cognitu difficilis, sed *encysticus* multo difficilior est.

§. CLXV.

Hydrothoracis tamen *non saccati* signa hæc recenset DUVERNEYUS (a); nempe summam spirandi difficultatem; facilem in latus affectum, si unum tantummodo latus ægrotet, decubitum; in latus sanum pene intolerabilem; respirationem erecta cervice, aut incurvato ad anteriora corpore minus impeditam; demumque faciem hippocraticam, His

His alii adjiciunt pedum œdemata, sitim inextinguibilem aut saltem faucium siccitatem, superiorum artuum extenuationem, urinam assumptorum quantitati non respondentem, paucam videlicet plerumque, rubram, crassam, & lixiviam; anhelationem in ascensu locorum acclivium, vel in decubitu, vel inter dormiendum, noctu præsertim, ita ingravescentem, ut ægrotantes e lecto proflire, ad fenestras se conferre, & liberiores auras quærere cogantur; tussiculam siccam, quæ nocturnam illam *orthopnoeam* præcipue comitari solet; pulsus parvus & crebrus; fluctuationis sensum in pectore, dum decubitum mutant, aut concutuntur; cordis palpitationem; & reliqua.

Nonnulla ab alijs adjecta.

(a) *Mem. de l'Acad. des Scienc. Edition. Vener. T. VII, p. 121.*

§. CLXVI.

Animadvertendum est tamen, signa hæc vix, nisi morbus jam adoleverit, se prodere, & ubi se produnt incerta valde esse, & dubia, uti cl. HAENIUS post MORGAGNIUM demonstravit (a); immo respirationem ipsam inter initia non valde affici, quod etiam ZIMMERMANNUS (b) notavit. HAENIO consentit FEBURIUS, qui in nota quadam ad illum ZIMMERMANNI locum aperte profitetur (c), nullis interdum indiciis *hydrothoracem* significari, nisi cum morti iam proximi fiant ægrotantes; miraturque in hujusmodi casu nullam spirandi difficultatem insurrexisse, nisi paullo ante mortem. Verum etsi id fieri interdum multis de causis posse ultro concedam, sæpe tamen incompertum est, num *hydrops thoracis* antea ad-

Incerta hæc signa initio morbi præsertim.

Facilis decubitus, facilisque respiratio cur signum fallax?

fuerit, an vero paullo ante mortem supervenerit? Quamobrem non semper fortasse credendum est, eos in quibus liberum, & facilem quemcumque decubitum, facilemque respirationem fuisse narrant historiæ medicæ, vere tunc hydropicos existisse; sed potius postremo tantum vitæ tempore in hydrothoracem incidisse; ideoque eorum pectus aqua repletum prosectoribus apparuisse.

(a) *Rat. medend.*
de T. II. p. 31.

(a) *Traite de l'experience*
(c) *Ibid.*

§. CLXVII.

MOR-
GAGNI
monita
circa di-
agnosim.
An sym-
ptoma
suffoca-
tionis ve-
re patho-
gnomoni-
ca sint?

Pulsus vero parvus, atque humilis, tussimque siccam, aut fere siccam, & nisi aliquid catarrhale expellentem, quando simul concurrunt, indicia esse cl. MORGAGNIUS existimat (a) non hydrothoracis; sed potius alicujus alii vitii, quod cum pectoris hydrode conjungatur. Neque ipse iis assentitur, qui repentinam somni interruptionem cum suffocationis metu pro signo pathognomnico (a*) habent, nam HELVICHIVS (b), & cl. HAENIVS (c) adductis in medium exemplis evicerunt; sæpe eam quidem cum aliis hydrothoracis signis reperiri, sed sæpe etiam abesse, Subditque cl. vir, hujusmodi symptoma aliis etiam pectoris morbis, pulmonum nempe, cordis, aortæ; pericardii, atque in primis spasticis earum partium affectionibus esse commune, & si quando pathognomicum hydrothoracis signum haberi possit, tunc solum posse; Jo. JACOBO VICARIO monente, cum pedum œdemata antecesserit, non vero cum subsequatur (d).

(a) *De sed. & caus. morb. epist. XVI. n. 9. & seqq.*

(a*) RI-

- (a*) RIVER. *Prax. med.* l. VIII. cap. V. CAROL.
PISO *De morb. a serof. colluv. ort. De hydrop. pector.*
(b) *Ephem. n. c. cent.* 10. *observat.* 32.
(c) *Rat. med.* P. V. p. 44., & P. VI. p. 125.
(d) *L. n.* XI.

CLXVIII.

Quamquam vero, ubi altera solum pectoris cavea aqua oppletur, decumbere æger in latus sanum nequeat, ut cl. DUVERNEYUS (§. CLXV. tradidit, interdum tamen accidit, ut in sano tantum latere conquiescere, & respirare possit. Id autem tum potissimum fieri videtur, cum pulmo, qui lateri ab aqua immuni respondet, vitium contraxerit; & ita labefactus sit, ut respirationi obeundæ impar ferme evaserit, pulmo vero in latere aqua oppleto sanus exsistat, & solus ferre respirationem absolvat, perficiatque. Nil igitur mirum, si hidrope laborans tunc facilius, feliciusque lateri ab aqua libero incumbat, cum aqua mediastinum versus maximam partem revoluta, pulmo aquæ innatans minus prematur, id eoque commodius ad aerem inspirandum explicetur.

Cur quandoque in sano latere decumbant ægri.

§. CLXIX.

At, si in utroque pectoris latere aqua confluerit, uberius tamen in altero, in altero parcius, illud, modo indicavi; haudquaquam contingit. Commodior enim est, ut patet, in affectum magis pleniusque latus decubitus. Quandoque etiam magna spirandi difficultas esse potest, licet serum, quod thorace continetur, paucum omnino fuerit;

Quando id non contingat?

Paucum serum, sed acre magnam partem

pit spi-
randi
difficul-
tatem.

modo id salibus scateat, aut quacumque alia acri-
tudinis specie cotaminetur. Eo namque sic pul-
mo vellicatur, & pungitur, ut in spanicas con-
strictiones adigantur respirationis organa, & pari-
ferme modo respiratio lædatur, quo ab aqua ube-
riore, & comprimente læderetur.

§. CLXX.

Certiora
hydrotho-
racis si-
gna.

Exema-
plum.

Ceterum, quoniam nulla pathognomonica si-
gna *hydrothoracis* vere habentur, nemo tamen
velim credat, morbum hunc ita latere, ut præ-
sens nequaquam dignosci queat. Ego quidem, si-
quid judicem, neque uno, neque altero signo con-
fidendum esse arbitror, sed singula cautissime pri-
mum, deinde omnia simul expendantur oportet,
antequam de eo feratur sententia. Itaque si, di-
ligenti initio examine, multa simul copulentur ex-
iis, quæ pro diagnosticis signis supra (§. CLXV.)
enumeravimus, quid hydrothoracem adesse dubi-
taveris? Si, exempli causa, empyematis causæ
defuerint, fuerint vero, quæ hydropi inducen-
do aptæ noscuntur; si respiratio difficilis jam sit,
aut quovis corporis motu fiat anhelosa, aut
erecta cervice duci debeat, si ob suffocationis
metum somnos repente interrumpat; si decubi-
tus in alterutrum latus difficilior evadat, si flu-
ctuatio quædam in pectoris cavea, procul ta-
men a cordis regione percipiatur; si artuum in
primis inferiorum, aut scroti (a) œdemata; tus-
sis, præsertim sicca; sitis; urinæ parvitas concu-
rant; si latus affectum œdema exterius ostendat,
quod interdum (b) evenit; aut scapula; & bra-
chium respondens tumeat, & torpeat (c), quod
frequentius est; profecto non erit, cur certiora
de

de *hydrothorace* signa desideres. Multo difficilior vero est *hydropis encystici* (§. CLXIV.) diagnosis, quem sine siti, sine urinarum paritate, sine oedematis pedum, & sine magna spirandi difficultate observavit CAROLUS TONINIUS (d).

Difficilior est diagnosis hydropis encystici; ut ex observatione TONINII patet.

(a) RIVERIUS *De hydrop. pect. cap. I. Histor.* Uratislav. morb. 1699. 1700. HOFFHANN. *De hydrop. observat.* VII.

(b) WILLISIUS *Pharmac. ration. cap. XVII. p. 2.* FONTAN. *obs. anat. med.* 30. 38. BUCHENERUS *act. N. C. t. VI. observ.* 30. MOGAGNIUS *l. c. lib. 2. De morb. thorac.*

(c) MORGAGN. *l. c.* CAROL. PISO *l. c.*

(d) *Atti dell' Accad. de' Fiosiocrit. di Siena T. II. p. 232.* Vide observationem, quam habet cl. MALOETIUS *mem. de l'accad. royal. de Paris T. VII. p. 171. edit. venet.* In milite *hydrope cystico pulmonum* laborante anxietas summa erat spirandi; febris lenta; brachia, manus, crura & pedes tumida; urinæ perturbatae, & flavæ; tussis molestia; nullus decubitus, nam sedere semper cogebatur; nulla fluctuatio. *Ex sch. auct.*

§. CLXXI.

Neque facilius patet *hydrocardia*, sive *pericardii hydrops*. Oritur ut plurimum, quando pericardii liquor, quo alluitur cor, ita increscit; exuberatque, ut cordis motum, actionemque turbare, atque impedire possit. Interdum vero non aqueus humor, sed purulentus in pericardio deprehenditur, qui eundem propemodum parit effectum. Hinc duplex *pericardii hydrops* ab AVENBRUGGERO (a) constituitur, *aquosus*, & *purulentus*. Purulentum ab aquoso differre monet cl. auctor, quod in purulento aqua turbidi feri lactis

Hydrocardia; sive hydrops pericardii.

Vel aqueus, vel purulentus humor.

In quo differat uterque humor.

speciem referat, & cordi id, quod purulentum esse creditur, fimbriarum instar adhæreat. Negant autem alii, purulentam hanc vere esse materiem, cum puris tantum similitudinem habeat. Uterque tamen sive *aquosus*, sive *purulentus* sit hydrops iisdem notis se prodit. BARRERIUS in suis *anatomicis observationibus*, etsi credat & ipse arduum esse, hunc morbum ab hydrope pectoris internoscere, quædam tamen tradit eum comitari signa, quibus significari certo possit. Hujusmodi sunt pressio, & angustię sensus circa anteriorem thoracis partem, qua pericardium locatur; respiratio a tumente pericardio difficilior reddita; tussis plerumque sicca, & molesta; motus cordis perturbatus; palpitatio: syncope, quam præfocatio interdum antecedit; œdemata pedum, pallor faciei, pulsus parvus, & celer, sæpe inæqualis; difficilis in lecto decubitus, & suffocationis metus subinde recurrens. Sed quam parum hisce fidendum sit, ex MORGAGNII observationibus, animadversionibusque mox referendis fiet manifestum.

(2)

§. CLXXII.

Signis vero a BARRERIO (§. CLXXI.) prolatiis adjunctis videtur, ut certior diagnosi evadat, sensus quidam cordis quasi in aqua submersi, & natantis, de quo agrotantes conqueri solitos esse, viri expertissimi testantur (*). Rem confirmat cl. SENACIUS (a), dum scribit, non certius hydrocardiæ signum sibi occurrisse, quam motum quemdam inter tertiam, quartam, quintamque costam

Alia signa ex aliis de prompta addenda præfatis. An unguis sensus in hydrocardia sit

costam undulatorium, atque aquæ quasi fluctuan-
 tis in modum, tunc in primis ægroti sensui, aut
 medici manui sensibilem, cum cor movetur, &
 palpitat. Undulationem vero hanc obscuriorem val-
 de esse, monet SWIETENIUS, ubi plenum omni-
 no fuerit pericardium. At hujusmodi *palpitatio-*
nem cum undulationis, fluctuationisque sensu nec
 DIEMERBOECKIUS (b) in suis, nec BARRERIUS
 in quinque *hydrocardia* implicatis hominibus de-
 prehendit, aut notavit.

(ut SE-
 NACIUS
 tradit)
 signum
 evidens,
 & con-
 stans ?

(*) Id observarunt in veneto homine HENCULE-
 SAXONIA (*Med. pract. l. 2. cap. 8.*) ; & in sexa-
 genaria quodam. RAYM. JO. FORTIS (*Consil. cent.*
2. consil. 46.

(a) *Du coeur lib. IV. cap. V. Tom. II. p. 356.*

(b) *Anatom. lib. II. cap. V.*

§. CLXXIII.

Cordis palpitationem inter *hydrocardia* signa
 ex BARRERII auctoritate supra (§. CLXXI.)
 recensuimus. At negat cl. MORGAGNIUS (a),
 eam esse constans, & perpetuum hujusce hydro-
 pis symptoma, &, aliquando visa sit, tunc fuis-
 se, cum liquor, quo scatet pericardium, acrimo-
 nia peccet, corque irriter & vellicet, aut cum
 hydrope pericardii *polypus cordis* complicetur.
 Cordis ergo palpitatione; cum sæpe ad *hydrocardia*
 absit, ejusdem pathognomicum signum esse ne-
 quit. Præterea quando aqueus humor intra peri-
 cardium non sensim, sed repente, & celeriter ef-
 fundetur, idque immaniter distendit, tum mole
 sua ita urget deorsum diaphragma, ut ejus appen-
 dices protrusæ, & distractæ atrocem in *lumbis*
dolorem excitent. Hic igitur dolor ad *hydrocar-*
diam

An inter
 signa hy-
 drocar-
 dia meri-
 to recen-
 senda
 cordis
 palpita-
 tio?
 MORGA-
 GNII
 animado
 versio.
 An dolor
 lumbo-
 rum itera
 pathogno-
 monicus.

An alia signa constanter in hydrocardia reperiantur. diam spectare videri posset. Sed neque dolor hic perpetuo hydrocardiam comitatur, ut peculiari observatione ostendit idem cl. MORGAGNIUS (b). Demum vir iste doctissimus, collatis plurimum medicorum de *hydrocardia* observationibus, & rite ad trutinam expensis concludit, neque *animi deliquia*, neque *tussim*, neque *spirandi difficultatem* perpetuo, & constanter cum ea reperiri (c). Sæpe enim, dum ægrotantes silent, aut quiescunt, optime & tranquille decumbunt quocumque positu, sed præsertim demisso capite, quæ FRANC. HIPPOLITI ALBERTINII singularis observatio est.

(a) *Epist. anat. med.* XVI. n. 23.

(b) *Ibid.* n. 45. (c) *Ibid.* n. 46.

§. CLXXIV.

Quid sentiendum de sitis? *Sitis* quoque, quæ hydropicos vexare solet, ab *hydrocardia* plerumque. At per eam absentem *pericardii hydropis* ab *hydrothorace* distinguere nequit, quia in hoc interdum sitim defuisse, communissimum est. Neque *pedum œdemata* ita propria sunt *hydrothoracis*, ut hoc signo ab *hydrocardia* discerni certo possit. Nam licet in *hydrocardia* rarissime pedes tuméant, non ita tamen

Quid de œdematis pedum? rarus tumor in ea est, ut rara tussis, aut sitis

De fluctuatione quid? fertur (a) *Fluctuatio* autem si usquam percipitur, ut reapse quandoque percipi potest, non spernendum quidem signum præbet. Sed minus hæc in *hydrocardia*, quam in *hydrothorace* se exferit. Itaque diligentissime cavendum est, ne quid fallax nobis illudat, aut *empyematis signa* communia imponant (b).

(a) MOR-

(a) MORGAGNIUS *l. c. n. 46.*(b) *Idem. l. c. n. 24. & 36.*

§. CLXXV.

Non pauci magni nominis scriptoris sibi suaserunt, hydrocardiam *macie, tristitia, febre lenta, faciei pallore, oculorum languore, refrigeratione extremorum* indicari, hisque notis non parum ipsi tribuunt: sed hæc plerumque utrique hydropi communia observantur. VIEUSSENIUS pro signo maximi momenti in *hydrocardiæ* habet *pallor labiorumque colorem plumbeum*, cum tamen non semper is pericardii hydropem sequatur; nec semper ab aliis pectoris morbis sejungatur (a). Neque itidem MORGAGNIO certa videntur hydropis hujus indica *pondus cor pregravans, & constringens, cordis pondus; & precordiorum anxietas* GRÆTZIO, ALBERTINIO, LANCISIO, HOFFMANNO, FANTONIO parte, SCHREIBERO, & FISCHERO commemorata: primum quod hæc in accuratis VIEUSSENI observationibus non annotantur, immo ad OLAO BORRICHIO palam excluduntur; deinde quod penitus defuerunt; in iis, quos ex VALSALVÆ historiis deprompsit, aut ipse recensuit; & si quando observata fuerunt, uti in GERBEZIO, BONETO, KELLERO, REIMANNO videre est, non solus tunc *pericardii hydrops*, sed alia aderant quoque vitia, a quibus ea symptomata poterant derivari (b).

Quædam alia signa & ipsa rejiciuntur uti aliis vitiis communia vel non semper præsentia.

(a) MORGAGNIUS *l. c. a. 47.*(b) *Idem ibid.*

§. CLXXVI.

Signa hydrocordia cum symptomatibus aliorum morborum confunduntur.

ALBERTINI
de hoc
morbo ob-
servatio-
nes.

Quoniam igitur *hydrocordia* sæpe cum aliis præcordia vitiis conjungitur, necessario consequitur, ut vix ullis ipsa indiciis distingui possit, confusis nimirum utriusque mali, immo quandoque plurium malorum symptomatibus, atque inter se pugnantibus, quemadmodum propriis observationibus edoctus ALBERTINIUS (a) apposite, & candidè fatetur. Ipse nihilominus quasdam animadversiones longo, & multiplici usu comprobatas in hanc rem opportunissime profert, quas utilissimum erit ob oculos ponere. Si pericardii *hydrodrops* inquit, sit solitarius, & purus simplexque, aliqua saltem ex parte indicari potest pulsu comparate molli, potius frequenti, & plerumque parvo (*), qualem edere solet cor, si flaccidum & laxum sit, humorque, qui pericardio continetur, viscidus, iners, aqueus, insipidus. Si vero humor ille acer fuerit, & salinus, parvitati, & frequentia pulsum accedit & vibratio, & tensio quadam. Si vero copia idem excedat, corque quodammodo opprimat, tunc pulsus exilis, celerior, & deficiens evadit plerumque. Intermittens autem, atque inequalis non valde est nisi cum *hydrocordia* alia præcordiorum vitia complicantur. Tussim (addit) vel nullam esse, vel modicum & siccam, vel sputa tantum lymphatica expellentem, quæ a tumente pericardio, pulmonesque comprimente videtur ducenda: difficilem porro decubitus, & crebram residendi necessitatem vix unquam in hujusmodi malo incidere, nisi a cibo, a potu, ab animi, aut corporis motu, quando etiam in lecto æger tantummodo moveatur. Et licet motus cordis

a mediocri quacumque loci mutatione, aut incessu increbescat, & fere ad tremoris quemdam sensum accedat, atque una spirandi difficultas, sive potius apnoea, & sterni oppressio cum doloris specie, & jactatione concurrat; hæc tamen maxima ex parte, si non omnino, conquiescere & cessare agro ad quietem composito, modo humor pericardii non ita acer sit, ut perpetuo cordis irritabilitatem sollicitet, aut ejus superficiem jam arroserit, Demum animadvertit, similia fere symptomata excitari, quando pericardium alicubi crassi, aut quasi membraneo vinculo cordi laxè colligatum sit.

(a) Commentar. acad. scient. bononien. vol. I. p. 389. *Observatio.*

(*) Talem revera pulsus sæpius in hydrocardia mihi contigit observare. *Authoris.*

§. CLXXVII.

Disimulandum vero non est, ab ALBERTINIO non nihil dissidere DAIGNANUM (a), qui hydrocardia laborantes asserit locum, in quo commode, & diu jaceant, invenire non posse, ideoque alium, atque alium, sæpe experiri. Quod quidem credibile est evenire, quando non purus, nec simplex pericardii hydrops infestat. Syncope etiam eos crebrus, aut rarius pro diversa decubitus ratione corripit, idem cl. vir animadvertit, atque in hoc non dissentientem habet ALBERTINUM, qui id ipsum jam antea, ut a se aliquando observatum, indicaverat. Quod si ad hæc accesserit undulatio illa, de qua SENACIUS meminit atque ille ægrotantium sensus, quo sibi cor aqua submergi dicere consueverunt, non dubitat, hydrocardiam ut certam arguere.

Qua in re dissidet ab ALBERTINIO DAIGNANIUS Molestus decubitus quævis sum. Syncope.

Undulatio SENACII, & submerisionis sensus in corde ægrotantium.

(a)

§. CLXXVIII.

§. CLXXVIII.

*Diagnos
probabi-
lior ex
collectio-
ne plu-
rium si-
gnorum.*

At cl. MORGAGNIUS, quem cum summatarum medicarum peritia, tum prudentissima in iis judicandis circumspectio commendat, multo plura consideranda, atque attendenda præcipit. Itque in ab ejus monitis, cautionibusque disceamus, si aliorum pectoris morborum, & speciatim *hydrothoracis* notæ, uti sensus fluctuationis a cordis sede procul diffitæ; spiritus difficultas somnum abrumpeus, decubitus in alterum latus molestus, & fere intolerabilis deficient; neque artuum œdemata, neque tussis, neque sitis adsint, vel levissima hæc fuerint; contra pondus quoddam ad cordis regionem persentiat, corque ipsum ad motum corporis opprimatur, & veluti constringi videatur, spiritu quadantenus interrupto; atque hæc restitutio quieti corpore, mox cessent, vel minuantur, leventurque; & commodius spiritus ducatur decumbentis demisso capite; si, inquam, hæc omnia, aut complura consocientur, probabile re-

*Interdum
ægrī sibi
veluti cor
in aqua
natans
persenti-
re viden-
tur: quod
signum,
si adsit,
certius
diagno-
seos est.*

putatur, *hydropem pericardii* subesse (a). Tantoque probabilius id erit, si præterea ex iis æger sit, qui sibi cor quasi in aqua natare sentiunt aut sensum habent aquæ in pericardio, non alibi, fluctuantis. Neque insuper spernenda erunt alia, quæ supra (§. CLXXI. ad §. CLXXVII.) adducta fuere, quæque si non semper, interdum certe cum hydrocardia conjungi visa sunt.

(a) L. c. n. 48.

§. CLXXIX.

Præter *hydrothoracem*, atque *hydrocardiam*, si ^{OEdema pulmo-} *num.* mili etiam affectui obnoxius est pulmo. Serum enim, aut limpha quando in celluloso textu, quo vasa pulmonum colligantur, congeritur, stagnatque, *hydropem*, sive *œdema pulmonum* (*) constituit. Interdum cellulae quaedam, aut vasa secundum alios quaedam lymphatica aqueo humore ita turgent, atque in molem tantam excrescunt, ut cistides quaedam, sive *hydatides*, quibus pulmo deinde comprimitur, pellucas, aut variegato plenas liquore exhibeant. Utrumque malum respirationis functionem non leviter lædit. ^{Hydatides.}

(*) *OEdema pulmonum* sectione anatomica comprobatum refertur a cl. MALOETIO in *commentar. acad. scientiar. paris. ann. 1732. p. 350.*; item a BARRERIO *observ. anatom. p. 109.*; a TARGIONIO *Tozzettio osservazioni p. 83.*; & LUCA TOZZIO, aliisque. *Ex sch. auct.*

§. CLXXX.

Non aliæ illud inferunt causæ, quam quæ reliqua hydropis genera (§§. CLXI. CLXII. CLXIII.); ^{Causæ œdematis pulmo-} *num.* potissimum vero in pueris, qui magis morbo huic subjiciuntur, errores in victu, suppressa scabies, morbilli, & purpura scarlatina non penitus judicata; & in adultis immoderata, & præpropere equitatio, chlorosis, pedum œdemata retrocedentia &c. *Pulmonum hydropem* suspicaberis, ^{Signa ejus diagnostic.} si statim ac partes exteriores corporis omnes, aut aliquæ œdematoso tumore corripì incipiunt, ac cesserit etiam difficilis respiratio. Nam exigua feri in

ri in pulmonum cellulis collecti quantitas magis respirationi officit, quam major ejus copia in cavum thoracis effusa. Suspicio vertur in solidus judicium, si facies sine signis *hydrothoracis*, & *hydrocardia* tumida fiat; si pedes leviter œdematosi cernantur, si pulsus quodammodo suppressi sint, uti ex ALBERTINII, & SIMSONIS observationibus habemus. Scire etiam licet, tussim, quamdamque loquendi difficultatem interdum ab hujusmodi ægrotatione non abesse (*).

(*) His adjicienda videntur, quæ ex MALOETIO adnotavimus ad calcem §. CLXX. post notam (d), quæque hanc diagnosim illustrare queunt.

§. CLXXXI.

*A causis
cruenda
prognosis.
Quid si
ab organico
vicio sit?* Ex causarum consideratione, si tamen hæ in-
notescant, prognosis eruenda potissimum est. Si
hydropi organicum virium originem dederit, nul-
lo modo, aut certe difficillime discutitur, & si
discussus forte fortuna fuerit, sine dubio reverti
consuevit. Incurabilis quoque est, quia laceratis
vasis lymphaticis, aut a ramo aliquo ductus tho-
racici, aut ab hydatidibus disruptis profiscitur.
*Si a dis-
ruptis
vasis, aut
hydati-
dibus ori-
etur?* Quando a postrema hac causa oritur, solet re-
pente corripere, & sæpe cum aliquo aquæ gut-
tatim stillantis, aut alicujus disruptionis sensu (*).
Quo parcius urinæ fluunt, eo minor salutis spes
affulget. Interdum tamen urinæ copia fallax, &
decipiens signum salutis est, quando nimirum cete-
ra symptomata non dissipantur, aut respiratio bre-
vi interim opprimitur. A febre, aut ab immodi-
cis evacuationibus procedens non æque periculosus
habetur, ac qui nullam evidentem causam agno-
scit.

scit. Item *œdema*, quod quasi per febrilem materiam depositam oritur, non valde timendum, SYDENHAMIO (a) iudice; est. *Ædemate*, atque *anasarca* plerumque a causis non multum; nec ita pervicacibus fiunt. Quandoque verò vitii alicujus, quod interiora altius occupat; quodque tolli, aut vinci nequit, effecta esse possunt. Sanguinis sputa *hydrothoraci* supervenientia exitium fere prænunciant; pulmones enim aut exesos; aut enormiter compressos; aut vasa eorum magna ex parte obstructa subsequuntur. Quod ad *hydrocardiam* attinet; non modo hæc periculi plena est, sed etiam diuturna, curatuque difficilis. Contra *pulmonum œdema*, sic cito cognoscatur, facilius resolvitur alvi fluxu, urinarum copia, atque anacatharsi.

tionibus
nimis,
periculi
impen-
det.

Prognosis
œdema-
tum, &
anasar-
cæ.

Hydro-
thoracis.

Hydro-
cardiæ.

Pulmonis
œdema-
tum.

(*) Similes casus referunt LOWERUS, WILLI-
SIUS, & TARGIONIVS TOZZETTIUS.

(a) *Tract. de hydropæ.*

Curatio.

§. CLXXXII.

Curandi hydropem ratio multiplex est, nec una eademque cuique hydropis speciei opportuna est. Sæpe quæ unam speciem tollit, alteri noceret; & perniciosa foret. Experientia enim comper-
tum est, *hydropes* curatos interdum esse; quod BECHERUS (a) etiam confirmat, aperientibus; diure-
ticis; sudoriferis, tonicis; purgantibus, emeticis;
hydragogis, drasticis; mercurio, & ptialismo;
aëre sicco, & insolationes; balneis siccis, & spirituo-
sis; victu sicco, & abstinentia a potu copio-
so; hypnoticis; incrassantibus; antiscorbuticis, inun-
ctio-

Non una,
eadem-
que me-
dendi ra-
tio; sed
varia pro
varia hy-
dropum
specie.

tionibus; & frictionibus oleosis; balneis; vaporibus; enematis; cataplasmatibus ex emollientibus, sanguinis missionibus; punctione; sive paracentesi; scarificationibus; vesicatoriis, aliisque irritantibus remediis; cauterio actuali; scabiei insitione; & demum solis naturæ viribus. Universim tamen ad

Indica- siones quatuor. *hydropem* curandum aggredienti quator indicationes, quibus faciat satis, se sistunt; serosi, & lymphatici humoris copiam excedentem evacuare; impedimenta, quæ æquabili circuiti opponuntur, remove; crasim debitam sanguini restituere; &

Quando- nam al- vus du- cenda? demum solidas partes firmare. Quare in *leuco-phlegmatia anasarca, œdematibus* alvum primo ducere oportet mitiore aliquo medicamento, rhabbaro videlicet, diluto foliorum sennæ, sale anglico, mutinensi, mirabili *Glauberi*; tartaro solubili; cremore tartari (b); jalappa; scammonæ; syrupo de spinacervina; manna: quibus non modo primarum viarum sordes expurgantur, verum etiam serosa colluvies potenter educitur. Atque hæc subinde iteranda prudenti manu, aptaque dosi sunt, donec partium tumor penitus subsidere videatur.

Hydrago- sa.

(a) *Recherches sur l'hydropisie p. 3.*

(b) MENGHINIUS in *comm. acad. bononien.* plures historias hydropum refert, quos longo usu cremoris tartari plane curavit. *Ex sch. auct.*

§. CLXXXIII.

Incidentia, & aperientia quæ do- veniunt. Sed si cum serosa colluvie lentor etiam, & visciditas humorum conspiret, atque obstructionibus viscera & vasa præpediantur, interponenda alvum ducentibus sunt ea, quæ incidunt, aperiunt; & leniter urinas cient. Hujus sensus præcipue sunt

fales

sales lixiviales absynthii, stipitum fabarum, centaurei minoris, genistæ; item neutri, uti tartarus vitriolatus sal polichrestus, ammoniacus, nitrum, arcanum duplicatum, terra foliata tartari; ac denique gummi ferulacea, ammoniacum quippe, sagapenum, galbanum; & resinosa, in primis terebinthina veneta; quæ posteriora tum maxime excellunt, cum solidarum partium languida vix lenem, & aromaticum stimulum, quo excitetur, requirat. His adjicenda decocta quinque radicum aperientium, rubiæ tinctorum, curcumæ eryngii, ænonidis polygalæ tam virginianæ, quam nostratis, contrayervæ, pareiræ bravæ, ligni sassafras juniperi, lentisci, & similitum, quorum novissima speciatim locum habere possunt ubi morbus a cohibita transpiratione originem duxerit. Quod si scabies retropulsa, aut aliorum morborum, qui cutim obtinent, suppressio antecesserit, remedia ex antimonio, sulphure, & viperis parata appiime conveniunt: item scabiei insitio, aut communicatio; vesicantia; fonticuli; & hujusmodi. Neque antiscorbutica, aut antivenerea omittenda demum sunt, si a scorbutico, aut a venerea labe malum foveatur. Animadvertendum tamen est, diureticorum usui, quo *anasarca* sublata est, non raro paullo post peripneumoniam succedere, quæ hominem cito enecat; quemadmodum sæpius inspectato vidimus.

Sales qui?

Gummi ferulacea, & resinosa.

Decocta aperientia, & diaphoretica.

Antimonii sulphuris, viperæque præparationes.

Revelentia. Antiscorbutica &c.

Diuretica non raro necessaria.

§. CLXXXIV.

In illa vero *cachexia*, aut *hydropis* specie, quæ nimias sanguinis, aut cujusque humoris evacuationes subsequitur, amaris, stomachicis; & roborantibus remediis utendum est. In his præstant

Amara, stomachica, & roborantia quæ, & quando?

Mars. absinthium; marrubium album; chamædrys; eupatorium Mesuæi; abrotanum; cortex mali aurantii, cascarillæ, chinæ chinæ; lignum quassii; e quibus decocta, extracta, vina, tincturæ, pulveres, electuaria; pilulæ parantur. Præ ceteris vero chalybs, sive mars celebratur, cujus tamen usum suspectum habet GEOFFROYUS (a). Hæc quoque opportuna videntur, cum menstrua, aut hæmorrhoidum fluxus subsisterint, morbiq; principium fecerint.

(a)

§. CLXXXV.

Hydragoga & diuretica non tuta remedia. In casu autem (§. CLXI.), ubi serosa pars reliquas superat, aut a reliquarum mixtione secedit, & supereminet, cautissime hydragoga, & diuretica adhibeantur; ne eorum dissolvente facultate quod reliquum est sanguinis rubri magis magisque colliquescat. Laxantia, resolventia, ac stimulantia ut plurimum reprobantur cl. CASIMIRUS MEDICUS (a). Ubi vero pulsus; & sanguis inflammatorius sit, venæ sectionem adhibendam docet, nec antispasmodica spernenda (b). In *anasarca* si ne febre sudorem laconico, & vapore spiritus vini, aut vesicis aromatico decocto plenis corpori utrinque admotis proliciendum præcipit BAGLIVIVS (c). Applicationem vero calidorum cinerum, & fricationes ex oleo, & sale communi, dum interne cremor tarrari exhibetur, commendat laudatus CASIMIRUS MEDICUS. sic enim serum in vasa resorbetur, & ad vias urinæ ducitur (d). Alii vesicantia cruribus imponi (e) jubeant, nec mali quidquam ab iis verentur. Hæc ipsa proponi videntur.

In anasarca sudorifera ex BAGLIVIO.
Applicatio calidorum cinerum & oleose fricationes ex MEDICO.
Vesicantia.

deo in eo *anasarca*, quæ gravidis supervenit(f); *Quid in*
 quod in his diuretica fere iuvantia, si non noxia *gravidarum adeo male?*
 æstimantur; periculosa vero ob abortum; quem
 provocant, cathartica, a tumente enim utero sic
 venæ premuntur, ut per eas sanguinis reditus
 retardetur, aut etiam impediatur, atque hinc aut
 feri effusio in adiposas cellulas contingat, aut
 ab iis debita resorptio (§. CLXII.) non peraga-
 tur (*).

(a) *Comm. Lipsien. suppl. 2. ad decad. 2. p. 221.*

(b) *Ibid.* (c) *Praxis medicæ lib. I. cap. 13.*

(d) *Observation. medic. T. II. p. 696.*

(e) TARGIONI TOZZETI *osservazioni p. 83.*

(f) *Commentar. Lipsien. de reb. in S. N. & gestis vol. V. P. IV. p. 648.*

(*) *Quædam leguntur de anasarca, ascite, & leucophlegmata ab auctore proposita vol. II. §. XCII., & CIL. quæ videbis.*

§. CLXXXVI.

Præter vesicantiâ, ut seroso humori paretur exitus, etiam incisionibus cutis est pertundenda. His aut pars tibiæ inferior duobus supra talum digitis conciditur, ut quidem ad cellulosa usque membranâ penetrent, non verò ultra pertingant. Sed vulnusculæ sæpe inflammatio, dolor & quandoque etiam gangræna consequitur. Ne id mali obveniat, fovenda sunt, ut passim præcipitur, decocto plantarum emollientium; addito spiritu vini, cui aliquid camphoræ admixtum sit vel si gangræna magis timeatur, antiseptici & simul vim vitæ excitantibus ejusmodi metus anteverte-
Incisiones in cute supra talum.
Quomodo inflammatio, & gangræna ab incisionibus timeant anteverteatur?

plane est. Incisionibus utpote tutiorem, & minus huic incommodo obnoxiam FOTHERGILLIUS (a) præ-

fert scarificationem ope illius instrumenti, quo ad cucurbitulas scarificandas utimur. Hanc ipsa multo ante, quam FOTHERGILLIUS eam proposuisset, pluries ego usus sum, sicque graviora symptomata, quæ ab incisionibus fiunt, studui evitare. Quoniam tamen non omnis inflammationis & gangrænæ metus scarificatione avertitur, aliud auxilii genus excogitavit THOMAS LAWRENCEUS, nimirum unicam incisionem prope talum, minutam quidem, sed profundam, quacum præceptis humorum profluvium, tum sphacelus præcaveatur (b). Hæc evacuationo etiam in *ascite* locum habere potest (c). Nam sæpe natura eam per se ipsam miliori visa est (*). Sed, edueta sic serosa colluvie, pendulæ, flaccidæ, & laxæ partes circumductis fasciis firmentur ne iterum novus humor in eas irruat, & confluat, ut apposite monet SWIETENIUS (d).

Unica, & minima prope talum incisio tu-
tior; quæ in ascite etiam prodest.

Crura fasciis firmando.

(a) *Comm. de reb. in S. N. & M. gest. Tom. XVIII. p. 396.* (b) *Dissert. de hydrope p. 49., & 57.* (c) MEAD. *Monit. & præcept. med. cap. 3.* (d) §. 28.

(*) Hic addenda videtur cl. TISSOTII methodus, quam inter auctoris schedas invenimus. Cantharides primum, quæ ab aliis laudantur, applicitas improbat; quoniam acria lædunt. Acris enim humor effluens cutim irritat, inflammat &c. Hinc gangrænæ metus. Tum etiam scarificationes veluti eidem vitio obnoxias, in corpore in primis caco-chymico. Idcirco radicem *brionie* in taleolas sectam, deinde leviter contusam, & calefactam applicat cruribus, quæ serum leniter irritando educere valet. Prima applicatio nihil educit, at post XII. horas renovatur; & denuo nova apponitur, donec fluxus duratio certa videatur. *Epist. var. argum. p. 144. 145.*

Radix brionie secta, contusa, calefacta cruribus applicanda.

§. CLXXXVII.

Interdum cathartica (§. CLXXXII.), vel actio-
 ra vix quidquam alvum movent: Tunc succus iri-
 dis palustris ad guttas lxxx. ex aliquo syrupo al-
 tera quaque hora propinatus magnam serosi hu-
 moris vim eduxisse, & postea minori dosi datus
 ægrum restituisse (a) fertur. Baccarum ebuli suc-
 cus inspissatus sine acritatis, & caloris vitio ex-
 cretiones omnes exsuscitando pluribus item pro-
 fuisse dicitur (b) *Anasarcam* cum difficili respira-
 tione, quæ *pulmonum œdema* (*) simul indicabat,
 conjunctam, victus, aut diætæ erroribus, aut
 scabiei retropulsæ, aut nimio motui, atque equi-
 tationi, aut suppressis menstruis succedentem cu-
 ravit non rara ALBERTINIUS (c) lenibus hydra-
 gogis; diureticis, chalybe, jure viperino, &
 aliquando, quod mirum quibusdam videbitur,
 anguinis detractione. Et quod ad sanguinis mis-
 sionem pertinet, hæc, ubi plethora in suspicio-
 nem venit, & alioquin bonus habitus non desi-
 deratur, initio morbi sæpe necessaria est præ-
 fertim in *pedum œdemate*, aut recenti *anasar-*
ca. Omnium tutissima ea est, quæ e venis ani-
 per hirudines instituitur.

Succus
iridis pa-
lustris.

Succus
baccarum
ebuli.

œdema-
tis pul-
monum
cum ana-
sarca ex
ALBER-
TINIO
curatio.

An san-
guinis
missio
conveni-
re un-
quam
possit?

Quenam
tutissima?

(a) *Essays d'Edimbourg* vol. V. p. 167.

(b) TISSOT. cit. epist. p. 138. *Additio ex sched. auct.*

(c) *Comment. ac. sc. bonon.* vol. I. l. c.

(*) LIBBERKUNIIUS aquam in *cellulari pulmonum*
 congestam ad crura *pediluvii* descendere per cellu-
 losam tellam cogebat, deinde roborantia adhibebat.
 (TISSOTIUS l. c. p. 146.) *Ex sched. auct.*

Pedilu-
via in œ-
demate
pulmon-
um.

§. CLXXXVIII.

Extrin-
secus ad-
hibenda.
Frica-
tione.

Farina
calefa-
cta, alia-
que resol-
ventia,
& robo-
rancia.
Bardana
folia cru-
ribus cir-
cumda-
ta.
Tibialia.

Cautio.

Spiritus
cochlea-
riae intus
datus
quibus
adema-
tum spe-
siebus con-
veniat.
Sal tar-
tari.

Purgantia
interdum
noxia.

Fricatio-
nes, &
viname-

Extrinssecus etiam quædam curationem adjuvant. Fricatio lenis, continuata, & sensim acuta tumen-
tibus partibus sæpe profuit. *Edemati*, quod non
ab interiori vitio pendet, sed potius a vasorum,
& telæ cellularis laxitate fovetur, farinæ resol-
ventes clibanò calæfactæ, arenæ maris, pulveres ex
herbis discutientibus, roborantibus applicentur ca-
lide. Folia etiam bardanæ cruribus circumdata
magnam feri copiam extrorsum alliciunt. Sed id
ipsum fortasse validius præstat radix raphani rusti-
cani contusa, & plantis pedum alligata, Ludwigi
referente. Tibialibus quoque ex tela lineæ
validiori crura firmentur, ut tumori non pateat
aditus. Cavendum tamen ab iis, quæ tumores
pedum valide discutiunt, aut reprimunt; si *æde-
mata hydropis pectoris, abdominis*, vel cujusvis
aliæ internæ affectionis symptomata videantur. Par-
vus enim, aut exuberans humor malo eventu ad
interiora propellitur. Hinc *pedum, & coxarum
œdema*, quod febribus supervenit, spiritu cochlea-
riæ intrinssecus dato oppugnandum rebatur HAMIL-
TONUS (a). Dabat autem xx., aut xxx. guttas
hujusce spiritus vehiculo idoneo exceptas, atque
iis subinde interponebat alvi purgationem. LAN-
GEUS (b) laudat salem tartari ad grana xvi., &
quandoque ad scrupulum unum singulis diebus ma-
ne ad hebdomadam datum, cum desuper hausto
infuso baccarum juniperi contusarum. Salubre mo-
nitionum nobis reliquit cl. SWIETENIUS (c). purgantia
scilicet nocere, quando *œdema* febribus intermit-
tentibus nondum devictis supervenit; prodesse ve-
ro fricationem (*), & vina ex amaris, & aroma-
ticis

ticis medicata. Qua in re ab eo non dissentit *dicata*
LUDWIGIUS (d). *profunt*

(a) De febr. miliar. cap. IX.

(b) Miscell. verit. fascic. I. p. 68.

(c) §. 73. (d) Instit. clin. §. 96.

(*) C. TISSOTIUS laudata epistola p. 139. *asciti-* *Fricatio-*
cos, inquit, *oleo fricare res nova non est. Abdo-* *nes oleo-*
men per horam mane, & vespere fricatur cum *sis facta.*
manu oleo olivarum madida, & post aliquot dies
profuse mingens æger detumescit. Ex sch. auct.

§. CLXXXIX.

Multa ex his, quæ supra (§§. CLXXXII. *Curatio*
CLXXXIII., & seq.) enumeravimus, in *hydro-* *hydrotho-*
thoracæ etiam, atque *hydrocardia* non reprobantur; *racis, &*
In his tamen magis extolluntur diuretica, inter *hydrocar-*
quæ primas tenent pulvis asellorum, aut succus ab *diureti-*
his expressus; terebinthina; balsamum *Copaive*, aut *ca.*
peruvianum; spiritus salis dulcis, nitrive, radix
scillæ; vinum, oxymelque scillicitum; liquor ter-
ræ foliatæ tartari; sal volatile succini; lac gum-
mi ammoniaci, aliaque hujus generis. Scire vero
oportet, radicem scillæ, cum caustico quodam
principio agat, tenellam pulmonum compagem
sæpe nimium irritare, & quasi inflammare. Quam
ob rem WAGNERUS eam quodammodo cicurire
tentat, addito nitro in hunc modum. R. *radic.* *Qua ra-*
scille f. p. gr. jv. ad gr. x., *nitri purissimi* gr. *tione ejus*
viij. ad gr. x. (*). Corrigitur etiam, teste LAN- *vis cau-*
GEO (a), floribus cassiæ cinnamomæ cum nitro *stica cor-*
admixtis. Alii venenatam, acremque ejus indo- *rigatur.*
lem ut temperent, eidem adjiciunt vincetoxici
radicem, ideque præsertim HEISTERUS, RAHNIUS,
& CATTANEUS faciunt (**). Ad quemcunque

Oxymel
cholchi-
cum.

hydropem, & præcipue *hydrothoracem*, aliosque serosos morbos a cl. STORKIO laudatur oxymel cholchicum, & variae eodem præstitæ curationes narrantur. De eo autem intra diem non amplius quam drachma una vel altera, vel ad summum sennuncia; sed partitis dosibus, præberi solet. Oxy-

SCOPULI
observa-
tiones de
eo non
satis pro-
bant.

Vinum
medica-
tum SY-
DENHA-
MII.

melle hoc narrat SCOPULUS (b) curatam vetulam quinque & sexaginta annorum, quæ in hydropem inciderat, frustra vero istud ipsum duobus aliis hydropicis datum fuisse. Inter diuretica non infimum locum meretur vinum medicatum SYDENHAMII, quod sic paratur. R. *Ciner. genist. lib. j. Infund. frigid. in vini rhenan. libr. iv. Add. sol. absynth. vulgaris m. j. Deinde filtrat. liq. unc. iij. dentur bis vel ter in die horis medicis.* Hoc enim complures hydropici sanati dicuntur. Sed asciticis magis convenire videtur.

REGNAUDOTII
form.

(*) WAGNERI formulæ simile proponit REGNAUDOTIUS (*Histoir. de la Société Roy. de medec. T. II. p. 226.*) adversus *anasarcam*, aliasque hydro-
pis species, quæ sic habet: R. *radic. scillæ recent. p. j. v. gr. scrup. jv. Salis de drab. part. iij. v. g. drachm. jv. In mortario mormoreo subigantur rite simul, donec fiat massa æqualis. Ex hac f. pil. gran. xij., & siccari sinantur. Dosis n. jv. bis in die. Superbibenda infusio plantar. aperient. cum vin. alb. q. s. Serum lactis cum antiscorbuticis interdum detur. Ex sch. auct.*

Cassia
tinnamo-
mea.

(a) LANGEUS *miscell. verit. fascic. I. p. 66.* Fru-
ctus exsiccati lauri zeylanicæ baccis calyculatis novissime ad nos adventi, flores cassiæ cinamomæ dicuntur. Ex sc. auct.

Animad-
versiones
cl. TIS-
SOTII de
viribus
scillæ in
hydropem.

(**) Cl. TISSOTIUS citata epistola ait, *scillam in hydropem esse magnum remedium datum dosi, quæ per renes agat (p. 114.). Ceterum nocet, & enervat ventriculū, cui medetur postea cortex. Secundo: acre est remedium, & dolores ubique excitat,*

citat, immo nervos convellit, cui malo avertendo addita camphora valet. Tertio: sanguinem dissolvit, & ejicit: igitur ubi humores soluti caute adhibenda. Hinc sæpe subjungendus illico cortex. Nocet, ubi est vetus scirrhus cum febricula; facilis enim exulceratio (p. 135. 136.). Scilla pura sive cruda anteponenda. Duo vel tria scille grana cum saccharo tritæ summopere prosunt in hydrope pectoris. Torrefacta perdit multum virium. Igitur majori dosi tunc danda.... Aromatis additis ventriculi noxæ avertuntur. Acetum scilliticum intolerabile. Vinum potentius remedium, sed non omnes ferunt. Oxymel opta dosi nulli præparationi secundum, in primis nitro, aut sali medio nuptum. p. 137. 138. EX sch. auct.

(b) *Flora Carniol.* T. I. p. 266.

§. CXC.

De hydropulmonis, & hydrothorace luculenter loquitur PETRUS SALIUS DIVERSUS (a); & quanquam cathartica vehementiora in iis passim reprobari soleant, ipse tamen ad evacuandos ferrosos humores felicissime se adhibuisse testatur elaterium, & succum radicum sambuci, fortasse ebulli. Illud dabat ad quatuor grana; quæ maxima dosis ei erat, hunc ad sesquiunciam. Repetenda autem hæc remedia esse, auctor est, quia *uncia evacuatione universam materiam* educere non possunt. Educta porro materia, monet, causam generationis materiæ inquirendam esse, ut si fieri potest, tollatur. Generatim cauteria brachiis, & femoribus inurenda proponit, quibus relapsus præcaveatur (b).

A P. SALIUS
LIO lantantur elaterium, & succus radicis sambuci ebulli.

Cauteria in brachiis, & femoribus.

(a) *De affect. partic. cap. V.*

(b) *Ibid. p. 223.*

§. CXCI.

Paracentesis in hydrothorace.

Sed præstat aquas statim, præsertim si recens, aut post hydatidum ruptionem confluerint, paracentesi educere (*). In hydrothorace punctio intra *nonam* & *decimam* costam quinque, aut sex digitis a spina communiter instituitur. HYPPOCRATES diaphysim, ut superiori *capite* innuimus, idest corpus ipsum alicujus costæ perforabat modiolò. At cl. SHARPIUS strenuus chirurgus anglus eam rectius institui putat intra *sextam*, & *septimam* costam, quod olim fieri solebat; suppuratione ab infima facta, distantia a sternio & vertebriis æquali; quem locum video etiam præferri ab OLAO ACRELIO (a). Sed his parum confidit huic auxilio, nisi exundantis feri fons obturari possit. Ubi vero boni exitus spes affulget, mature ad paracentesim properandum esse docet. Fœmina gravida rem narrat WILLIAMUS MORELANDIUS) hydrope laborabat. Huic intra *sextam*, & *septimam* costam incisione facta extractæ sunt libræ septem aquæ limpidæ. Animi deliquium hinc passa est; sed postea bene habuit, vulnusque intra mensem clausum est. Peperit justo tempore feliciter (b).

Observatio MORELANDII.

Observationes de bono paracentesis eventu ex LOURDIO.

(*) CL. LOURDIUS (*Journ. de medecine mens- Maii anni 1782. p. 408.*) paracentesim in hydrothorace, utpote utilem, & nulli obnoxiam periculo proponit; modo propere, & ante quam læsio in pulmone fiat, instituatur. Instituendam autem putat potius acu triquetra (*troiquart*), quam cultro illo; quem *bistouri* gallice appellant; si tamen ea circumspeditione introducta sit, ut, statim ac vacuum ingreditur, nullaque amplius percipitur resistentia, inde rethatur. Fatetur quidem inutilem evadere, si pulmoni pleura adhærescat; ast non idcirco utilius inci-

incisionem fieri, quoniam non tam facile est, ut fortasse contendunt, pulmone eandem pleuram disjungere. Bono, & felici omine sic pluries in utroque pectoris latere institutam fuisse narrat. Ratione vero sequenti peragitur. Punctio fit *quatuor digitis trans-* *Methodus*
versis sub angulo inferiore omoplateæ, & quinque *Leuridia-*
digitis pariter transversis majoribus procul a spina *n^a.*
dorsi, qui locus respondet intervallo, quod est inter
tertiam, & quartam costam spuriam, enumerando
ab infernis ad superiora. Ibi fit etiam empyematis
operatio. Neque syncope, quæ post punctiorem in-
terdum supervenit, ab eadem absterreat, nam levio-
ribus adjumentis paullo post omnino cessat. Ibid. T.
LVII. p. 303. Ezsched. auct. Paracensim feliciter
adhibuerunt HIPPOCRATES, WILLIUS, LOWERUS,
BOURDELINUS, BARGERONUS, MORANDIUS, DU-
VERNEYUS, SENACIUS, aliique. Ex sch. auct.
 (a) *Comment. de reb. in Sc. n. & M. gest. vol.*
XV. p. 425.

(b) *Transactio. philosoph. vol. LVI. p. 302. Pa-*
racetesi lanceola potius, quam acu triquetra insti-
tuendam vult MARTINIUS. Vid. Comment. Lipsien.
vol. XV. p. 31.

§. CXCII.

Utinam id genus chirurgiæ ut in hydrothorace, *Paracens-*
 sic in hydrocardia locum haberet. Sæpe inquit *tes in*
 RIOLANUS (a), in eo (pericardio) copiosus hu- *hydrocar-*
 mor colligitur, qui suffocationem adfert, & cor *dia.*
 obruit. Si non possis exhaurire istud serum per *RIOLA-*
 hydragoga, licet ne terebra sternum aperire, in- *NI me-*
 tervallo pollicis a cartilagine xyphoide? quia peri- *thorac.*
 cardium ibi adnexum ad suspensionem cordis. Du-
 bia salus certa desperatione potior &c. Post RIO-
 LANUM eadem propemodum aquam e pericardio
 educendi ratio suadetur a cl. SENACIO (b), sed *Alia SE-*
 hic neque terebram, neque locum indicatum ad- *NACII.*

Cur tu-
tior hæc
methodus
SENA-
CII?

Quid
præstan-
dum ve-
lit au-
ctor.

probat; Ipse enim acum *triquetram* inter *tertiam* & *quartam* costam prope sternum sic adigendam jubet, ut oblique versus mucronatam cartilaginem feratur. Hac ratione evitantur vasa sanguinea majora, aliæque partes, quas sauciare periculosum esset. An vero unquam hæc punctio tentata sit & quem habuerit exitum, non mihi profecto perfectum est. Optandum tamen esset, ut primum in cadaveribus, deinde in vivis a docto, & exercitato chirurgo ejus periculum fieret. Nec aliter curanda esset *hydrocardia purulenta*, quæ pericardii, aut cordis suppuratione (§. CLXXI.) subsequitur.

(a) *Encheirid. anatom. lib. III. cap. IV. p. 206.*

(b) *Du coeur l. c.*

§. CXCIH.

Curationis ratio post educationem aquæ in hydrope. Quies.

Quacunque demum via punctiois ope extrahatur aqua (§§. CVCI. CXCH.), summa quies, & tenuissimus victus per aliquot dies imperetur, ut, humorum motu placidissimo reddito, oscula vasorum facilius se contrahere possint. Deinde ad roborantia transitus fiat, quorum usus etiam necessarius est, ubi hydrops aliter fuerit discussus.

Tonica ad crasim sanguini reddendam, & solidis partibus robur. Auxilia quedam externa.

Tum crasis debita sanguini restituenda est, & solidis partibus debitum robur (§. CLXXXII.). Quo spectant cortex peruvianus, & aurantium; cascarilla; blanda aromatica; vinum absynthites, rhenanum, burgundicum, rubrum de monte politiano; & præ ceteris præparata martialia. Quorum actio vectione, equitatione, frictione, aeris mutatione, perigrinatione, rusticatione, animi hilaritate, aliisque hujusmodi præsidiis adjuvanda est.

§. CXCIV.

§. CXCV.

Victus rario generatim ad exsiccantem vergat : *Diata*,
 hinc carnes assæ potius, quam elixæ concedantur.
 Panis sit biscoctus. Olera, quæ diuresim movent,
 non debent excludi, uti asparagi, lupuli, fœniculum,
 adium, pastinaca, tragopogon, cinaræ, rapæ, cœpæ,
 porra. Abstinendum quantum fieri potest a largiori *Absti-*
 potu est; sola enim a potu abstinencia hydropes *mentia a*
 contumacissimos curatus novimus. Interdum tamen *potu.*
 negari haud potest, potum etsi largiorem mirifi- *Quando*
 ce profuisse; cum feliciet humores nimia desita- *largior*
 te, nimioque lentore cohæserint. BARCKERUS lau- *potus*
 dat copiosam potum (*), & suas pillulas tonicas.
 Vinum, si ejus aliquid dandum est, absynthio pon- *conve-*
 tico, aut baccis juniperi, aut millepedibus infusis *niat?*
 alteretur. Ad fallendam sitim, quando urentis- *Quid si-*
 sima urget, os, & fauces aqua cum aceto remix- *tim sal-*
 ta colluantur. Cerasa acida, pruna acido dulcia, *labat*
 limonii; aut citrei mali frustula saccharo consper-
 sa ore detineantur. Aer sit purus, siccus, elasti- *Acris*
 cus. Motus corporis in simplici *anasarca*, atque *qualita-*
œdemate, in primis quando vita deses, & nimia *tes.*
 quies in causa fuit, non erit reprobandus. Noxi- *Quando*
 us vero est in *pectoris*, aut *pericardii hydropes*. *motus*
 Navigatio tamen nemini officit, & bene fertur. *confer?*

(*) FRANCUS MILMANNUS (*Animadversion. Nota.*
de nat. hydrop., ejusq. curatione, Lond. & Vienn. opinio de
ann. 1779.) BACKERI sententiam de largioris potus *caussis*
 usu in hydropes tuetur, quam sane HIPPOCRATIS do- *hydropis,*
 ctrinæ conformem esse nititur demonstrare. Excludit *curanda*
 omnem subtilitatem aqueam ab hydropis caussis, & *que me-*
 semper atoniam, & obstructionem in causa esse con- *thodus.*
 tendit. Dubitat, an impediendo fluxus humorum in
 abdo-

abdomen post paracentesim externe sufficiant arctate compressiones, sibi que suadet, earum opem utiliorem evadere, si qua pars aquæ prementis, paullatim postea educendæ, in cavo relinquatur. Hinc methodum partire aquas extrahendi approbat, commendatque, & nonnullas objectiones resolvit. Ejus curandi ratio est hæc. Si æger non sit debilis admodum, aquas purgantibus, alternis diebus, vel bis in hebdomada dari, dispellere nititur. Dat pulverem ex radice jalappæ drachmā semis, & calomelani granis septem compositum (p. 99.); diebus intermediis haustum salinum, qui sic habet: *Aq. menth. simplic. unc. j., aquæ puræ unc. ss., sal. tartar. gr. xv., acet. distillat. drachmas vj., vel quant. satis ad salis saturationem: aq. piperis jamaicens. drachm. j., syrup. simpl. unc. j., m. f. h.* Huic haustui adjiciebat acet. scillit. gutt. XL., vel drachm. j., & repetebatur sexta quaque hora. Cum purgantibus dabat decoctum avenæ, & juscula humectantia (p. 100.). Sed purgantia non respondent semper, vires nimis deiciendo. Tunc ad diuretica confugit. Omissis purgantibus, dat salinum haustum cum aceto scillitico, & magnam aquæ copiam cum pauxillo salis diuretici, & sæpe intra spatium quadraginta horarum urinæ copiosæ profluunt (p. 116.). Potum etiam laudat ex cremor. tartar. unc. ss. in aq. hord. lib. ij. soluta, cui syrup. ad grat. dulced., & spirit. vini gallici unc. j., vel ij. adjectæ sint. Hoc modo datum, & simul haustum salinum, brevi urinas ciere, quod alias non facit, nisi post longum tempus (p. 103.). Decoctum senecke sedes, & urinas movet satis bene. *R. red. seneckæ unc. ss. aq. sesquilib. Decoq. ad lib. j. Cola. Dentur unc. iij. bis, vel ter in die.* Purgantia initio, progressu diuretica laudat (p. 103.). Ex ital. sched. auctoris hæc omnia adjicienda hujus morbi curationi non dubitavimus, quæ, etsi fortasse non necessaria, inutilia tamen omnino legenti non erunt.

CAPUT VI.

DE DIFFICILI RESPIRATIONE,

ET SPECIATIM

DE ASTHMA TE.

§. CXCV.

Naturalis respiratio ea profecto est, quæ solo *Respiratio naturalis.*
 pene diaphragmate, & thoracis motu vis adispe-
 ctabili facile, & commode perficitur: contra læsa,
 aut difficilis, quæ ab ea modo aliquo deflectit.
 Deflectit vero aut raritate, aut frequentia, aut *læsa, & difficilis.*
 magnitudine, aut parvitate, aut vi, aut inæquali
 cum inspirationis, tum expirationis ordine; nu-
 mero, velocitate, duratione. Hinc vitium in ea
 esse dicitur, quando major, aut minor est; lon- *Vitiosa quomodo?*
 gior, aut brevior; tardior, aut velociter; fre-
 quentior, aut rarior; vehementior, aut languidior;
 itemque, quando inæqualis, inordinata, interrupta,
 & sic porro.

§. CXGVI.

Verum hisce (§. CXCV.) differentiis, quæ ple- *Quatuor gradus difficilis respirationis.*
 rumque aut morbi non sunt, aut morborum tan-
 tum symptomata, prætermittis, de illis spirandi
 læsionibus agemus, quæ difficilem respirationem
 reddunt, quæque per se gravis morbi speciem
 referunt. Hæc in quatuor veluti gradus distingui-
 tur, quorum singulis peculiare quoddam nomen
 a medicis inditum est. Sunt autem * *dyspnæa,*
asthma,

* *ἄσθμα* *asthma*, *orthopnœa*, *apnœa*, *Dyspnœam* dicunt;
πνoία quando respiratio leviter tantum læditur, aut de-
ἄσθμα pravatur. Quando vero spiritus difficilius adducitur,
ὀρθoπ- educiturque, pro vario difficultatis modo, & varia
πνoία gravitate id vitii vel *asthma* est, vel *orthopnœa*.
Ἀπνoία In illo scilicet respiratio frequens cum anhelitu,
Quid dif- sibilo, & quadam pectoris oppressione, aut mō-
pnœa? lestia conjungitur; sed plerumque *asthma* debet
Quid a- esse recurrens, & chronicum. In hac respiratio
sthma? ita difficilis est, ut æger non modo residere, &
Quid or- magno conatu, erectaque cervice inspirare debeat,
thopnœa? sed etiam rhoncos ducere, & stertere. Si de-
 mum spiritus prope videatur compressus, aut abla-
 tus cum vocis sono ferme amputato, pulsu par-
 vo, inæquali, tardo, anxietate, pectoris ponde-
 re, atque interdum dolore, tunc *apnœa*, & *ca-*
Quid a- *tarribus suffocativus* nominatur.
pnœa?

§. CXC VII.

An in- In hisce affectionibus (§. CXCVI.) quidam
spiratio volunt *inspirationem* tantum laborare, non *exspi-*
sola læ- *rationem*; Ideoque perperam ad *respirationem*,
datur? quæ ex utraque earum coalescit, eosdem transfer-
 ri. At, si quod ego judicem, profecto hi videntur
 a vero non parum aberrare. Nam frequen-
 tius quidem *inspiratio* læditur, quia plures sane
 causæ incidunt, ut mox patebat, quæ inspiratio-
 ni officiunt, quam quæ expirationi. Sed negari
 haud poterit, hanc quoque interdum, etsi multo
 rarius, vitari, aut inhiberi, quemadmodum in-
 fra significabo. Itaque cum innumera ferme sint,
 quæ respirationi rite obeundæ requiruntur, ut ex
 physiologicis constat, cumque alia inspirationi,
 alia expirationi inserviant, quotiescumque eorum
 ali-

aliqua defecerint, respiratio etiam lædatur, necesse est. Causæ igitur læsæ *respirationis* erunt bene *Læsa respirationis multiplex causa.* multæ; sed ut ordine procedam, ab iis primum ordiar, quæ *inspirationi* impedimento sunt; deinde ad eas veniam, quæ *expirationem* intercipiunt.

§. CXC VIII.

Inspirationi officiunt aer vel copia, vel qualitate deficiens, vel alienis, noxiisque halitibus (*) *Quæ lædunt inspirationem.* infectus; larynx, trachea (**), bronchia indurata, rigentia, vel spasmo contracta, vel muco, lymphæ, pure, tumore, abscessu, polypo (a), calculis, lumbricis (b), aliisque alienis corporibus illapsis obstructa, vel arctata, vel compressa, vesiculæ pulmonares pulvere, pilis, floccis, pituita, sanguine, aliove humore oppletæ, aut lapideis concretionibus, scirrhis, tuberculis, vomicis, abscessibus, œdemate, vel quavis alia congestione etiam sanguinea impeditæ; hydrothorace, hydrocardia, empyemate, emphysemate (c), hydatidibus, mediastini, pleuræque tumoribus, cordis, aricularum, aortæve dilatationibus extrinsecus oppressæ, & gravatæ, vasa pulmonica glutinoso humore, concreto sanguine, vel viscidiorē infarctæ, & præmutidæ; muscoli intercostales, alique; qui thoracem elevant, & dilatant, paralyti tacti aut alio modo male affecti, inflammati, immobilesque redditi; nevi ad eos tendentes simili vitio laborantes; diaphragma pariter resolutum; viscera abdominalia sursum contra septum transversum, immo in cavum thoracis adacta; ventriculus flatibus turgens, aut abdomen aqua intumescens, diaphragmatis descensum impediens; & demum aer in cavum

thoraci; ingressus, atque expansus, aut prægrandis aliquis tumor pulmonum dilatationem (d) impediens.

(*) *Aer*, si debita copia deficiat, aut immodice rarefcat, inflandis pulmõnibus, dilatandoque thoraci impar est. Potest etiam noxiis mephitibus ita scaterere, ut nervos repente resolvat, sicque paralyfim musculõrum thoracem elevantium inducere.

(**) Vid. *vol. III. cap. XVII. de angina* §§. CCCLXXV. CCCLXXVI. CCCGXXIII., & seqq.

(a) *Polypi*, quales naribus innascuntur, sæpe asperam arteriam, & brõchia obsident; immo interdum tussi vehementi evulsi expelluntur. Vide WARENIJ observationes in *Medic. transact. by the colleg. phys. Lond. vol. I. p. 407.*

HALLE- (b) HALLERUS (*opusc. patholog. observat. ix.*),
RI obser- & alii passim observarunt; lumbricos e faucibus si-
vatio. bi viam in laryngem; & asperam arteriam parasse. Vide HERBINIUM, *Journal de medec. novemb. 1778. p. 432.*

(c) Vid. BURSERIUM in *additionibus ad DAL- LARMIIUM, Saggi di medic. prat.*

Alia
MECKE- (d) *Difficilem respirationem*, & demum mortem
LII. ipsam ab aere intra dextrum thoracis cavum collecto natam vidit præ ceteris MECKELIUS (*Memoir. de l'acad. des scien. de Berlin. 1759. p. 42.*). Tanta erat aeris moles, atque expansio, ut diaphragma ex latere dextro deprimeretur deorsum, & jecur ad intestinum cœcum usque protruderet. Aer autem iste e pulmõnibus in cavum thoracis erupisse videtur cl. viro. Idem cl. auctor invenit (*ibid. p. 44.*) steatoma quatuor libras, & uncias tres pendens, quod superius diaphragmati inhærebát; & pleuram, & lobos pulmonis sinistri, corque ipsum e sua sede dextrorsum propulerat, ventriculum vero, & lienem ad umbilicum, & ilium versus. *Ex sch. auct.*

§. C I C.

Espiratio (*) vero imminuitur, aut tollitur *Quæ ex-
spiratio-
nem la-
dunt?*
ab aere in pulmones ingresso nimium elastico; & vin contractilem eorum superante; a nimia pulmonum laxitate; inertia; debilitate; ab ossea bronchiorum rigiditate, propter quam nequeunt, non modo dilatari, sed ne concidere quidem; nec se restituere; a spasmodica, & involuntaria musculorum intercostalium, aliorumque thoracem elevantium contractione diutius, quam par est, protracta; a spasmo pariter diaphragmatis perdurante; a paralyfi; aut destructione sterno-costalium, & aliorum depressorum; a laxitate, resolutione, sectione musculorum abdominis, aliisque similibus causis. Item impeditur expiration a diaphragmate deorsum tracto per auctam molem hepatis, aut lienis, quæ interdum tanta est, ut hypochondria non modo, sed etiam hypogastrium occupet.

(*) Musculi intercostales interni, & externi qui *Quomodo
fit inspi-
ratio?*
duo, & viginti numeratur, costas elevat: diaphragma vero, dum se contrahit, deprimitur. Sit thoracis cavum in latum, & longum dilatatur. In majoribus vero inspirationibus, aut inspirandi conatibus ad dilatandum thoracem concurrunt musculi scaleni, sterno mastoidei, serrati posteriores, superiores, anteriores utrique, pectorales; item cervicales descendentes, alique fortasse thoraci, claviculis, scapulisque inserti. His inspiratio perficitur. Expirationem vero elastice, & pondus costarum, vis retinens bronchiorum, & vesicularum pulmonarum, fibræ musculares, quæ in bronchiis, atque in aspera arteria existunt, musculi sterno-costales LIEUTAUDII, sive triangulares aliorum, musculi abdominales, & demum in vehe-

*Quomodo
expira-
tio per-
ficitur?*

mentiori conatu longissimus dorsi, sacro-lumbalis, lumborum quadratus adjuvant, absolvuntque. Vid. HALLER. *Elem. physiolog. T. III. lib. VIII. sect. IV. §. VI. ad XI. Item §. XX. ad XXIV.*

§. CC.

Respiratio difficilis aliorum effectus morborum. Hinc cuique exploratissimum est, difficilem respirationem sæpe aliorum morborum esse filiam; neque *asthma* a sola, lenta, & viscida materia pulmones replente, uti olim a quibusdam putatum est, proficisci, sed ab aliis atque aliis fere innumeris causis (§. CXCVIII.); ad quas præterea referendus est sane impeditior sanguinis e corde in arterias trajectus; quo spectant cordis

Alia vitia, a quibus asthma oriri possent.

cavearum laxata compages; valvularum aortæ ostio præfixarum rigiditas aut ossea durities; aorta ipsa angustior, aut polypo; aut tumore (*), aut aliis ejusmodi impedimentis tam interioribus; quam exterioribus obæcata. Resistans enim sanguis in vasis pulmonaribus pulmonum vesiculas pragra-
vat, obruitque.

(*) Ex hac causa intra paucos dies magna difficultate spirandi, & pulsu intermittenti affectus obiit D. TROMBELLUS medicus chirurgus bononiensis in oppido Lugo ferrariensis ditionis. Jamdiu orthopnœa, atque animi deliquiis levioribus, pulsuumque irregularitate laborabat. Ejus cadaver dissectum ab excellenti medico BRUNORIO, qui in *aortæ ostio* invenit tumorem arteriæ membranas ad ovi columbini magnitudinem, omnemque cavitatem occupantem. Ex hoc cochlearia aliquot puris effluxere. Ceterum pulmo sanguine turgebat, & sanguinis aliqua effusio aderat in thorace; causa forte atrocissimi doloris, quo miser in pectore ante mortem cruciabatur. *Historia hæc deprompta est ex epistola BRUNORII ad MINAR-*

Tumori aorsa exemplum.

NARDIUM medicum faventinum missa; quam inter auctoris adversaria repertam haud inutile duximus hic memoriæ mandare.

CCI.

Itaque difficilis respiratio; prout a vitiis pulmonibus, aut thoraci inhærentibus, vel aliarum partium dissitarum culpa oritur, modo est *idiopathica*, modo *symphatica*; & pro originis diversitate modo *primaria*; modo *secundaria*, modo *symptomatica*. Speciatim vero *asthma* ratione causæ distinguitur in *humidum*, sive *humorale*, & *siccum*; sive *convulsivum*, *spasticum*, & *flatulentum*. Nec desunt qui in *sanguinem*, *pituitosum*, *purulentum*, *scirrhosum* illud etiam dividant; immo durationis modo in *continuum*, *fixum*, *periodicum*, *vagum*. Passim *siccum*, & *convulsivum* unum idemque reputatur, sed perperam. Nam omne *convulsivum* esse potest quidem *siccum*, non vero omne *siccum* a convulsione, aut spasmo pendere perspicuum est, si ad causas, quas (§§. CXCVIII. CIC.) indicavimus, animus advertatur.

Differentia difficilis respirationis.

Asthma humidum & siccum

Ab alia causâ, & a durationis rationalis differentie.

Siccum a convulsiva differt.

§. CCII.

Veluti remotiores causæ *asthma* sive *humidum*, sive *siccum* antecedunt plethora in ætate media; serosa; sive pituitosa colluvies, mucii copia, & fibrarum rigiditas in senibus; aer humidus & frigidus; vapores metallici, sulphurei, arsenicales (*); humor arthriticus; podagricus, scabiosus; materia variolosa, herpetica, ulcerosa ad pectus translata; hæmorrhoides, & catamenia

Causæ remotæ asthmatis tam humidi, quam siccii.

suppressa; cruditas acida primarum viarum, præsertim in hypochondriacis, & in pueris; cacochylia quæcumque (*); ingesta acria, uti fungi, cicuta, aliæque plantæ venenatæ; remedia ex plumbo parata; affectio hysterica, aut hypochondriaca (**). Denique viam malo quasi certo sternunt artes quædam, uti molitorum, lapidicorum, tabacopœorum, cribratorum, frugum menforum, carminatorum lanæ, lini, cannabis, & si quæ sunt aliæ similes.

(*) Interior bronchiorum membrana adeo sensibilis est, ut ab acrioribus halitibus una cum aere haustis illico spiritus iter præcludatur, constrictis spasmò fibris muscularibus, bronchiorum segmenta cartilaginea necitentibus. Hinc aut lethalis peripneumonia subito oritur, vel si evaserint, *asthma* fere incurabile, & tota vita perseverans. VAN-SWIETEN §. 824. *Aer humiditate &c.*

(**) Magnam *asthmatum* partem a stomacho pendere notavit BAGLIVIVS. *Append. de asthmat.*

(***) In his vel a stomacho flatibus distento, vel a spasmò diaphragmatis *asthma* potest induci, nimirum vel quia sic sursum propellitur, urgeturque diaphragma, ut descendere nequeat; vel quia deorsum spastice trahitur, ut laxari, & elevari, quemadmodum ad expirationem opus est, nequaquam possit. FELIGIVS *Del presagio medic.* p. 166.

Diagnos.

§. CCIII.

Quædam et diagnosi recte statuendam necessario Difficilis, respiratio (§. CXCV.) per se patet, atque ex iis etiam, quæ dicta sunt, varii ejusdem gradus (§. CXCVI.) erui possunt. Causæ vero plerumque latent, aut obscuræ admodum

modum sunt. Quare, ubi ad ejusmodi ægros accedimus, sedulo indagari oportet, assidue ne malum teneat, an per intervalla recurrat; num *primarium*, aut alterius morbi *symptoma* sit? Utrum nervi laborent, ut vel de paralyti, vel de convulsione, & spasmo suspicari liceat? An sanguis aut copia, aut qualitate peccet? An signa adsint hydrothoracis, aut hydrocardiæ, empyematis, aut vitiis alicujus organici laryngem, asperam arteriam, pulmones; cor, aut vasa majora in præcordiis occupantis? An demum musculi respirationi dicati afficiantur, aut thorax consensu aliarum partium, atque in primis abdominis laboret?

§. CCIV.

Deinde disquirendum est, an *asthma humidum*, aut *siccum*, aut *convulsivum* vexet: *Humidum* cognoscitur tussi humida, sibilo, stertore, levamine humoris alicujus excretionem subsequente. Solet etiam nunc augeri, nunc mitescere, prout humoris congestio increscit, aut imminuitur: at nunquam intermittit; nisi morbo penitus soluto. In *siccis* tussis vel nulla est, vel inanis, & sputi expers. In *convulsivo*, & *spasmodico* signa non deerunt convulsivæ affectionis, nervorumque aut in ipsomet eorum exortu, aut in eorum progressu, & distributione, puta abdomine, laborantium; nullus stertur, aut nullius saltem materiæ sibilus persentitur, nulla ejusdem excretio, aut si ulla, uti urinx tenuis, & crebræ, atque aqueæ, sine levamine est: malum a subita plerumque aliqua causa, & præsertim animi, & nervos afficiente oritur, subitoque etiam cessat, aut saltem, quando minus opinamur,

*Asthma-
tis humi-
di dia-
gnosis.*

*Signa sic-
ci, &
convulsi-
vi.*

inur, sese remittit: circa diaphragmatis porro regionem constrictio quædam percipitur, quasi zona arcte circumdaretur; somnusque si superveniat, plerumque remedio est; dum contra somno aliæ asthmatis species non sublevantur. Præcipuum vero, & non infrequens *asthmatis convulsivi* symptoma sæpe deprehendi summam pulsum raritatem; ex qua sola non raro morbi natura mihi innotuit.

§. CCV.

Signa communia omnibus speciebus asthmatis. Communia esse possunt cuique asthmati præcordiorum anxietas, pulsus parvi, inæquales, intermittentes, rari, cordis palpitatio, faciei rubor, livor, aut pallor, vespertina, aut nocturna exacerbatio, aut ad quemcunque corporis motum mali incrementum, vocis impedimenta, extremorum frigus, e lecto resiliendi necessitas, fenestras aperiendi, vehemens scapularum, humerorum, clavicularum, abdominisque agitatio (*); pinnarum nasi diductio, tremor, suffocationis metus, & similia.

(*) Ab hujusmodi muscutorum abdominalium agitatione probabile est oriri dolorem, quem in abdominali, & epigastrica regione sæpe queruntur asthmate graviore laborantes.

Prognosis.

§. CCVI.

Signa præva, & fausta cujusque speciei. Quæcumque *respirandi difficultas* non vocatur periculo; periculum vero pro vario ejusdem gradus, & pro varia etiam, quæ eam intutit, causa modo

modo minus, modo gravius est. In *orthopnea* ut plurimum majus. *Asthma* contumax esse consuevit, & sæpe revertitur, & licet leve ab initio interdum videatur, plurimumque tamen *hydrothoracis*, aut alterius chronici morbi triste augurium est. In senibus vix unquam curatur; in primis si inveteraverit; immo in *catarrhum suffocativum*, & *apneam* facile transit. *Siccum* in *humidum* veteri cum facili, & levante pituite excreatione bene ominatur: contra, si cum visum dejectione mutatio hæc obvenit, nam indicium tum esset, instare *catarrhum suffocativum*, sive sanguinis per pulmones trajectionem prorsus interceptum iri. *Asthma convulsivum*, sive *spasticum* acutus vere morbus est, & sæpe vel optimis remediis reluctatur. Raro tamen occidit, nisi cerebrum, aut cor graviter una ledatur. Qui gibbi in *asthmate*, aut tussi fiunt, ante *pubertatem* moriuntur (a). *Spina perversio* nem, & spirandi difficultatem sanguinis fluxus liberat (b). *Spirationes*, quæ non nisi erecta cervice ducuntur, *hydropem siccum* faciunt (c).

Orthopnea.

Asthma.

Siccum in humidum verti, bonum interdum, quandoque etiam malum.

Convulsivi, vel spastici.

HIPPOCR. Aphor. aphorismi.

(a) HIPPOCR. Aphor. 46. Sect. VI.

(b) Coac. prænot. 341. (c) Coac. 424.

§. CCVII.

Huc transferendum quodammodo est illud HIPPOCRATIS oraculum: Ex iis, qui strangulantur, & resolvuntur, nondum autem sunt mortui, non se recolligunt, quibus spuma circa os fuerit (p). Tanta enim videtur fuisse suffocationis vis, ut non omnis faucium, & tracheæ mucus inter respirandi conatus expressus, & cum aere intine per-

Signum vere mortuorum, cur spuma circa os?

permixtus in spumam abiverit, & simul vasa cerebri aut rupta, aut enormiter dilatata nervorum omnium, etiam vitalium actionem sustulerint. Præterea spuma circa os lethale signum exhibere poterit, ubi hæc incipientis intra pulmones corruptionis, aerisque se se extricantis fuerit significatio. Animadversione quoque dignum est illud, quod monet RIVERIUS (b), nimirum complures *difficultati urine* obnoxios sæpe, hac evanescente, in *asthma* incidere, redeunte vero, ab *asthmate* liberari. Quod etiam de podagricis affirmari potest. Frequentissimum enim est, eos gravissima difficultate spirandi corripì, si *podagra* diutius immunes exstiterint; nec prius convalescere, quam podagra ad pedes, aut artus se se iterum contulerit.

Observatio de
asthmate
ex metastasi aliorum morborum.

(a) *Aphor. 43. sect. II.*

(b) *Prax. med. cap. de asthmate.*

Curatio.

§. CCVIII.

Indicationes.

Causis curatio accommodata est. Missis autem spirandi difficultatibus, quæ aliorum morborum symptomata sunt, quæque ab eorundem curatione levamen expectant, ad eas descendam; quæ peculiare propriumque exposculant medicinæ genus. Itaque si aer difficultatem spirandi fecerit, emendari arte debet, aut ejus mutatio imperari. Si venena, aut noxii vapores in suspicionem veniant, notæ acritati occurrere contrariis remediis oportet, aut citissime, fieri possit, eorum expulsionem moliri. Si a paralyssi, aut spasmo ma-

lum

lum pendeat, omnia, quæ in *capite VIII. Vol. III. De nervorum distentione, & rigore* proposuimus, hic quoque opportuna erunt. Sed in primis *oleosa*, quando *convulsivum*, & *spasticum* asthma est, oleum e vegetabilibus expressum, alterantisque in modum datum egregie prodest, itemque reliqua, quæ molliunt & laxant, & ea pariter, quæ anodyna sunt, uti liquor anodynus mineralis HOFFMANNI, sal sedativum HOMEERGII, liquor C. C. succinatur, sal volatile succini, camphora, moschus, opiumque. Extrinsicus ad laxandum musculorum intercostalium spasmus conferre cataplasma ex cæpis in oleo olivarum affatis prædicatur a nonnullis. Peregrinatio vero, aerisque in salubriorem mutatio, quam BAGLIVIVS summo opere laudat (a), hic præsertim locum habet. In asthma sicco, aut convulsivo humidi suffitus, & vapores a Lovisio (b) commendantur.

Anodyna.

Quid, si a spasmorum intercostalium? Aeris mutatio.

(a) *De morbor. succession. cap. XII.*

(b) *Mem. de l'Acad. Roy. de chirurg. T. V. ann. 1774. p. 549.*

§. CCIX.

In summa *spirandi difficultate*, si repente corripuerit, atque homini non ætate, nec morbis fracto supervenerit, quæcumque ejus causa sit, expedit sanguinem e vena brachii mittere; & multo magis, si plethora, si rubor faciei, si evacuationis aliqua suppressa id auxilii exigere videantur. Neque ab ea pulsus parvus, obscurus, & contractus, aut extremorum frigus deterreat, dummodo reliqua non repugnent.

Vena sectio quando conveniat.

§. CCX.

Emetica. Primarum viarum fordes, ubi sui indicia proferunt, morbumque fovere videntur, vomitu, aut alvi ductione expellantur. Vomitione illud etiam efficitur, ut, si quid in pulmonibus hæreat, valide inde excutiat. In asthmate porro humido crassioris, viscidiorisque pituitæ excreatio adjuvanda est oleosis, incidentibus, saponaceis. In primis laudantur veronica, scabiosa, althæa, hyssopum, helenium, radix iridis florentinæ; sperma ceti; gummi ammoniacum; sapo venetus; oleum lini; mel, oxymel, acetumque sciliceticum; syrupus nicotianæ, althææ, erysimi; millepedes, eorum dilutum, aut ex vino albo expressio; alkalina volatilia; balsamica, & terebinthinacea. Flores etiam sulphuris hic commendantur. FONSECA (a): pomo dulci excavato indebat floris sulphuris scrupulum, & tantumdem thuris masculi. Postea operculo suo clausum coqui cum cortice præcipiebat sub cineribus calidis, & sic coctum, & cortice mundatum comedendum dabat alternis diebus ad octo, vel decem vices. Conficiebat etiam *electuarium* in hunc modum.

Formula electuarii FONSECÆ. R. Sacchari, diamargariton. frigid., diapenidior. ana unc. j., flor. sulphuris pulv. drach. iij, mell. despumat. q. s. F. electuar. molle. Dos. drach. j. bis, aut ter in die. Quibus vero tabellarum forma magis arridet, hæ sic parari possunt. R. Sacchari rosat. unc. j., flor. sulphur. drach. j. M. F. s. a. tabellæ. Quod si humor pulmones obstruens videatur potius serosus, atque acer, quam crassus & viscidus, tunc præter oleosa mucilagi-

nes quoque, emulsiones decocta hordei, hydrogala ceteris præferuntur.

(a) *Consil. med.* LVIII.

§. CCXI.

Incidendi, & sputum, urinasque movendi laude celebratur radix scillæ (*). Hanc HESSIUS adhibebat a granis tribus usque ad grana duodecim (a). Marrubium etiam album potenter viscidos, & lentos humores incidit, & solvit. Alii succum ejus, alii pulverem radiceis, alii syrupum, conservam alii summopere extollunt. At LANGESUS (b) ex pulvere foliorum leni calore siccatorum majus emolumentum cepit. Tenerissimi furculorum apices ad id aptiores dicuntur. Fumum *tabaci* experientia commendavit. Eo enim egregie sputum elicitur, pulmonesque repurgantur. Sed *tabaco* substitui potest tussilago in eundem usum, & achillea montana arthemisiæ tenuifoliæ facie Lobellii, quam sæpe profuisse, memoriæ (c) proditum est.

Radix
scillæ.

Marru-
bium al-
bum.

Fumus
tabaci,
tussilagi-
nis, achil-
leæ mon-
tane.

(ñ) Videtis animadversiones de *scilla* in *Adversariis med. pract.* LUDWIGII. Vol. II. P. IV. c. 4. pag. 695.

(a) *Commerc. litt.* Nürimb. an. 1739. hebdom. 34.

(b) *Miscell. verit. fascic.* I. p. 57.

(c) *Memor. dell' accad. di Parigi.* Edit. venet. T. IX. p. 35.

§. CCXII.

Acida quæcunque pulmones ad tussim exstimulant, & simul incidunt, excreationemque promo-

Acida
vegetabi-
lia.

movent. At interdum e vegetabilibus deprompta ob admixtas mucosas partes vix satis operantur, præsertim in senibus, qui obtusiori sensu donantur. Quare FERRIUS in eorum asthmate, & tussi fossilium acida tam intrinsecus, quam extrinsecus adhibenda mavult (a). Multo vero prius a FLOYERO (b) commendata fuerunt, in primis nitri spiritus, & gas sulphuris, sive aqua fumo sulphuris acidulata. Longo autem usu cantharides celebritatem acquisiverunt. Hæ enim cuti admotæ, ut notum est, non modo vesicas excitant, unde humor prolicitur, verum etiam aliquid sanguini immittunt, quo ejus lentor attenuetur. Quare mos est, quorundam eas pluries, & variis locis adhibere, ut earum vis cum sanguine magis communicetur. His pituitosos, senesque pristinae sanitati semper restituit KLEUMINGIUS (c); ut ipse narrat. Potissimum vero in usu veniant, quando metastasis morbo causam præbuerint.

(a) *De acid. virib. p. 123.*

(b) MEADIUS *De imperio sol., & lun. p. 19. vel 29.*

(c) *Ephem. N. C., & CRANTZIUS Mat. Medic.*

§. CCXIII.

In ipso autem suffocationis metu præter sanguinis missionem, de qua supra dictum est, plurimum sæpe profuit pedes, aut manus, prout commodius fieri potest, in calidam demittere, fricationibus, & cucurbitulis artus subjicere, quæ vaporem per os haurire. Devicto vero morbo, danda opera est, ne revertatur. Eo collimant

Calnea

calida.

Fricationes.

Cucurbitula.

Vapores aquei.

Ad prophyllaxim.

mant fonticuli branchiis, femoribus, aut intra *Fonticu-*
 scapulas inusti, quos præter MEADIUM (a) com-
 plures alii proponunt. Sanguinem quoque vario *Quæ san-*
 modo emendare oportet; quo spectant multa, *guinem e-*
 sed præsertim serum lactis, & lac ipsum; jura *mendant.*
 cancrorum fluvatilium, ranarum, testudinum,
 viperarum (*); succi herbarum temperantium,
 & antiscorbuticarum; decocta lignorum; aquæ
 termales; balnea; equitatio; vectio; aeris in
 rusticanum, & puriorem mutatio. Quæ enim de
 exhalationibus e terra aratro fracta, aut e fodi-
 nis sulphureis emanantibus prædicantur, etsi cer-
 tis non sint experimentis innixa, non tamen
 omnino spernenda videntur. His igitur pro caus-
 farum diversitate uti licet ad prophylaxim, qui-
 bus si etiam victus opportuna ratio adjungatur;
 spes major erit morbi arcendi, præcavendique.

(a) *Monit., & præcept. med. cap. V.*

(*) Vide. §. 142. in not. Volum. III.; ibi enim
 viperini juris usus fufius ab auctore defenditur con-
 tra quosdam ejus vituperatores.

§. CCXIV.

Apnææ summum gradum attingunt laqueo su- *Suspensi,*
 spensi, aut aqua submersi. Hi ad vitam inter- *& sub-*
 dum, dummodo vere mortui non sint, revocari *mersi*
 possunt. Non erit ergo alienum tradere, qua *quomodo*
 ratione iis succurrendum sit. Utriusque corpus uni- *curandi?*
 versum valide, & diutissime perfricandum est;
 venæ brachii, aut colli aperiendæ, ut sanguinis *Valide,*
 aliquot uncie effluant; cucurbitulæ siccæ affigen- *& diuti-*
 dæ; clysteres acres subter dandi; fumus tabaci *næ frica-*
 (*), aut aer in os (compressis naribus, ne per *tiones.*
 eas redeat), atque in anum insufflandus; acria *V. S. e*
 nari- *collo, &*
brachio.
Fumus
tabaci, &
aer in os,

atque a- naribus indenda, & vino calido os fovendum.
 num in- Strangulatis etiam oleo, & vino calido cultum
 sufflan- inungendum; submersis vero æquali temperato
 di: calore, qui foveantur, opus est. Quibusdam re-
 medio fuit cinis, aut arena calefacta, qua scili-
 cet universum corpus involutum fuit. Neque hic
 Vapo- silentio prætereundi sunt ii, qui vaporibus, aut
 ribus ve- halitibus venenatis, uti carbonum, cloacarum,
 nenatis suffocati. aliarum mephitium, suffocationem, aut mortem
 suffocati. apparentem incurrerint; nam quantocius in æ-
 Aer fri- rem apertum, & frigidum capite elevato, maxil-
 gidus, & lis diductis transducendi sunt, aqua frigida asper-
 liber. gendi, & fere eadem ratione, qua submersi, &
 Aquæ as- suspensi, ad vitam compellendi. In horum tamen,
 persiones. os aut anum acria, & volatilia, non vero stu-
 Cautio circa u- pefacientia, qualis *tabaci* fumus est (a), immit-
 circa u- sum ta- ti debent. Deinde etiam, prout res exigit, alia
 baci, & acriora excitantia, revellentia, & evacuantia administra-
 acriora remedia. ri possunt.

(*) Submersum *tabaci* fumo in anum insufflato ad vitam Genuæ anno 1777. revocatum fuisse, nuper ex literis comperi cl. viri J. B. PRATOLONGO, cujus consilio, atque ope id auxilii ibi primitus adhibitum fuit. *Ex sch. auct.*

(a) CARMINATI De Animal. ex mephit. & noxiis halitibus interitu.

CAPUT VII.

DE ANIMI DELIQUIIS,

SIVE

DE LIPOTHYMIA, ET SYNCOPÆ.

§. CCXV.

QUando vitales, animalesque actiones imminuuntur, aut abolentur, ita, ut homo se viribus repente destitui sentiant, palleſcat, frigeat, pulsibusque arteriarum evaneſcentibus morituro, aut mortuo ſimilis evadat, tunc is *animo linqui* dicitur. Cum vero huius morbi varii ſint gradus, non alienum eſt, eorum ſingulos recensere. Leviffimus omnium eſt * ΕΨΧΥΣΙΣ, ſive *virium exſolutio* ab * ΕΨΛΥΩ *exſolvo*. Hunc ſubſequitur * ΑΙΠΟΘΥΜΙΑ (†), ſive *animi deliquium* aliquanto gravius. His omnibus adhuc gravior eſt * ΣΥΝΚΟΠΗ, vox greca a GALENI temporibus in artem inventa, quæ definitur *præces virium omnium lapſus*, ſive *ſubita reſciſſio*; * ΚΟΠΤΟ enim ſcindo eſt. Omnium denique graviffima habetur ſyncope, quæ cum * ΑΣΦΥΞΙΑ, quæ cum *pulſus* in toto corpore *abolitione* conjungitur. * ΣΦΥΞΙΣ enim, ſive Σφυγμός *pulſus* eſt; cui particula *a* privativa addita ſit vox, quæ *ſine pulſu* ſonat. Sed ſpeciatiim de *aſphyxia* in ſequenti capite dicetur, cum non recte, mea quidem ſententia, ad animi deliquia referatur. Plerumque enim in *aſphyxia* ſenſus, & motus, calor ſuperſunt, quod minime *ſyncope* graviore correptis convenit.

Animi deliquium quid ſit & quotuplex?

* Eclipsis

* Eclipsio
* Lipothymia.

* Syncope.

Copto

* Asphyxia.

* Sphixis, ſive ſphygmose

An aſphyxia ad animi deliquia recte referatur.

(†) Synonima sunt *lipothymia*, *liposychia*, &
 * *Lipo*, & * *Thymis* *apopsychia* a * *Δεῖπω* derelinquo, & * *Θυμῖς* ani-
 * *Psyche*. *mus*, aut * *Ψυχή* *anima*.

§. CCXVI.

Causa
proxima. Causa proxima videtur esse cordis, & sangui-
 nis motus fatiscens, aut etiam plus minus inter-
 ceptui. Languente enim; aut feriente cordis mo-
 tu, languent, ferianturque tum vitæ, tum ani-
 mi actiones; in quo positam diximus *animi de-*
causæ
remotæ. *liquiorum* naturam. Antecedentes, & remotæ
 causæ sunt subitæ, & graves animi commotio-
 nes; odorum acutiorum perceptio; dolores ali-
 quarum partium acerbiores (a); spasmus cordis
 gravior non minus, quam ejusdem paralytica re-
 solutio (b); nervorum cardiacorum compressio,
 aut irritatio (c); convulsiones in cerebro ince-
 ptæ, aut alibi exortæ, & ad cor ipsum propaga-
 tæ; officula in processu falcato meninges, & ce-
 rebrum prementia, irritantia, pungentia, talia
 scilicet, & tali in loco posita, ut nervos convel-
 lere, aut resolvere possint, qui ad cor spectant,
 aut cum corde consentiunt (d); evacuationes
 immodicæ/quæcunque; venena; febres malignæ,
 & pestilentes; balnea calida; transitus subitus e
 loco temperato in calidum, aut e calido in fri-
 gidum; plethorâ tam vera, quam apparens; san-
 guinis ad cor reditus impeditus, aut auctæ eidem
 e corde propellendo resistentiæ; cacochymia; aci-
 rates, aliæque prævæ sanguinis constitutiones;
 ventriculi, & in primis ejus sinistri orificii mor-
 sus, & irritatio; primarum viarum putridæ, aci-
 dæ, alkalescentes cruditates, & sordes; biliosa
 colluvies; vermes cujusvis generis, & præcipue
 tere-

teretes, & lati; hysterica, ac hypochondriaca mala; & demum vitiata structura; vitia ipsa cordis & adsitaram partium.

(a) SENACIUS *Du coeur Lib. IV.*

(b) MORGAGNIUS *epist. anatom. XXIV. n. 13.*

(c) *Id. ibid. n.* (d) *Id. ibid. n. 6. 7.*

§. CCXVII.

Inter hæc primus fere locus tribuitur ab ALBERTINIO, & MORGAGNIO venæ cavæ, & auriculæ dexteræ dilatationi, speciatim si una nervorum principium, aut cardiaci nervi idiopathice, aut sympathice afficiantur (a); deinde polypis dextri, & sinistri cordis ventriculi, tum maxime, cum serum in cerebri cava effusum concurrat (b), aut cor simul ulcere (*) laboret; quo casu dolor plerumque etiam in ejus regione percipitur (c); aortæ item, ac arteriæ pulmonari præter modum expansis. & dilatatis. Tunc enim majori nisu opus est cordi, ut sanguinem protrudat per arterias, cum ejus propulsio minime ab arteriarum systole sustineatur. Si vero eodem præterea tempore cerebrum aqua, aut alio modo compressum forte sit, eo magis cordis vis immi-
nuta, & languens resistenti sanguini cedat, succumbatque necesse est (d).

*Alia
caussa ab
aliis præ-
cordio-
rum vi-
tiis.*

(a) *Epist. anatom. med. XXV. n. 3.*

(b) *Id. ibid. n. 4.* (b) *Id. ibid. n. 17. 20. 21. 22.*

(d) *Id. ibid. n. 11.*

(*) Cordis ulcus cancerosum cum lipothymia, & syncope observavit CARCASSONIUS. En morbi historia, qualis exstat *Tom. II. p. 252. Histoir. de la Société Roy. de medec. &c. Juvenicula annorum*

CAR-
CASSO-
NII ob-
servatic.

XXII. lue venerea laborans unctione mercuriali curatur. Libera evadit ab omnibus malis, quibus torquebatur. Superfuit solum quoddam pondus in interiori pectoris parte e regione mammæ sinistræ intra quintam, & sextam costam verarum; de quo ante unctiones querebatur. Quinque, aut sex mensibus post absolutam antiveneream curationem assidue de eodem pondere lamentabatur; sed præterea accesserat dolor pungens ad eundem locum, nempe a centro mammæ ad medium sternum ejusdem lateris sinistri. Comparabat hujusmodi dolorem ad acus puncturas subinde inflictas. Fames canina per annum unum subsecuta est, quam lienteria comitabatur. Pulsus erat parvus, frequens, & intermittens. Inter dolorum cruciatus pulsus deficiebat per aliquot minuta secunda. *Lipothymia*, & *syncopes* crebræ. In progressu decumbere non poterat nisi erecta, non nihil inclinans retrorsum super latus sinistrum, aut super *anterius* (*le devant*) pectoris. Dolor, qui binos annos perseveravit, gradatim augebatur. *Syncopes* frequentiores; querelæ item, præsertim sub vitæ finem. Anno ante mortem famem caninam excepit cibi fastidium. Sectio anatomica ostendit *ulcus* &c. *Ex sch. auct.*

§. CCXVIII.

In cordis
cavitate
aer evol-
utus
syncopis
caussa
interdum
est.
Item hy-
drops pe-
ricardi, &
Rum-
plurim
cordis.

Nec fortasse a vero abest, aere in quandoque evolutum, & cordis cava distendentem in causa esse, cur, impedita ejus systole, *syncope* subsequatur; quod observavit GRÆTZIUS (a), referente MORGAGNIO (b). Pericardii etiam hydrops, aut ejus cum corde aliqua connexio cordis motum impedire interdum visa est (c); sive id fiat, quod aqua circumfusa ejus fibræ mollescant, ener- venturque, sive quod compressione, & pondere ita cor revinciatur, ut libere dilatari nequeat. Quidquid demum sive proxime, sive remote cor-
dis

dis motum cohibere, infringere, aut tollere potest, caussarum remotarum loco erit. Lethalem syncopem etiam subito efficiunt cordis rupturæ. Ludwigi^{us} affert exemplum (d) dextræ cordis auriculæ per externum ictum disruptæ; & subitam inde mortem afferentis. Sinistram quoque auriculam cordis diffractam a polypo intus contento vidit LANGHANSIUS (e); itemque corruptum refert (f) DIETERICUS NUMMSEN^{ius} ham-
Exemplum
eiusdem

(a) *Dissertat. de hydrop. pericard. in proem.*

(g) *L. c. n. 13.* (c) *Id. ib. n. 15. 16.*

(d) *Advers. med. P. I. p. 134.*

(e) *Act. helvet. T. II.* (f) *Dissertat. inaugu-
rat. de corde rupto. Lips. 1764.*

Diagnosıs :

§. CCXIX.

Eclysim, sive imminentem *lipothymiam* præ-
nunciant capitis offuscatio, gravitas, vertigo, te-
nebræ oculis obversantes; faciei, & labiorum pal-
lor; extremorum frigus; virium languor; sudor
e fronte, & collo manans; anxietas præcordio-
rum; pulsus parvus, imbecillis frequens, varius,
& subito mutabilis: quæ omnia fiunt graviora,
si jam adsit *lipothimia*. In *syncope* autem ipsa su-
bitus; & præceps est virium lapsus; respiratio fit
obscura; pulsus minimus, aut nullus; facies pal-
let, & livet; totum corpus frigido madet sudo-
re, ac alget; ægri nec vident, nec audiunt, nec
loquuntur; sed concidunt; membra quasi resolu-
ta laxantur; interdum spasms inæqualiter ten-
duntur; nares acuminantur; oculi subsistunt, in-

Diagnosıs
*ecly-
sis, &
lipothy-
mia*

Signa
*diagno-
stica syn-
copis*

cavantur, invertuntur; tempora collabuntur; & si ad summum gradum *syncope* pervenerit, quem aliqui asphyxiam vocant, facies etiam virescit.

§. CCXX.

Qui syncope ab apoplexia distinguitur. Differt porro *syncope* ab apoplexia per pulsum, respirationem, & faciei colorem, quæ ut plurimum in apoplexia servantur, immo quandoque invalescunt; contra vero deficient in *syncope*.

Quomodo ab epilepsia? Item ab epilepsia; quod membra alternis motibus universa convelluntur, non concidunt, ac spuma ex ore prorumpit. Ab hysterica demum suffocatione; quod in hac respiratio sæpe cessare videtur, non tamen pulsus, nisi forte cum ea

Lipothymia, & syncope solitis differentiis & ipsæ subjiciuntur, quibus alii morbi. Hinc primaria, secundaria, symptomatrica, sympathica, hysterica, convulsiva, idiopathica appellatur. Cardiaca singulare nomen obtigit ei in primis, quæ ab organicis ipsius cordis, aut proximarum partium vitiis pendet.

Prognosis.

§. CCXXI.

Quando exitium portendit animi defectio. Qui sæpe, & vehementer absque manifesta causa animo linquntur, ex improvise moriuntur (a). Hi enim vel polypo, vel aneurysmate, vel alio organico vitio laborare videntur, quo tandem penitus cordis, & sanguinis motus interciditur. Sæpe etiam mortis causa est subita cordis, aut vasorum ejus disruptio, & sanguinis cita in cavum pericardii, aut thoracis effusio. Si fluxui

muliebri convulsio; & animi deliquium superveniat, malum (b). Convulsio enim ab inanitione lethalis esse consuevit; neque cor, ubi sanguinis præsentia deficit, suum motum instaurare potest. Ceterum caussarum diversitas diversam quoque prognosim efficit.

(a) HIPPOCR. *aph.* 41. *sect.* II.

(b) *Aphor.* 50. *sect.* V.

Curatio.

§. CCXXII.

Duplex curatio est, altera in *paroxysmo*, ut vocant, altera extra ipsum. In *paroxysmo* statim motus sanguinis, & cordis excitetur. Facies itaque aqua frigida extemplo aspergatur. Contractis enim frigore fibris sanguis per venas ad cor provehitur, ejusque motus instaurat. Hac etiam ratione nervea vis incitatur, ut cordis irritabilitas in actionem revocetur. Idem præstant volatilia naribus admota, uti aqua melissæ *spirituosa*, & reginæ Hungariæ; acetum acerrimum; sales volatiles oleosi; spiritus salis ammoniaci, urinæ, cornu cervi; oleum succini. Cavendum tamen est, ne odora-
mentorum, & pharmacorum usu. *Cautio in odora-mento-rum, & phar-ma-corum usu.*

Sunt enim qui ea sive suavia, sive ingrata minime ferunt, aut ab iisdem convelluntur, quod, ubi *lipothymia hysterica*; aut *convulsiva* est, plurimum officit. Acetum, & sales volatiles fere ab omnibus feruntur. Intrinsecus quoque vinum generosissimum, spiritus melissæ, aqua cinamomi, confectio *alkermes*, salesque volatiles, aut ex his mixturæ variæ prudenter, & partitis *Qua intrinsecus danda? Cautio in car-diacorum usu.*

vicibus ingeri possunt. Cāute tamen cardiacis utendum, ubi *syncope hæmorrhagiam* subsequuta est, nam liberalior eorum usus, excitata nimis vitali vi, hæmorrhagiam iterum ciere posset.

§. CCXXIII.

Alexipharmaca, si a malignis causis sit, vel a febris pernicioſa. Si malum a malignis venenatisque causis oriatur, alexipharmacis, ac antidotis erit ei occurrendum, nimirum theriaca, contrayerva, serpentaria virginiana, vino, cortice peruviano, præsertim si *lyphotimia*, aut *syncope* febris perniciosæ symptoma sit. Castoreum, camphora, aliaque anthysterica conveniunt, si ab utero fiat; si vero à stomacho, ac intestinis, ea opportuna sunt, quæ causam tollunt, aut emendant. Vehementis dolor sedantia, ac anodyna exposcit; & plethora, polypus, aneurysma, terror missionem sanguinis. Neque frictiones, cucurbitulæ siccæ, acresque clysteres omittuntur, ubi diutius malum trahitur: neque supervacua sunt reliqua revellentia, si cerebrum primario affici suspicio sit.

Anodyna. V.S.

Revertentia.

§. CCXXIV.

Curatio extra paroxysmum. Extra paroxysmum causæ penitus auferendæ sunt, ne revertatur *animi deliquium*. Generatim cardiaca, instaurantia, volatilia commendantur, utpote quæ sanguinem, & cor excitant, humoris reparant, aut, si opus fuerit, resolvunt. Quo etiam omnis vitæ regimen spectare debet.

CAPUT VIII.

DE ASPHYXIA,

DUOBUSQUE EI PROXIMIS.

PULSUUM VITIIS,

§. CCXXV.

Aspixia, ut paullo ante docuimus, est *pulsus privatio*, & quidem talis, ut nullibi in toto corpore, saltem tactui, arteriæ moveri videantur. Hoc modo accipitur a GALENO, aliisque, qui ejus vestigiis insisterunt. (a). Quoniam vero in syncope graviore pulsum sæpe defectus observatur, ideo asphyxiam cum syncope ita nonnulli conjunxerunt, ii præsertim, qui arteriam pulsum omnem a cordis systole repetunt, ut quasi summus quidam ejus morbi gradus putaretur. *An cum syncope confundenda asphyxia?*
 Hic nil mirum, si cl. SAUVAGESIUS *mortes apparentes uno asphyxia nomine comprehenderit*; cui tamen adversatur præ ceteris auctoritas LANCISI; qui libro --- *De subitaneis mortibus* --- ejusmodi syncope correptos non * Ασφυκτες (i. e. asphycticos), sed *pseudomortuos* appellat. *Opinio SAUVAGESII rejicitur auctoritate LANCISII. * Asphyctus.*

(a) GALLENUS *lib. I. de præfag. ex pulsib. cap. II.*, & *lib. I. de different. puls. cap. 3.* BONETUS *Medicin. septentr. T. I. l. II. sect. XXI. cap. 2.*, & *sepulchret. T. I. l. 2. sect. IX. Observ. I. IV. VII. XLV.* ex BARTOLIN. *de lact. theor. cap. 14.*

§. CCXXXVI.

*Refuta-
tur quo-
que SA-
UVAGE-
SIUS a-
liorum
ecl. viro-
rum ob-
servatio-
nibus.
Differen-
tia inter
asphy-
xiam, &
syncopem.* Adversatur quoque SAUVAGESIO cl. MORGAGNIUS, qui *asphyxiam* esse tradit, quando pulsus adeo imminuuntur, & percipi amplius non possint; additque, ægros interea sensibus adhuc polle-
*Exempla
diutur-
nioris as-
phyxiæ.* re, loqui, moveri, immo etiam non penitus frige-
scere; quo sane differunt evidentissime a syncope, morteque apparente detentis (a). Hanc porro de *asphyxia* opinionem observationibus non tam supulchreto BONETI infertis, aut e VALSALVÆ schedis depromptis, quam compluribus suis, aliisque non paucis hinc illinc collectis, & prolactis invictissime comprobat. Recenset enim ibi-

*Exempla
diutur-
nioris as-
phyxiæ.*

MORGA-
GNII ob-
servatio-
nes de
asphyxiæ
notis.

dem (b) ne dum unius, vel alterius diei *asphyxias*, verum diuturniores, quæ scilicet ad quadraginta & ultra dies, immo ad quatuor usque menses fuerunt productæ, quin respiratio, loquendi potentia, sensus, motus, vires, calorque desiderarentur (*). Immo in *adversariis* (c) non solum ex BALLONIO (d) *asphyxiam* quatuordecim dies ante obitum persistentem, sed etiam duos ex RIOLANO (e) excitat, qui sine ullo arteriarum pulsu sex & decem annos vixerunt; qualem casum etiam a RONSÆO (f) visum ibi pariter memorat. Ægri enim externis, internisque sensibus satis vigent, loquuntur commode, se de latere in latus convertunt (g); quin prompte se erigunt aliqui (h): & quod noster vidit RAMAZZINIUS (i) juvenis quidam hebraeus, cui ad quatuor dies nullibi arteria micabant, adeo robustus erat & ad motum expeditur, ut etiam ipsa die, qua e vivorum statione decessit, e lectulo surrexerit, & suas vestes induerit (l). Quare appositissime

vir præclarissimus animadvertit, *asphyxiam sine Asphyxia*
syncope esse posse, syncopem sine asphyxia non pos- *sine syn-*
se (i). *cope est;*
hæc vero
sine illa
non da-
tur.

(a) *Epist. anatom. med. XXIV. n. I. IX.*

(b) *N. VIII. IX.*

(*) *Consentiunt observationes HALLERI Tom. III. oper. minor. p. 206., RAMAZZINII constit. epidem. ann. 1692. ... 93. ... 94. §. 13. SCKENCKII Tom. II., BERRYAT. Mem. de l'acad. royal. des scienc. de Paris. ann. 2748. pag. 58., & Comm. Lips. vol. II. P. IV. pag. 578.*

FERNELIUS *asphyxiam* xxiv. horarum curatam narrat, confirmatque RAMAZZINIUS *constit. cii. §. 33.* Post sex dierum *asphyxiam* quosdam convaluisse restatur BARTHOELINIUS *cent. IV. observ. 42.*

(c) *Advers. II. animad. 44.*

(d) *Epidem. II.* (e) *Encheirid. anat. lib. V. cap. 46.*) f) *MORGAGN. cit. epist. XXIV.*

(g) *Ibid. n. 2.* (b) *Ibid. n. 6.*

(i) *L. c. n. 9.* (l) *Epist. XXV. n. I.*

§. CCXXVII.

Atque hæc, quam modo descripsiimus, est *vera* *Asphyxia*
vera. *asphyxia.* Sunt quidem aliæ *asphyxiæ* species, quas cum HAENIO *spurias* (a) vocamus *Spurie*
asphyxia
quæ, &
quæ? Tales sunt *asphyxiæ* in alterutro, aut utroque brachio observatæ; dum interea reliquæ arteriæ temporales, carotides, cruriales, aliæque consueti metu attolluntur, & subsidunt. Hæ autem peculiarium partium *asphyxiæ* vel a profundius locatis arteriis aut nimia pinguitudine sepultis; vel a variata earum distributione, aut insolita tenuitate; aut a subclaviarum (*), axillarum, aut numerariarum compressione, aut earumdem obstructione, aut spastica constrictione oriuntur.

untur. Inter quas referri etiam debet illa asphyxia, quæ in fine plerorumque morborum ante mortem ex virium omnium, ac in primis vitalium, languore, & defectu supervenit. Non enim in hac, ut in illa vera, motus, vox, sensus, color, & calor æque servantur.

(a) Rat. med. T. XII. cap. 2. p. 42.

(*) Pulmones infarcti, duri, tumidi subclavias &c. premunt.

§. CCXXVIII.

Verarum *causæ* *probabiliores.* *Spuriarum* autem *asphyxiarum* ut non admodum obscura origo, sic quoque non difficilis explicatio videtur. At *verarum* dispar ratio est. Parum enim lucis cadaverum sectiones hactenus huic malo attulerunt. Verosimile tamen est, eadem causas, quibus *lipothymia*, & *syncope* (§§. CCXVI. CCXVII. CCXVIII.) inducitur, hic quoque locum habere, sed mitius agentes. Inter has arteriarum rigiditas rationi videtur magis consentanea, qua fit, ut sanguinem illæ quidem recipiant, distendi vero ac diastole micare nequeant. Idque sane de ea dici potest audentius, quacum universi corporis, mentisque aliquis languor conjungitur. Quomodo vero ejusmodi causæ apte accomodari poterunt *asphyxiæ* diuturniori, illibatas mentis functiones, ac alacre musculorum exercitium constanter servanti? Cur cessante arteriarum, quæ tactu explorari possunt, motu, non etiam illico cessat reliqui motus, & reliquæ functiones, ut in *syncope*? Fortasse cōtinuatur adhuc, ut sanguinis circuitus per pulmones.

Arteriarum rigiditas cui asphyxiæ speciei explicandæ conveniat?

Conjectura de causis diuturniores asphyxia.

nes, cerebrum, & cerebellum perennetur. At diu calor, & vita in partibus a corde remotioribus superesse nequeunt, nisi in his quoque aliquis, etsi lenis, ponatur humorum circuitus. An ergo, motu cordis, & sanguinis utcumque perseverante, sola arteriarum systole nervorum ad eas spectantium vitio conquiescit? Multa profecto argumenta ab accuratissimis observationibus deducta videntur evincere, arteriarum motum non a sola cordis vi dimanare (*). Sed missa re difficilima explicatu, in qua nihil certi neque MORGAGNIUS, neque HAENIUS statuerunt, satis est aliquid de causis, quas anatome in asphyxia defunctis detexit, referre.

Arteriarum motus non a sola cordis vi dependet.

(*) Id RHODII, LANCISSII, MORGAGNI, HAENII; ZIMMERMANNI. BARTHEZII, aliorumque observationes evincunt.

§. CCXXIX.

HAENIUS, scribit (a), anatome facta multorum post asphyxiam mortuorum, cor, & auriculas flaccidas, dilatasque; in aliis grumosum cruorem; in aliis multa alia vitalium viscerum detecta vitia esse: integrum cuique esse, horum vitiorum cuilibet originem tribuere, causasque asphyxiae; esse vero huc usque & imperfectam, & incertam explicationem omnem, eum non in omnibus eadem causae repertae fuerint; cum hac ipsa causa in aliis asphyxias generatrices non existerint: cum causae enarratae quacumque alios longe morbos creaverint; cumque tandem mira, sed obscura de nervis doctrina id saltem evicerit, ne vestigiis quidem vitalium morborum in cadavere inventis,

HAENII observationes anatomicae de asphyxia causis.

ventis, hos a solis nervis excitari, perpetuarique posse.

(a) *Rat. med. T. XII. c. 2. p. 49.*

§. CCXXX.

Alia de asphyxia causa
 MORGA-
 GNII ob-
 servatio-
 nes.

Ex MORGAGNII vëro anatomicis disquisitionibus certo colligere possumus; *asphyxiam* aliquando natam non tam a pericardio per vincula membranæ cordi adhærente, quam ab ipsius cordis exteriori membrana crassiori, & duriori facta, qua commode cor dilatari prohibebatur (a), & tunc præcipue, cum simul pericardium aqua, aut pure scateat; itemque a polypis in corde, aut initio arteriæ magnæ locatis (b); aut a fero in ventriculis cerebri collecto, cerebellumque afficiente; aut ab abscessibus cerebelli, aliisque vitiis, quibus nervi sive ad cor, sive ad arterias tendentes læderentur. Neque tandem ab *asphyxia* causis excludi posse videntur primarum viarum saburra, atque hystericæ, convulsivæque affectiones.

Alia asphyxia causa.

(a) *Epist. anat. med. XXIV. n. 3.*

(b) *Ibid. n. 7.*

§. CCXXXI.

Duo alia vitia pulsum.
Exilitas, & intermissio.
Exilitas, & debilitas pul-

Proxime ab *asphyxia* sequuntur duo alia pulsum vitia, summa nimirum eorum *axilitas* cum *debilitate* conjuncta; & aliquis eorum ictus subinde deficiens, quem *pulsus intermittentem* dicunt. Et primum, quod ad illam spectat, ea vel a natura est, neque tunc mali aliquid portendit; vel

vel a morbo (a), veluti ab ingenti fibrarum cordis flacciditate, & atonia (b), a cordis aucta mole cum summa laterum ejus tenuitate, & debilitate (unde ea, qua opus est, vi non potest sanguinem expellere); aut cum aqua in pericardio contenta, & cor aut laxante, aut comprimente conjuncta. Cor enim auctum sine his pulsus magnum, vibratum, & vehementem progignit. Aqua vero in pericardio contenta, si acris fuerit, addit celeritatem, atque interdum duri-
sus vel a natura, vel a morbo est.

(a) MORGAGNIUS, *epist.* XI. n. 13., *epist.* XXI. n. 49., & *epist.* XXX. n. 15.

§. CCXXXII.

Sanguinis quoque in arterias ingressum imminunt *valvula semilunares* aortæ ostio præfixæ; si duræ, cartilagineæ, aut osseæ evaserint. Hinc *pulsus parvus*, & *debilis* facile intelligitur derivandus; qui prætera observantur in iis, quibus *vasa cordis coronaria*, aut *arteriæ* ab aorta proficiscentes osseam rigiditatem induerint (a). Consensus item ab imo ventre, a saburra putrida (b), aut acri stabulanti, ab utero ad cor, ejusque nervos cardiacos propagatus; horum nervorum paralyxis; sanguinis inopia; arteriarum angustior capacitas; languida systole; imminuta irritabilitas pulsus *parvum, exilem, ac debilem* gigunt.
Debilitas pulsus ab aliis vitiis inter-
 ternis.

(a) Idem MORGAGN. *ibid.* n. 19.

(b) Id. *ibid.* n. 20.

§. CCXXXIII.

*Ab arcta
cordis
cum peri-
cardio
connexio-
ne.* Pulsus præterea debilem & parvum efficit pericardium cum corde arcte connexum. Quo cor cum neque satis expandi neque satis contrahi possit, nil mirum, si pulsus debilis inde sequatur. Talem observavit PEYERUS, LOWERUS, & MORGAGNIUS; sed debet simul adesse aut parva sanguinis copia; aut languida cordis vis; aut magna arteriarum resistantia, uti rigiditas, diurities, angustia; aut spastica costrictio; plenitudo tanta, ut arteriæ non possint nisi modice se contrahere. Alias pulsus incitatus, & vehemens esse posset, qualem DIONYSIUS, FREINDIUS, & LAFAYUS (a) commemorant.

(a) MORGAGN. *epist.* XXIV. n. 12.

§. CCXXXIV.

*De pulsu
intermit-
tenti.* Jam verò aliquid de pulsu intermittenti dicamus. Intermittens pulsus considerari potest tanquam brevissima asphyxia. Quid enim est vera asphyxia nisi pulsus intermissio quam longissime perdurans; sed pulsus intermissio raro per se sola morbus occurrit. Sæpe aliorum morborum symptoma & signum est; ad quorum cognitionem non parum confert, si ejus naturam, & causas paullo uberius exposuerimus.

§. CCXXXV.

*Quid in-
termittens
pulsus?* Pulsus intermittere dicimus, quando interval-
la diastole arteriarum deficit, nec tactu percipitur.

opportunis ei occurratur auxiliis. Majus negotium facessit ea, quam metastasis, aut consuetæ evacuationis suppressio, aut hæmorrhagia intulerit. Quæ demum a vitio organico oritur, curationem vel nullam, vel difficillimam, & vix perdurantem admittit, eritque periculi magnitudo pro ejusdem vitii ratione æstimanda. *Quando non?* *Si a vitio organico dependeat; ejus periculum quomodo æstimandum?* *Quinam huic magis obnoxii?* *Quid, si frequens sit & morbos chronicos consequatur?* *Æstimatio* autem vitii ab adjunctis etiam symptomatibus, difficili respiratione, pedum œdemate, præcordiorum anxietate, imbecillitate, aut intermissione pulsum desumitur. Ut plurimum moleste afficit eos, qui jam quadraginta annos excedunt. Hi autem ad senectutem raro perveniunt, morte immatura sublati. Vel enim acuta feбри, vel hydropē, vel repentina syncope correpti intereunt (a). Generatim palpitatio, quæ crebro incidit, non spernenda est; in primis si diuturnos animi affectus consequitur, aut potest solutos morbos, & cum multa nausea, & bilis vomitu contingit, neque vomitus nauseam, & palpitationem tollit, ut familiare est atra bile laborantibus, & durum lienem habentibus.

(a) NICOL. PISO lib. II. de morb. cogn., & curand. p. 207.

Curatio.

§. C C L.

Varia medendi ratio esse debet pro causarum diversitate. *Palpitatio deuteropathica*, aut *symptomatica* curatur iis, quibus morbus, unde illa proficiscitur. Et suis itaque locis petenda est. Generatim vero curandum est, ut sanguis per præcor-

*Indica-
tiones ge-
nerales.*

*Quando
sanguis
mitten-
dus?*

*Quando
non?*

*Sanguis
missio
e brachio,
pede, hæ-
morrhoi-
dibus
quando
utilis?*

dia circuitus facilis reddatur; quæcunque irritatio, aut irritandi potestas tollatur, emendetur, educatur sensibilitas nimia, aut nimia irritabilitas mitigetur; ac demum cor, adnexæque partes firmentur. Uno fere omnium ore sanguis missio ad palpitationem curandam commendari solet, & quidem ea sæpe necessaria est palpitatione laborantibus. Verum, ubi vires languent, aut hydropis metus est, aut hæmorrhagiis, evacuationibusque vasa conciderunt, noxia jure habenda est. Neque admodum prodest, licet interdum levamen affert, in idiopathica. Ceterum in ea palpitatione, quam plethora, ætas juvenilis, bonus corporis habitus, suppressæ evacuationes, motus corporis, aut animi vehementior, aut terror antecesserint, vel comitantur, sanguinem mittere e brachio, pede; aut hæmorrhoidibus, utilissimum est. Item quando a polypo, aut ab aneurysmate est, & malus corporis habitus nondum eo provectus sit, ut obftet; nullum præstantius ea occurrit auxilium, quo graviora symptomata, instansque suffocatio præcaveatur.

§. CCLI.

*Quando
adhiben-
da occo-
protica,
clysteres,
anthel-
mintica.
aperien-
tia?*
*Alvi du-
ctio.*
*Sanguis
len-
tori, vi-*

Si *cacocbylia*, *vermes*, *viscerum abdominalium obstructio*, aut *ventriculi repletio* morbum fecerit, lenia *eccoprotica*, *clysteres*, *anthelmintica*; atque *aperientia* adhibenda sunt. Proficuum quoque est alvum ducere, ut capitis mala avertantur, si qua cum ipsa palpitatione exorta sint. Sanguinis lenitor, visciditas, acritudo postulat succos cichorei, taraxaci, buglossæ lupulorum, melissa; becabungæ, nasturtii aquatici, aut juscula iisdem plantis alterata, serum caprillum, lac, aquas medicatas

tam

tam thermæles, quam acidulas, aut ferro scatentes. Ubi morbi cutanei retropulsi palpitationem excitaverint, præter diluentia, & temperantia mox memorata, stybio crudo diaphoretico, floribus sulphuris, decoctis ex sarsaparilla, china, smilace asperia, saponaria, juribus ex viperis, ac balneis opportunitate utendum est.

sciditati, acritudini, quid opponendum? Quæ medela palpitationi a retro-pulsis morbis cutaneis?

§. CCLII.

In hypochondriacis, ac hysteriis amara, ac stomacho dicara, uti absinthium, camædri abrotanum, cascarilla, quassia, cortex peruvianus, rhabbarum, elixir proprietatis *Paracelsi*, & echa-lybe parata remedia locum habent: quæ postrema etiam convenientissima sunt, ubi cordis, majorumque vasorum compages laxata, ac ampliata sit. Neque cardiacorum, atque analepticorum obliviscendum est, si virium languor, aut sanguinis imminuta copia malum creavit. Si vero nervorum affectiones in causa ferint, anodyna, & nervina in usum vocentur; in primis pulveres temperantes, nitrum, liquor anodynus mineralis *Hoffmanni*, C. C. succinatum, oleum succini, sal sedativum *Homborgii*, camphora, castoreum, aqua florum aurantiorum, tilix, menthæ piperitidis, nuce virides cohobatæ, moschus, opium, quanquam hoc a *LIEUTADIO* hic reprobetur.


Palpitationi ab hypochondriaci, & hysteri a gente quæ medentur? Item cordis, majorumque vasorum dilatationis? Quando utendum cardiacis, & analepticis? Quando anodynis?

§. CCLIII.

Victus ratio indicationibus accomodetur. Vitetur repletio, & ciborum varietas. Cæna sit levis. Vinum vel prorsum intercidatur, vel aqua, in qua chalybs extinctus sit, temperetur. Quies-

Vitia regimen.

scendum etiam quammaxime est, iis præsertim, qui aliquo organico vitio laborant, vel lenissimus sit motus, & qualis neque defatiget, neque sanguinem concitet. Exerceri vero, & moveri saluberrimum est hypocondriaca, aut hysterica passione effectis, dummodo sensim, & per gradus exercitatione, ac motu utantur. Studia, Venus, animi pathemata, ira, tristitia, mœror sedulo arceatur.



C A P U T X.

DE

CORDIS, AORTÆQUE POLYPO.

§. CCLIV.

*Defini-
tio.*

EX quo anatome diligentius excoli cœpta est (a sæculo nimirum XVI.), sæpius a professoribus inventæ sunt intra vias sanguinis tenaces quædam firmæque concrectiones, carnis, membranæ, aut laridi frustulum referentes, quibus ob aliquam cum narium polypis similitudine *polypi* nomen indiderunt (*); quod morbi genus aut plane veteribus ignoratum est, aut certe vix conjectura perceptum.

*An mor-
bus vete-
ribus no-
tus?*

*Quis fue-
rit pri-
mus in-
ventor
polypo-
rum in
cadave-
ribus.*

(*) HALLERUS in ea hæresi est, ut putet, VESALIUM, & BENIVENIUM fuisse primos *polypi* inventores in cadaveribus. At MORGAGNIUS dubitat, num veri *polypi* fuerint, an potius *excreſcentiæ*, ut eas nominavit MARCELLUS DONATUS, aliique. Hinc obser-

(**) GALENUS fortasse conjectura id morbi assequutus est, ubi ANTIPATRI morbum describit sub *levium arteriarum obstructionis* nomine.

§. CCLV.

Polyp
seeds

Multi-
plex ratio, &
forma
concre-
tionis po-
lypos.e.

Descri-
ptio ha-
rum va-
rieta-
tum :

nulis pertunduntur, vel etiam excavantur, ut per eas sanguini liceat transcurrere.

§. CCLVI.

Causa proxima. Causa proxima harum concretionum videtur esse aliqua *motus sanguinis imminutio*, sive *quies*, qua ejus partes *gelatinosæ*, *mucosæ*, sive, ut vocantur, *fibrosæ* in unum coguntur, & concrescunt. Notum enim est, sanguinem ubi motum amiserit coagulari, ac consistere, idque in primis ejus parti concrescibili, & *mucosæ*, quibus crassamentum, serum, & lymphas catent, potissimum deberi. Quidquid igitur sanguinis motum imminuit, retardat, cohibet, aut ejus concrescendi vim auget, aut solidarum partium robur enervat, atque infringit, quietem illam, e qua *polyposæ concretiones* pendere diximus, procreabit.

Causa remota. Lipothymia, sive animi deliquum, & multo magis ipsa syncope inter causas remotas primum tenent locum; secundum vero pavor subitus, & vehemens terror. Namque si recte perpendatur, quomodo in *animi deliquiis*, & subitis gravibusque terroribus cordis motus supprimatur, sanguisque aut sistatur, aut retardetur, & quomodo inter cordis valvularum ejus, vasorumque repetitos languidos tremores succitatur; perspicuum mox erit, necessario *polyposas concretiones* esse orituras; ut ex RHUYSCHII, atque HAENII luculentissimis evincitur experimentis.

Præcipua lipothymia, syncope, pavor subitus, & vehemens.

§. CCLVII.

Aliæ causæ. Præterea dum sanguinis per præcordia circuitui se opponunt, *constrictio*, *induratio*, *compressio*, aut

aut tumores arteriæ ; pulmonaris ; aut aortæ ; *Vista in præcor-*
 pulmonum morbi , uti difficilis respiratio , asthma , *diis.*
 peripneumonia , pleuritis , phthisis , hydrops pecto- *Pectoris*
 ris , & pericardii , itemque musculorum respira- *varii*
 tioni inservientium spasmus diuturnior , aut reso- *morbi.*
 lutio , aliaque hujus generis impedimenta , quæ *Spasmus,*
 sanguinis liberum motum impediunt , aut retar- *aut reso-*
 dant , faciuntque , quominus cordis auriculæ , & *lutio mus-*
 sinus se deplere possint , polypo progignendo caus- *cul rum*
 sam præbent . *respira-*
sioni in-
servien-
cium.

§. CCLVIII.

Lentorem sanguinis ejusque ad concrescendum *Proegua-*
 proclivitatem , & vim augendo polypi generatio *mena ,*
 ni favent diathesis inflammatoria ; lues venerea , *qua len-*
 arthritica , scorbutica ; scabies , aliaque cutis vi *torem*
 tia retropulsa ; mœror ; acida in primis mineralia ; *sanguinis*
 spiritus fermentati ; venena coagulantia , specia- *indu-*
 tim saturnina ; halitus venenati , febres pestilen- *cunt ,*
 tes , & contagiosæ ; alimenta cruda , viscida , au- *ejusque*
 stera , concoctu difficilia ; tempestas , & regio *ad con-*
 perfrigida , aut contra nimius calor ; gelidæ po- *crescen-*
 tus ; plethora ; feri , & lymphæ nimia aut copia , *dum vim*
 aut densitas ; corporis proceritas , quam incusat *adau-*
 HOFFMANNUS ; immodicæ ; etsi consuetæ , eva- *gent.*
 cuationes ; & præ ceteris uberior quæcumque
 sanguinis , SWIETENIO notante , profusio .

§. CCLIX.

Quæ vero solidarum partium vim imminuunt , *Alia ,*
 ac hebetant , sanguinemque ad concrescendum ali- *que ato-*
 cubi præparant , sunt in primis otium , vita iners *niam so-*
 & deses , in qua corpus languet , clater fibrarum *lidrum,*
anæque
tardita-

*sem. Auri-
aorum
inferunt.*

*Dilata-
tiones
auricu-
larum,
ventri-
culorum
cordis,
adnexo-
rumque
vasorum.*

deperditur, humorum circuitus lentescit, eorumque deperit requisita liquiditas. Nec absimili ratione agunt animi curæ graviores, ac studia immoderata. Sed hoc præcipue spectant auricularum, ventriculorumque (*) cordis, aut vasorum his appensorum aneurysmatica, & varicosa dilatatio. In iis profecto locis sanguis consistit, in quibus *impellens vasorum vis minor fuerint, & major luminum capacitas*. Major autem capacitas, & minor vis impellens in vitiis tam *aneurysmaticis*, quam *varicosis* procul dubio est.

*Observa-
tio ana-
tomica.*

(*) In cadavere CAROLI COM. FIRMIANI insubrica & regia primum, deinde cæsarea simul legatione italica clari, sed doctrina magis, humanitate sine exemplo, omniumque virtutum laude commendatissimi, cujus adhuc desiderio tenentur quotque sunt cujusvis ordinis cives, in ejus, inquam, cadavere inventum est thorax valde depressum, & pericardium, in quo liquor exiguus aderat, ita pinguedine obvolutum (quæ sane duos latos digitos mensura excedebat), ut ab ea undique comprimeretur. Quare *cor parvæ molis flaccidumque, auriculæ item parvæ apparuere. Sinistri ventriculi parietes summe tenues ac fere cartilaginei, dextri vero paullo quidem minus extenuati, sed valde flaccescentes*, intra cujus *cavitatem polypus grandior*, qui duobus veluti ramis serpendo ingrediebatur *cavam & arteriam pulmonarem*, detectus est *extima sua parte grumosus nigricansque; intima ac centrali albus, fibrosus, tenax*. Interiorē hanc concretionem veterem fuisse, secus recentem atque a morte exortam quæ in exteriori ambitu cernebatur, creditum est. Nam si *alba illa & dura recens concretio fuisset*, eadem *superne, & infra cruorosa* quæ dicitur *pars* (ut statuit MORGAGNIUS *pseudopolypis* in cadaveribus sive erectis, sive supinis genitis) visa esset. Sed interna erat & *embolum* referebat, cui circum

cum ambiens recentior concretio sive *pseudopolypus* incumbibat; ergo *hanc recentem, veterem illam* fuisse recte potest definiri. *Extenuatio autem tenuitasque parietum utriusque ventriculi, & flacciditas dextri innuere videntur, cor olim fuisse aneurysmaticum;* posteaque angustum in locum a comprimente pinguedine redactum parvæ molis apparuisse. Ex quibus vitiis symptomata morbum comitantia, ipsamque mortem explicat cl. *Auctor* in suo *diario italico anni 1784*. Nos vero hæc pauca modo debilavimus, ne totam ab origine historiam morbi, integram sectionis anatomicæ narrationem, aliæque corollaria ab eo ibi deducta exscribentes longiori orationis filo a suscepto rerum ordine discedere videremur. *Nota editoris.*

§. CCLX.

Quotiescumque igitur contingit, ut *sanguinis* *Grumus sanguinis.* *grumus* sive a deliquio, sive a pavore & metu, sive a nimia cavearum, per quas transit sanguis, amplitudine, sive ab earundem scabritie, inæqualitate, constrictione, compressione, aliave causa in corde, aut adnexis vasibus motum amittat, aut remoram faciat, ibique hæreant, sensim eidem aliquid ejus accrescit, *fibrosæ* in primis, *Genesis, & structura polypi in homine vivente.* atque ad *concrescendum* pronissima *seri partis*, lentæ, viscidæ, a reliquis secedentis, ac ob imminutum motum coalescentis; sicque aliis atque aliis particulis in fibrarum, aut telæ modum accedentibus, ac adpressis, mutuæque attractione conferruminaris (quinimmo in cordis anfractus, villos, lacertosque, aut in valvularum tendines insertis, implicatisque) coagmentantur, ac solidantur *polypi* variæ duritiei, molis, & coloris; prout major cohesio, aut diuturnius tempus, aut copiosior materiæ additio, aut rubra, albidave san-

sanguinis pars in eorum concretionem concurrerit. Atque ita rem se habere, ipsa *polyporum* structura saepe *grumum sanguinem* quasi nucleum recondens, & *congeriem pellicularum sibi mutuo impositarum* (quales MALPIGHIUS vidit, quum eorum fabricam penitus perscrutaretur) omnino referens ostendere videtur.

§. CCLXI.

*An vera
eorum o-
pinio,
qui pu-
tant po-
lypos vel
in arti-
culo mor-
tis, vel
statim a
morte
dumtaxat
con-
fieri?*

Nec me hinc movent, quæ contra *polypi* in vivis generationem adducuntur rationum momenta a clarissimis viris KERCKRINGIO, LIEUTAUDIO, PASTA, FANTONIO, RHUYSCIO, SWENCKIO, aliisque putantibus, concretiones polyposas quas-
cumque, quæ in mortuorum corde, vasisque ma-
joribus inveniuntur, parietibus, valvulis, colu-
mnisve affixas ex sanguine, ejusque concrescibili
parte in ipso interitu, aut mox post interitum
dumtaxat confari. Nam etsi non inficiemur, sæ-
pe has quidem in ipso mortis articulo, vel paul-
lo post eam ex quiescente, frigefacto, coactoque
sanguine compingi: non tamen desunt invicta
argumenta, quibus ad credendum compellimur,
polypos in vivente etiam homine nasci, & diu
cum vita superstitè conjungi.

§. CCLXII.

*Infirmæ
KERCK-
RINGII
objectio-
nes.*

Et primum, ut aliquid adversariorum objectio-
nibus reponam, scire oportet KERCKRINGIUM non
quamcumque *polypi generationem* impugnasse, sed
eam dumtaxat, quæ ab universalibus sanguinis
partibus reperitur, non vero quæ ab *albis*, &
concrescibilibus oritur; idque *tam molli brachio*,

ut

ut ait MORGAGNIUS (a), fecisse, ut MALPIGHIO non arduum fuerit multo validiori manu contra eum *polyporum* defensionem suscipere (b). Neque minus infirmam esse causam, quam *polypis* indixit LIEUTAUDIUS (c); cum ipse *polipos*, quales in naribus prorumpunt, idest *fungosas excre-*
scentesque carnes, a se unquam in cadaveribus, quorum ingentem numerum dissecurisse narrat, repertos neget. Nam non de *tumoribus carneis fungisque* cordi aut vasis innascentibus hic sermo est, ut ex iis, quæ supra innuimus, apparet (quanquam & excrecentes carnes sive sarcomata, licet ipse non viderit, viderunt sane VESALIUS & BENIVENIUS, teste MARCELLO DONATO, & demum RICHARDUS WISEMANNUS (d) in puella sexdecim annorum); sed de *concretionibus* hic agitur, quæ a *sanguine concreto*, aut ejus *concrescibili parte* fiunt. Clarissimi porro ANDRÆ PASTÆ objectiones valere potius adversus eos, qui omnes *polypos* in cadaveribus inventos jamdiu exstitisse in viventibus credunt, vel alias causas, quibus morbi, & mors ipsa tribui, æquiori jure poterat, aut non inquisivere, aut secus ac debuissent neglexerunt, aut dubiis, fallacibus, aliisque vitiis communibus signis nimirum confisi temere; & non satis vere *polypum* ubique posuere.

Item
LIEU-
TAUDI
objecta
infirmiora.

Objectiones
PASTÆ in-
opportuna.

(a) *Epistol. anatom. med.* XXIV. n. 27.

(b) *Oper. posthum.* (c) *Precis de medecine* liv. 1. chap. de la syncope p. 275.

(d) *Tractat. chirurgic.* anglice scriptus. &c.

§. CCLXIII.

Ex allas-
tis obje-
ctionibus
non se-
quitur,
genesim
polypo-
rum nec
veram
nec possi-
bilem ef-
se.

I. Demon-
stratio.
I. Argu-
mentum.

II. Ar-
gum. ex
LANG-
HANSII
observa-
tione.

Quæ omnia tantum abest, ut nos tangant fe-
riantque, quin a nobis æquissima lance expensa
ut rationi consentanea probantur. Non tamen il-
lud inde consequi arbitramur, ut *polyporum* ge-
nerationem in viventibus nec veram, nec possi-
bilem reputemus. Animadvertimus enim primo;
aneurismata, quæ initio magna pulsatione attolle-
bantur, sæpe temporis progressum omnem pulsa-
tionis ictum paullatim amittere, ideoque plerum-
que, ut apud omnes in confesso est (a), accide-
re ex eo, quod *aneurysmatis* cavum, concre-
scente sensim sanguine, & polyposa hinc orta
crusta, quasi nova tunica interius obducatur;
hocque adeo certum esse, ut instituta sive teme-
re, sive consulto in viventibus incisione *aneurys-*
matum eorum, quæ in *cubiti* aut *poplitis* flexura
erant, id ipsum sit pluries demonstratum. Rese-
rato enim aneurysmatis sacco, protinus ne dunt
polypose concretiones varii generis proruperunt
(b), verum etiam totam ejus interiorem faciem
succinxisse visæ sunt. Secundo notandum duci-

mus, LANGHANSIUM narrare (c), a *polypo* se di-
sruptam vidisse *sinistram cordis auriculam*, qui
tantæ molis erat ac firmitatis, ut recens natus
dici nequaquam posset; neque nasci in ipso mor-
tis tempusculo eum potuisse credimus, quoniam
manifestum omnino est, quidquid sanguinis liqui-
di auriculæ inerat, aut in eam ingrediebatur,
antequam dehisceret rumpereturque, celeriter ab
eadem dilacerata effluere debuisse, neque quid-
quam ejus in ipsa retineri potuisse, nisi quod
jam multo ante coiverat, firmiterque adhæserat.

(a) SWIS-

- (a) SWIETENIUS in BOERHAVII aphorismos §. 176. p. 236., HAENIUS Rat. medend. Par. IV. cap. 2. MASOTTIUS Dell' Aneurisma del poplite p. 28.
 (b) Acta Helvetica T. II.
 (c) Ibidem p. 123.
 (a) De aneurysmat. Prop. xxxviii. p. 172.

§. CCLXIV.

Tertio rem LANCISII experimento, si quod, aliud, probatissimo confirmamus. Ligavit vir clarissimus in vivo cane alteram ex arteriis iliaticis. Potest dies xv. dissecuit ligatum vas, invenitque in eo supra vincturam *polyposam concretionem* (a). Nec obstat, idipsum experimentum ab alio celeberrimo viro repetitum non respondisse. Nam illud idem, quod LANCISIUS narrat, ligato in agno arteriæ iliacæ ramo tentavit, viditque manifestissime PASCHALIS FERRARIA (b), nec non ante eum cl. PETITUS in iis, quibus membrum aliquod fuerat amputatum; altero quippe ab amputatione die, interdum etiam vigesimo, aut trigesimo *polypos* in arteriis membri mutilati, quibus vinculum ad sanguinem sistendum de more fuerat injectum (c), offendit.

III. Argu-
mentum ex
LANCI-
SII expe-
rimento.

Idem ex-
perimentum a
FERRA-
RI con-
firmatum.

- (b) Delle morti, e malattie subitanee. Edit. 2. p. 39., & seqq. Neapoli 1767.
 (c) Memoir. de l'academ. des scienc. anni 1731.

§. CCLXV.

An hæ *polyposæ concretiones* vitæ deficienti, aut sanguinis coagulationi mortem subsequenti tribui possunt? Si itaque & solita aneurysmatum pulsatio, in nascentibus intus *polypis*, per sæpe evanescit,

Conclusio
ex allatis
argu-
mentis.

nescit, & partium exteriorum aneurysmata, ubi sectione aperiuntur, polypis plena in vivis se produnt, & auriculæ cordis disruptæ polypos intra concretos interdum exhibent, & in vivis animalibus non minus quam in hominibus capta experimenta eos demonstrant, concludendum sane est, *polypos*, qui in corde, vasisque sanguinis aut dilatatis, aut quocumque alio modo labefactatis reperiuntur, non omnes deficientis vitæ sive mortis esse ut a non nullis habentur, effectus.

§. CCLXVI.

*Auctori-
tati ne-
gantium
polypos
opponun-
tur illu-
stiores
auctori-
tates.*

Quod si *polypos* negantium auctoritas non minoris ponderis ac momenti auctoritatibus refellenda sit, non desunt PECHLINI, MALPIGHI, SNELLI, VATERI, LANGGUTHI, SCHACHERI, HOFFMANNI, SENACII, SWIETENI, MORGAGNI; HALLERI, aliorumque omnigena doctrina, anatomie, & clinice excellentium sententiæ, atque observationes; qui omnes & polypos tuentur, & jamdiu in vivis genitos aut viderunt, aut vivos esse testantur. Et quamvis sanguinem recens extractum in durissimam massam interdum concreescere, & vitreo vasi non leviter adhærere (quod cl. PASTA objicit) negandum non sit; attamen cum illustri HALLERO licebit notare (a), *coagula nimis dura, & alba, neque adeo subito nata, in auricula potissimum dextra, valvulis venosis, tendineis funiculis, & ramis suis intertexta, cordisque lacertis, & demum ita innata, ut nisi laceretur separari non possint, aut demum minimis inter reticulatas cordis interni fibras quasi radiculis suis infixæ* (quæ cum bene multis aliis vidit cl. auctor) aliam

*cl. PASTÆ ob-
jectio re-
jicitur
HALLE-
RI argu-
mentum.*

aliam omnino naturam , & coherendi rationem præferere , quam ea , quæ aut recens in cadaveribus , aut in extracto e vena sanguine nata dicuntur .

(a) *Physiolog. lib. V. sect. I. §. XI.*

§. CCLXVII.

Præterea ; quid *symptomata polypum in cadavere inventum* precedentia significant ? Nonne *hec* (inquit laudarus HALLERUS (a)) *manifesto confirmant* , in vivente jam homine impedimen-
tum in cordis caveis adfuisse , quod non nuper de-
mum , interque moriendum natum fuit ? & cor
palpitavisse , cum se imperfecte depleret ? neque
unquam eo se liberavisse stimulo , qui a polypo
(crasso corpore) internam caveam obsidente natus
non poterat non cor sollicitare ? Adde ? MORGA-
NIUM ipsum , qui alioquin argumenta omnia ,
quæ contra polyporum in vivis *genesim* adduci
possunt , diligentissime conquirit ; recensuit , &
probabit , polypos tamen non omnes negantem .
Ipse enim tam olim in *adversariis anatomicis* se-
cundis , animadversione secunda , quam nuper in
epistola anatomica XVII. num. IX. itemque in epi-
stola XVIII. num. XXIII. , & demum in epistola
XXIV. num. XXX. polypos ante mortem (in sacci-
formibus præsertim aneurysmatibus) gigni posse ,
& genitos se vidisse interdum testatur . Immo per-
difficile existimat (si motus sanguinis , etsi non
sit omnino impeditus , sed tamen retardatus ; ut
in magis aneurysmatibus) nihil tandem , longo
saltem temporis intervallo , secedere , nihil con-
crescere , & adherere e sanguine aut lentius illuc

Id etiam
evincunt
sympto-
mata
preceden-
tia poly-
pi in ca-
daveri-
bus in-
ventio-
nem .

Accedit
auctori-
tas MOR-
GAGNII ;
qui non
omnes
polypos
in vivis
gigni pos-
se negat .

progrediente, aut etiam in sacciformibus aneurysmatibus propemodum subsistente. Verosimillimum enim est, per idem sacci orificium, per quod facile illapsus impulsusque est, totum non facile

Car rediturum. Quamquam vero in aneurysmatibus interdum sanguinem cogi posse affirmet, negat tamen id in corde, licet præter naturam ampliato, evenire; quod fibræ cordis irritabiliores sint, ac proinde validius semper reagant, quam illæ arteriarum, ita ut nunquam in eo sanguis possit conquirere (b). Verum qui hac de causa polypos rejiciunt, perpendant velim, non solum a

MORGA-
GNIUS
neget
tantum-
modo in
corde po-
lypos con-
crescere
posse?

motu deficiente polypos concrecere posse, sed etiam a tremulo, & concutiente, qualis in syncope, aut magno in terrore cor prehendit, oriri, ut perspicue demonstravit experientissimus HAENIUS: ne de alienis in sanguinem immixtis, eumque coagulantibus aliquid dicamus. Ex quibus, omnibus, ni fallor, patere satis videtur, polyporum generationem a vivo etiam homine non esse penitus excludendam.

Rejici-
tur hæc
MORGA-
GNI ex-
ceptio
non satis
validis
funda-
mentis
innixa.

(a) Physiolog. l. c.

(b) Cit. epist. XXIV. n. 30.

§. CCLXVIII.

Hinc duplex genus polyporum; verorum nempe, & spuriorum. Cum vero polyporum alii mortis tempore, alii jampridem vivente adhuc homine concreseat, duplex ideo eorum genus constituendum esse videtur; alterum verorum, qui scilicet jamdiu in vivo homine exorti sint, morbumque reapse effecerint; alterum spuriorum, qui morte tantum accedente formantur. Illi ex firma, tenaci, elastica, & fibrosa veluti substantia constat, & parie-

Hinc du-
plex ge-
nus poly-
porum;
verorum
nempe, &
spurio-
rum.

Quinam
veri?

parietibus, columnis, valvulisque cordis, aut valvorum lateribus arcte adhærent, ut inde sine laceratione interdum divelli nequeat. Hi vero a morte nati quamdam massam mollem, facile separandam, sanguini coacto, aut crustæ pleuritica dictæ persimilem; aut grumum inferiori parte rubarum, superiori vero gelatinosum & albidum, aut flavescentem referunt. Quam divisionem ita probat MORGAGNIUS, ut etiam rationem, qua polypi in cadaveribus reperti ad utrum genus referri debeant, scitissime tradat (a). Summatim inatos *saccatis aneurysmatibus* ante mortem esse autumat, si *circum undique & in omnem plagam extendantur ac adhæreant*, sic ut *positum agri aut cadaveris non videantur sequi*; itemque si *colore lurido aut absoleto sint, substantiaque præter modum exsucca*; hisque discriminibus differre veros a spuris, seu, ut vocant, *pseudopolypis* in corde aut vasis a morte natis, cum hi contrario se modo habeant, & positus diversitati, in quo quis obierit aut jacuerit, ad amissum apprime respondeant, *rubra nimirum parte subter locata, desuper vero albido glutine, seu glutinoso coagulo apparente*.

Divisio hac probatissima MORGAGNIO est.

Ex eo utriusque veteris, & recentis polypii signa.

(d) *Epist. anatom. med. XVII. n. 29.*

Diagnosis.

§. CCLXIX.

Exposita *polyporum vera natura ac origine*, signa modo recensenda sunt, quibus *polypi in præcordiis delitescentes* dignosci creduntur. Præcipue eorum notæ habentur *pulsus intermittens aut*

Polypi latentes in præcordiis quibus signis digni

gnosci
credan-
tur.

*Incerta
hæc, quia
commu-
nia aliis
morbis.*

*Quædam
etiam,
non exce-
pto pulsu
intermit-
tenti;
plerum-
que desi-
derantur
in polypi
vitiis.*

*Pericar-
dii crassi-
ties*

*quando-
que poly-
pum men-
titur.*

*Qualitas
pulsus-
peculia-
ris in po-
lypo.*

inæqualis, pulsatio carotidum, & subclaviarum vehementior; cordis palpitatio; lipothymia, & syncope; respirandi difficultas; & pedum œdemata. Quantum verò hæc incerta eorum indicia sint, utpote multis aliis morbis & causis communia, sic ut *pathognomica polypi* esse nequeat, partim ex iis, quæ de *læsa respiratione*, *hydrope thoracis*, & *pericardii*, *lipothymia* & *syncope*, *asphyxia*, *pulsu parvo debili ac intermittente*, & de *cordis palpitatione* tradidimus; partim ex iis, quæ de *aneurysmatibus*, & *varicibus præcordiorum* in sequenti capite tradetur; luculentissime erit perspectum. Imo quædam ex his (non excepto pulsu intermittente, aut inæquali, qui alioquin perpetuus *polypi* comes a plerisque habitus est) defuisse interdum in iis, in quibus *polypus* repertus est, veracior hystoria medica (a) docet, nosque ipsi non semel observavimus. Imo sapientissime monet ALBERTINIUS (b), pericardii crassitiem; aut cum corde cohæsionem sæpe *polypi* signa præferere, & errandi occasionem præbere, nec certo vitia hæc internosci posse; nisi quis fortasse putet satis discriminis esse, *pulsum* in *polypo* magis a naturali plerumque recedere, & motum manu ad cordis locum apposita manifestiorem percipi, nec ita facile ac in illis animum deficere.

(a) ALBRECHTUS THEAR. *Nov. act. phys. med. acad. cæsar. Leopold. Carolin. N. C. T. I. ann. 1757. p. 6.* MORGAGNIUS *Epist. cit. XXIV. n. 28.*, TREWIIUS *nov. act. phys. med. &c. T. II. observat. 53.*, *Commentar. de reb. in Sc. nat. & med. gest. Vol. VII. Par. I. p. 114.*

(b) *Super quibusdam difficilis respirationis vitiis inter opuscula Vol. I. Comm. institut. scientiar. 43 art. I. Bonon. p. 385.*

§. CCLXX.

Nihilo tamen minus si causæ; quæ *polypo* gignendo valent, prægressæ fuerint, si aliorum in *præcordiis* vitiorum signa absint; aut eorum, cum quibus *polypi* facile conjunguntur, indicia non considerentur: & præterea pulsus nisi intermittens, inæqualiter saltem inæqualis; cordis palpitatio; tremor; anxietas; angor; difficilis respiratio; tussis; & molestus in pectore sensus (quæ postrema indicat sanguinem e sinistro cordis ventriculo in aortam non libere ingredi, aut e pulmonibus refluxum in venam pulmonari, aut sinistra auricula congeri) ægrum paullatim corripiant, ac assidue divexent, non sine causâ de *polypo* intra aortam, aut *sinistrum cordis sinum*, aut *auriculam sinistram* poterimus suspicari (a): Si vero respiratio minus laboreat; pulsus languidior, ac exilior sit; & crebrius syncope, quam suffocatio recurat; tremor cordis, & anxietas magis, quam vehemens palpitatio affligat; & ventris colli subsilient, & quasi undulationibus micent, probabilius videtur *polypus dextris cordis caveis insidere*. ALBRECHTUS THEAR (b) in homine, in cujus dextro ventriculo *magnum polypum* in arteriam pulmonarem protensum, in sinistro vero minore; sed in aortam ultra pedem decurrentem, cum corde ingenti reperit, *difficilem respirationem*, & *summam anxietatem* cum interpositis *lipothymis*, sive *pulsuum intermissione* observaverat.

Conjectura quædam de existentia *polyporum* in *præcordiis*; intra aortam, aut *sinistrum cordis sinum*, vel *auriculam*.

Signa latentis *polypi* in *dextris cordis caveis*.

(a) ALBERTINIUS l. c. p. 391. (b) L. c.

§. CCLXXI.

*Pulsus
ratio, va-
ria.*

*Anoma-
la cor-
dis, &
spiritus
affectio-
nes.*

*Cur in-
terdum
præsentem
polypo
nulla in
pulsibus
irregula-
ritas.*

Ex his vero quædam continua sunt, quædam recurrentia. Pulsus præcipue fere perpetuo esse solet inæqualiter inæqualis, immo in ipsa difficiliore respiratione, quæ ut plurimum ad quemlibet vel levioris corporis motum, aut ad aeris mutationem, & speciatim ad venti austeri statum accedit, aut ingravescit, obscurus fit, intermit- tet, ac deficit. Cordis vero tremor, palpitation, vel ejus jectigatio, & dispnoea inordinatim in- vadunt, revertuntur, & suffocationem, lipothy- miam, atque ipsam quoque syncopem minitantur. Non tamen statim ac pulsus intermissio, aut inæqualitas abest, credendum est *polypum* etiam abesse. *Præsentem* enim *polypo* in præcordiis, nullam interdum pulsum inæqualitatem, aut in- termissionem deprehensam fuisse, jam §. CCLXIX. adnotavimus; videlicet quando *polypi* moles, stru- ctura, aut positio talis est, quæ sanguinis itum & reditum etsi lædat, non tamen enormiter læ- det, aut interceptat (a).

(a) ALBERTINIUS l. c. p. 390.

§. CCLXXII.

*Alia si-
gna ob-
servata
a MAL-
PICHIO.*

MALPIGHIUS præter pulsum intermittentem, & crebram lipothymiam cum cordis *polypo* conjungi etiam vidit pluries pulsum vibratum, vasa in ju- gulo dilatata, præcordiorum angustiam, alteru- trius brachii torporem, in eodem pulsus obscurita- tem, & spasticum in sterni dolore (a). HOF- FMANNUS vero dolorem fixum circa cor cum sen-

sensu compressionis inter initia percipi asseverat; cum autem jam adoleverit, accedere ad hæc frequentiore cordis palpitationem, pulsusque summo inopere inæqualem, & sæpius ad intervalla subinde intermittentem (b). Œdemata pedum addunt alii; alii faciei rubrum, purpureum alii, alii cachecticam cum palpebrarum tumore colorem; anhelitum facile inter loquendum insurgentem; sanguinem e vena eductum tenacem, densum, pleuriticum; cacochymiam; aliaque læsæ, abruptæque sanguinis per præcordia trajectionis consectoria (c). Sed quam caute hisce signis uti liceat, jam alibi (§. CCLXIX.) indicavimus.

Quadam ex HOF-FMAN-NO.

Alia ex aliis.

Cautio.

(a) L. c. (b) L. c. (c) HAENIUS, MACOPPE; MALPIGHII.

Prognosis.

§. CCLXXIII.

Polypus passim incurabilis reputatur. Sæpe mortem subitanæam (a); vel catarrhum suffocativum inducit (b). Interdum lenta morte enecat, & hydrothorace, aut hydrocardia, in quam incidunt ii præsertim, quibus subtumida est facies, aut œdemata pedum, aut cachecticus habitus supervenerit. Nonnullos polypo laborantes miseram vitam ad xy. xvi. annos protraxisse narrant RIVIANUS; RIVERIUS, alique (c). Quamvis vero morbus incurabilis hic esse perhibeatur, si tamen recens sit, neque adhuc indissolubilis polyposa concretio evaserit (d), HAENIUS & LANGHANSIUS (e), a quibus non valde abfuisse videtur ALBERTINIUS, non omnem abjiciunt spem, credunt.

Passim incurabilis habetur.

Alios morbos chronicos inducit.

Ad multos annos trahitur.

Non desperandum quandoque, si recens morbus sit.

278 CAP. X. DE CORDIS, AORTÆQUE
que fieri posse, ut idonea curatione removeatur; imo etiam curatos aliquos referunt.

(a) TULPIUS, & BARTHOLINUS subitam mortem a *polypo sinistri ventriculi* illatam narrant; & WEPFERUS ab *aortæ polypo*.

(b) Vidit KIRSTENIUS.

(c) Lentam ex *polypo* mortem commemorant *acta academica natura curiosorum*.

(d) *Ratio medend. Par. II. cap. VIII.*

(e) *Act. Helvetica T. II. pag. 123.*

Curatio.

§. CCLXXIV.

Indicationes.

Iterata sanguinis missio tum ad præcavendum, tum ad curandum polypum.

Caute in sanguinis missione.

Ab ea non deterreat obscuritas, vel aliquid ea-

Curatio itaque innititur indicationibus sanguinis lentorem resolvendi; debitum eidem fluorem, ac aquabilem per vasa excursum restituenti; polypi solutionem moliendi; aut ejus saltem incrementum prohibendi; effectusque, qui ipsum consequuntur, mitigandi. Hinc sanguinis missio, & quidem iterata, præsertim in plethoricis & sanguineis temperamentis, accommodatissima censetur cum ad *polypum* præcavendum, tum ad eundem dissolvendum, ubi jam est; tum etiam ad ejus symptomata discutienda; aut compescenda. Sit tamen in ea instituenda aliquis modus, adjunctorumque ratio, ut par est, habeatur; ne vires plus justo cum magno agrotantis detrimento deiciantur, vasorum robur infirmetur, aut debilita sanguinis crasis destruat; quod a sanguine temere ac inconsulto profuso non raro accidisse doluimus. Ab eo vero non semper deterreat pulsus obscuritas, oppressio virium, aut aliquod cachexiæ principium: nam ubi ager opprimi, suffo-

cari-

carique videtur , sæpe mirifice cauta sanguinis missione relevari potest ; & melius est anceps experiri remedium , quam nullum . In universum vero nihil magis fatiscentem cordis motum erigit revocatque , aut congesto restitantiue sanguini iter parat , aut inceptam ejus concretionem resolvit , quam cita sanguinis missio , ut *halleariana* in vivis animalibus facta pericula ostendunt .

*cheria
princi-
pium.*

*Experi-
mentu
Halle-
riana.*

*Cita esse
debet
V. S.*

§. CCLXXV.

Hoc itaque præsidio *palpitationi* vehementius *v. s.* *quando* *celeriter* *instan-* *da?* *Quibus* *sanguis* *tutus* *mittitur* *hirudini-* *bus, vel* *cucurbi-* *tulistam* *siccis,* *quam* *sacrifica-* *cis?* *Vinctu-* *re, &* *fricatio-* *nes; ma-* *nuum, pe-* *dumque* *in calida* *immer-* *siones.* *Quando* *cardia-* *cis, re-* *solventi-* *bus, &* *paregori-* *cis uten-* *dum?* *Alius*

urgenti, *orthopnœa*, itemque *syncopi* supervenienti celeriter succurrendum est . In *cacheeticis*, *dydropicis*, *debilibus viscerum obstructionibus affectis* tutius sanguis mittitur per hirudines hæmorrhoidibus applicatas, aut cucurbitulas tam siccas, quam scarificatas dorso, cruribusque admotas . Fricationes quoque, & ligaturæ dolorem inferentes , manuum & pedum (si per œdemata liceat) in calidam demissio, odoramenta naribus supposita, ac alia hujus census utiliter pro diversa circumstantiarum ratione & necessitate in usum vocari possunt . Neque interdum alienum est , cardiacis , lenioribus resolventibus , imo etiam sedantibus & paregoricis uti ; ubi nempe languida vitæ vis excitanda, aut spastica convulsivæque affectiones sedandæ videantur .

§. CCLXXVI.

Quidquid etiam viscera abdominis prægravat, vasaque illuc decurrentia comprimit, aut obicem diaphragmati opponit, diligentissime expedit amo-

*ascenda
clysteri-
bus, &
blandis
occopro-
ticis.*

*Inciden-
tie.*

*Diluen-
tia.*

*Ptisana
verno
tempore.*

*Æstate
aquæ me-
dicatæ.*

vere. Quare alvus a facibus, flatibusque libera
servetur ope clysterum, blandorumque eccoproti-
corum de quibus mentio alibi facta est. Deinde
quæ diluunt, quæ temperant, quæ sanguinis &
lymphæ densitatem attenuant, caussisque; unde
morbus dimanavit, occurrunt, in usum veniant.
Nitrum, tartarus vitriolatus, terra foliata tarta-
ri, aut ejus liquor, sal polychrestus, mel, oxy-
mel, gummi ammoniacum incidunt egregie. Ob-
viū, ut vocant, saponaceam & simul temperan-
tem commendandæ sunt verno tempore ptisana
ex hordeo, gramine, soncho, chærephyllo, ci-
choreo: æstivæ vero aquæ medicatæ affatim &
diu, prudeutis tamen medici consilio, haurien-
dæ. His enim universa sanguinis massa diluitur,
vasa omnia deplentur referanturque, humorum
circumvolutio promovetur, fibrarum oscillatio ex-
citatur, & nimia ad concrescendum sanguinis
proclivitas avertitur.

§. CCLXXVII.

*Spiritus
salis am-
moniaci,
sal tar-
tari, sapo
venet., &
aqua cal-
cis ex cl.
SENACIO
ce-
teris sunt
præstan-
tiora.*

*Dosis ho-
rum re-
medio-
rum; &
mira eo-
rum vis.*

Reliquis vero ab illustri in primis gallorum
regis archiatro SENACIO anteferuntur spiritus salis
ammoniaci, sal tartari, sapo venetus, aqua cal-
cis ritè ex ostrearum testis crematis parata, atque
ex his quotidie tantum fumi diutissime jubetur,
quantum morbi magnitudini & pertinaciori natu-
ræ videtur accommodatum. Incipiendum autem
a parciore dosi est, paulatimque ad largiorem
ascendendum. Tanta inest his resolvendi polypum
potentiâ, ut prægrandes durioresque polypi e ca-
daveribus extracti, inatque aquam calcis cum
saponis veneto & sale tartari commixtam inje-
cti

Et brevissimo temporis spatio colliquati fuerint (a).

(a) Vid. SENAC. *Traite du coeur*. Vol. IV.

§. CCLXXVIII.

LANGHANSIUS (a) tanquam experientia comprobatum sumi jubet semel aut bis quotidie pulverem, qui fit ex radicis serpentariæ virginianæ scrupulo, salis ammoniaci defæcati, & nitri puri singulorum granis xii. Deinde ad chalybis usum cum lenibus aromaticis adjectis transeundum esse præcipit. Chalybi vero tunc maxime erit locus, cum solidarum partium debilitas, mala chylosis & cachexiæ metus remedia roborantia suadent. HAENIUS etiam gloriatur (b), non paucos *polypo* dententos sola antiphlogistica cura a se fuisse sanitati restitutos. Dedit autem his per sesquimensi singulis diebus semiunciam roob baccarum sambuci, tantundem pulpa tamarindorum, & nitri drachmam ex feri lactis langiori haustu: Addebat vesperi pro re nata *paregoricon* ex diacodio. Ab ALBERTINIO (c) succum expressum ex lupulorum, aut chærephylli foliis commendatum legimus, cui interdum lac adjiciebat gummi ammoniaci ea confectum ratione, quam BARTHOLETTUS proponit, vel spermatis ceti recentis partem aliquam, & ubi valentius agendum esset, cum aliquot granis florum salis ammoniaci marcialium permixtam, vel aliquod salii essentialis alicujus plantæ e dissolventium genere: Hoc nomine præstare etiam dicuntur radix polygalæ tam virginianæ, quam vulgaris: dulcamara; arnica; extractum cicutæ atque aconiti cœrulei, tinctura acris antimonii, alia-

Pulvis
LANG-
HANSII
compositus ex
rad. serpen. virgin., sal amm., & nitri puri. Tum chalybis. & roborantium
usus.

HAENII
methodus antiphlogistica-

Methodus Cl.
ALBERTINII:

Dissolventia quæ?

*Decocta
lignorum
mercu-
rionalia, &
vocatilia
caute u-
surpan-
da.*

aliaque hujus generis attenuandi laude insignia. Decocta vero lignorum, mercurium, salesque volatiles, utpote quæ vel cordis, arteriarumque motum nimis concitant, vel sanguinem rarefaciunt, ejusque augment motum, cum BOERHAAVIO (d), ALBERTINIO (e), aliisque sanioribus medicis vel nunquam in polypi suspitione adhibenda, vel magna omnium rerum consideratione cautissimæ usurpanda esse censemus (*).

*Observa-
tiones, &
exempla
damni a
mercurio
illati.*

(a) L. c. (b) L. c. (c) L. c.

(d) *Instit. med.* §. 826. (e) L. c.

(*) Virum vidit ARERTINIUS ex *mercurio dulci* salivæ proritandæ causâ sumpto incidisse in contumacem cordis palpitacionem; item alium ab eodem *mercurio* tam *dulci*, quam *vivo* assumpto ex præcordiorum aneurysmate enecatam; ac tandem alium ab *illitu mercurii* post aliquot annos dilata-tione auriculæ cordis dexteræ, & pericardii hy-drope correptum obisse. Hinc monuit PARÆUS, aneurysmata interna frequenter accidere iis, qui litus mercuriales ad curationem luis venereæ mul-toties pertulerint. Sublimati etiam corrosivi usus suspectus esse debet, ut patet ex BONELLII in cl. BASSANIUM animadversionibus.

§. CCLXXIX.

*Victus
ratio.*

Quod attinet ad victus rationem, carnibus præstant olera, fructus probe maturi, pisces fluviatiles. Glutinosa omnia, acida, austera, & spiritus fermentati, imo vinum meracum (nisi cachexiæ timor, aut ventriculi languor aliter poscant, quo in casu id aqua chalybe lenito alterata dilui potest) penitus exulent, utpote quæ sanguinis spissitudinem augere, aut eum cogere, vel rarefacere nimis, & exagitare possunt. Postrema hac de causâ

*Noxia
corporis
nimia
exercita-
tio.*

fa

sa suspecta est quoque corporis exercitatio, maxime incessus per acclivia. Lenissima tamen vectio in aere puro, elastico, sicco, ventis haud agitato permitti potest. Animi quoque affectus vehementiores, eorumque causæ sedulo vitentur, in primis amor, odium, inæror atque ira. Ex his enim alii actiones naturales depravant, alii cordis motum lædunt, aut intercipiunt, alii concitant, ac irritabilitatem sollicitant; unde vel crudi, impuriue succi in sanguinem traducuntur, vel lente et crescente promptior via ad stagnationes paratur, vel vasa impetu majore illato præter naturam dilatantur; ut inde *polypus* incrementum facilius recipiat, vel repente diffracta dehiscant.

*Animi
pathema-
ta arcen-
da.*

N O T A.

Exstat inter minora opuscula Auctoris de hoc argumento dissertatio, quam legendam tradidit VINCENTIO NEGRIO anno 1776., quum is de hujusmodi cordis vitio theses publice propugnandas aggrederetur. Vide theses de polypis præcordiorum, quas in Ticinensi Gymnasio laudatus VINCENTIUS NEGRI propugnavit, & eodem anno Ticini edidit in 4. Typis Joseph Bolzani.

CAPUT XI.

DE

ANEURISMATIBUS .

ET VARICIBUS

PRÆCORDIORUM.

§. CCLXXX.

ID, quod latini *arterie dilatationem* appellant, a græcis *Α'νεύρυσμα* *, ab arabibus *hyporisma*, vel *aporysma* vel *emborysma* nominatur. *Aneurysmatis* etymon non omnes una eademque ratione explicant; alii enim ab una, alii ab alia voce illud derivant (*). Græcis, arabibusque erat ille *tumor arterie*, qui ab ea disrupta, aut discissa effusoque sanguine in vicina spatia ortus esset (a). Ab hac sententia descitum est posterioribus temporibus; sic ut non rumpi, sed tantummodo dilatari arteriam in *aneurismate*, FERNELIO, & VESALIO præeuntibus; passim crederent (b) SENNERTUS vero, HILDANUM fortasse sequutus (c), *aneurysmatum* naturam non in sola *dilatatione arterie*, verum etiam in ejus *tunica interioris ruptione* (duabus enim tunicis arteriam constare olim putabant), exteriorē interim integra, positam esse tradidit (d). Sed SENNERTI, FERNELII, & VESALII sententiam reprobans FREINDIUS, observationibus bene multis in medium prolatis, veterum opinionem restituere annisus est (e); Rem vero ipse, si non fallimur, minime confecit. Ostendisse tan-

tum

* *Aneurysma*.
Ætymologia.

Quid
græcis, &
arabibus
esset?

Veterum
definitio
immutata a
FERNELIO,
& VESALIO
est.

Aliter
a SENNERTO
definitus
morbus
est.

FREINDIUS
veterum
sententiam
nisi
re-vocare.

tum visus est, *aneurysmata* cum ad summam dilatationem perveniant, disrumpi tandem, non in ipsa ruptione arteriæ antea constitisse.

(*) HIERONIMUS MONTIUS, ut LANCISIUS tradit (*de aneurysm. in gener. lib. I. propos. 1.*), id enervationis vocabulum transtulit *aneurysma* a particula privativa α, & τῷ νεύρῳ. i. e. a nervo. SYLVATICUS autem (*Tractat. de aneurysmat.*) a verbo Εὐρύω, scilicet dilato, deducit. Demum M. AURELIUS SEVERINUS (*De noviss. observ. abscess. cap. VII. p. 170.*) ab Εὐρύω, nempe effluere, & exsilire derivandum arbitratur. Etymologia vero SYLVATICI reliquis præferenda videtur.

(a) GALENUS (*lib. Isagog. defin. med., & de tumorib. præt. natur. class. III. c. XI.*) *aneurysma* (inquit) est relaxatio venosi vasculi, aut dispersio spiritalis materiæ sub carne per dissultationem se diffundentis &c. Atque alibi: ore autem in arteria facta, affectio *aneurysma* vocatur: fit autem vulnerata &c. Ex his GALENI verbis colligitur; ab eodem tam dilatationes venarum, quam arteriarum, earumque ruptiones comprehendi sub uno *aneurysmatis* nomine. Addit, autem ibi unam ex multis causis, nempe *vulnerationem*; quod clarius explicat libro *de curand. ration. per sang. mission.* 22., & 23. inquit, *incisam arteriam aneurysmate facillime corrumpi.* Vid. ORIBASIIUM *Collect. medicinal. lib. VII. cap. 13. & 14.*, AETIIUM *Tetrab. IV. sermon. 2. cap. 51., & serm. III. c. 10.* ACTUARIUS ZACHARIÆ filius (*meth. med. lib. III. cap. 2.*) testatur, hoc nomine Græcos intellexisse etiam simplicem dilatationem arteriæ. Ex sch. aut.

(b) Vid. BONET. *Sepulchret. anatom. lib. IV. sect. 2.*

(c) Vid. FREINDII *Histor. med.*

(d) *Id. ibid.* (e) *L. c.*

§. CCLXXXI.

Qualis hodie morbus intelligatur. Hodie vero compertissimum est, *arterias*, detracto aut destructo cellulari quo firmantur involucro, protinus intumescere; & præter naturam extendi; quin ulla interiorum tunicarum scissura, aut laceratio contigerit: neque ullo negari potest modo; a vulnere, punctura, contusione interdum aneurysmata repente oborta esse? neque rationi, experientiæque repugnat, laxata quomodocumque; aut exesa, aut diffracta interiore arteriarum compage, eas in tumorem protuberare consuevisse. Hinc *aneurysmatum* triplex genus commodissime constituitur alterum: a sola *dilatatione arteriæ*, alterum ab *eadem disrupta*, aut quocumque modo *aperta, hiante*; ac *sanguinem effundente*; tertium ab *utraque causa oriundum*, sive *mixtum*; quod cl. HUNTERUS (a) constituit; etsi a nonnullis ut fictitium rejiciatur (b).

(a) *Medical observations and inquiries by a society of physicians in London. Vol. I. artic. 37.*

(b) Id referunt auctores *Diarii de litteratura Europæ T. IV. ann. 1758. pag. 114.*

§. CCLXXXII.

Primum genus est veterum; spuriorum tertium compositum sive mixtum. Quæ ad *primum* genus spectant, a chirurgiæ professoribus *vera* appellantur; *spuria* quæ ad *al-*
terum (a); quæ demum ad *tertium*; utpote ex
secundum; & vero, & spurio composita; *mixta* ab HUNTERO
tertium mox laudato dicuntur (b). Nonnulli addunt *quar-*
compositum *tum* genus, scilicet *aneurysma varicosum*, quod
mixtum. fieri

fieri dicunt, quando *arteria & vera* contigue ita perforantur; ut sanguis ex illa in hanc irruens tumorem salientem efficiat (c); ut si ex. causs. *basilica vena pertusa communicet cum vulnere arteria brachialis subiecta* (d). *Spurium* porro aneurysma dividitur in *diffusum*, & in *circumscriptum*. Illud est, quando sanguis effusus latius per *cellularia spatia* vagatur; hoc vero quando sanguis e *cellulari textu*, aut *membrana aponeuretica* incumbente ita coercetur, uti in angustiore loco consistat (e). Subdividitur quoque *spurium* a cl. FOUBERTIO in *primitivum*, & *consecutivum*; quorum alterum innox postarteriæ læsionem oritur, alterum vero post aliquot dierum spatium ab ejusdem læsione consequitur (f).

Additum quartum est, varicosum dictum.

Divisio spuriorum in diffusa, & circumscripta ab HUNTERO facta.

Subdivisio in primitivum & consecutivum ex FOUBERTIO.

(a) PLATNERUS *Instit. chirurg.* §§. 420. 21. (†).

(b) L.c. (c) WHITT, & THOM. ARMIGER. *Comm. Lipsf. T. XVIII. P. III. p. 408.*, & FOUBERT. *Mem. de l'acad. roy. de chirurg. T. II. p. 535.*

(d) *Comm. Lipsiens. l. c.*

(e) HUNTERUS *l. c.*

HUNTERI error notatus.

(f) L.c. (†) AETIUS distinxit jam aneurysmata in *vera*, & *spuria*; & fallitur cl. HUNTERUS, cum ejus distinctionis auctorem facit PAULUM ÆGINETAM, qui floruit seculo viii. christianæ salutis.

§. CCLXXXIII.

Aneurysmatum vero distinctione in *vera*, & *spuria* probare tunc tantum videtur LIEUTAUDIUS (a); cum exteriores ea occupant partes. Quod sane de reliquis aliis etiam subtilioribus divisionibus dici posset. Non tamen absurdum est, quodlibet genus (§§. CCLXXXI. CCLXXXII.) ubique

Distinctio prima de veris, & spuris LIEUTAUDIO arripit tantum de externis.

Utrum-
que ge-
nus tam
intus,
quam ex-
tra possi-
bile est.
Verum
aneurys-
ma cre-
brius in-
tu, &
spurium
extra est.

que oriri posse; & si qua difficultas est, totam in iis distincte dignoscendis, quoniam intrinsecus sita sæpe omnem oculorum & manuum inquisitionem effugiunt, positam esse arbitramur. A vero tamen fortasse non abest, *aneurysma verum* frequentius *interioribus*, *spurium exterioribus* in partibus; ac præcipue in *artubus* deprehendi, quemadmodum PLATNERUS (b) rectissime monet.

(a) *Precis de medicine lib. I. p. 146.*

(b) *L. c. §. 422. Exemplum spurii aneurysmatis interiorum partium vide apud TABARRANIUM observ. anat. n. VIII. pag. 16.*

§. CCLXXXIV.

Qualis,
& quotu-
plex vi-
tium ar-
teriarum
aneurys-
ma.

Idem vi-
tium ve-
nis quo-
que com-
mune; &
quotu-
plex.

Varices.
Ecchy-
moses,
vel su-
gillationes.

Ex his in universum expositis, quid sit *aneurysma*, quisque intelligit. Est autem vel *arteria* præter naturam alicubi in *tumorem dilatata* atque expansa; vel *tumor* in circumpositis partibus ab *eadem rupta*, aut *incisa*; & sanguinem effundente ortus; vel utriusque mali complicatio. Veni quoque ejusmodi vitium commune est. Hinc enim vel propriam ac naturalem figuram amittunt, & ampliorem capacitatem acquirunt; vel ruptæ, aut discissæ in cellulas circumpositas aliquid sanguinis effundunt. Illud nomine *varicis*, hoc *ecchymoseos*, sive *sugillationis* proprie distinguitur. Non enim eorum nos auctoritate movemur, qui uno *aneurysmatis* vocabulo utraque & *venarum*, & *arteriarum* mala complectuntur.

§. CCLXXXV.

De his itaque vitiis tam *aneurysmaticis*, quam *varicosis*, non quidem universis, & quibusque; sed de iis dumtaxat, quæ speciatim in præcordiis fiunt, mox differemus, *præcordiorum spatium* latius quam moris est ad CORNELII CELSI exemplum extendentes (a); eo quidem consilio, ut universa fere *aorta*, in quam crebrius *aneurysmata* cadunt, & *vena cava*, quæ *varicibus* corripitur, in eodem spatio commode etiam comprehendendi possint. Antequam vero progrediamur, aliquid de ea peculiari divisione, qua in recensendis *præcordiorum aneurysmatibus* usus est cl. LANCISIUS, præmonere convenit. Hæc & ipse in *vera* sive *legitima*, atque in *notha* sive *spuria* quidem distinxit, sed alia prorsus significatione, quam ejusmodi voces a chirurgis, medicisque (quod supra exposuimus) accipi soleant. *Legitima* enim ei dicuntur tam quæ a laxato arteriarum textu, quam quæ ab earum soluta continuitate procedunt. Contra *spuria*, quæ ab initio non villorum fibrarumque arterias contextentium debilitas, laxitas, aut solutio effecit, sed adausus sanguinis impetus, cui ferendo sine divulsione non valeat naturalis communisque arteriarum firmatis, sive resistendi vis; itaut in his relaxatio, aut ruptio villorum vel tunicarum tanquam affectus consequatur, minime vero aneurysmati primam causam præbeat, sicque in *vera* facile transmutentur (b). Scire etiam interest, *aneurysmata*, quæ *vera* a LANCISIO appellantur, *passiva* a SAUVAGESIO, & quæ *spuria* ab illo, ab hoc *activa* (c) nominari.

Hic agitur de iis tantum, quæ in præcordiis fiunt. Præcordiorum spatium cur ad totam ferat aortam, & venam cavam extendatur.

Divisio LANCISII.

Quæ ei vera sunt. Quanam spuria?

Divisio SAUVAGESII.

(a) *Lib. II. cap. 3. lib. IV. cap. 1. & 8. lib. V. cap. 26.*

(b) *De aneurysmat. in gener. lib. I. propos. V.*

(c) *Nosolog. method. T. I. class. I. ord. V. gener. 2.*

CCLXXXVI.

In duo genera rectius distinguuntur aneurysmata arteriarum; idest non saccata, & saccata.

Pace vero cl. LANCISII, alioquin optimi de hisce morbi scriptoris; *aneurysmata* sive *arteriarum dilatationes*, quibus præcordia obnoxia sunt, in duo potissimum genera distribui possunt, quæcumque fuerit eorum origo; eorum, nimirum; in quibus arteria in quamlibet partem ultra naturæ limites expanditur, ac eorum, quæ arteriæ pars aliqua e *vasis latere* sacci instar protuberans excrescensque format. Vix enim ullum *interiorum partium aneurysma* est, a quo alterutra hujusmodi dilatatio abesse possit. Atque hujus aneurysmatum divisionis in *sacciformia* nimirum, & non *sacciformia* (*) auctor est cl. MORGAGNIUS (a). quem postea secuti sunt SCHREIBERUS (b). VELCERENGHIUS (c), alique. Ast præter arterias *cor* etiam multiplici ratione dilatari potest: cujus *dilatationes* quid vetat eodem *aneurismatis* numine cum BELLONIO (d), LANCISIO (e); aliisque bene multis hodie vocare; easque pariter, *sacciformes*, & non *sacciformes* dispescere.

Cor etiam iisdem dilatationibus obnoxium.

(*) Non *sacciformia* dici etiam possunt *cylindroidia* cum SAUVAGESIO.

(a) *Adversar. anatom. 2. aort. animadvers. 38., & Epist. Anat. med. XVII. n. 27.*

(b) *Act. erudit. lips. ann. 1731. mens. aug. pag. 377. 378.* (c) *De aneurysm. observ. I.*

(d) *Consil. 109.*

(e) *L. c. proposit. II.*

§. CCLXXXVII.

Cor autem, ut ab hoc exordiamur; modo totum, modo aliqua sui parte tantum *dilatatur*, aliisque etiam vitiis (puta *polyris*, *sarcomatibus*, *tumoribus* variis. itemque *erosione* exterioris ambitus) una simul non raro subjicitur. Exempla cordis universi mole aucti, & præter modum dilatati frequentissima extant apud auctores (*). Interdum cum summa *parietum* ejus *extenuatione* aut *flacciditate* dilatatio conjungitur: interdum cum dilatatione *cavearum* omnium *parietum* *crassitier*, ac *spissitudo*, firmitasque augetur; interdum *moles* tantum ipsa videtur aucta, quin tamen justo major *cavearum* amplitudo dici possit. Quandoque etiam *arteria*, & *vena coronaria aneurysmatica*, & *varicose* in eo cernuntur. Ita vero sæpe extenditur, ut *juvenci cor*, aut *caput majusculum*, aut *ter quaterve naturalem magnitudinem* aequet: superetve (a).

Cordis dilatatio vel sola, vel cum aliis vitiis copulata.

Varia dilatationum cordis ratio, & natura.

(*) Primi, qui ea notaverint, sunt NICOLAUS MASSA anno 1534. in *lib. introduc. anatam.* c. 28., VESSALIUS *De human. corpor. fabric.* lib. I. c. 5. CAROLUS STEPHANUS *De diff. part. corp. hum.* lib. II. cap. 33.! BALLONIUS *Epidem.* l. II. in *constitut. autumn.* ann. 1573., ANDREAS LAURENTIUS *Hist. anat. corp. hum.* lib. IX. *quest.* 18. Qui alias hujusmodi historias desiderat, legat etiam BONETUM *Sepulchret. anatom.*; SCHENKIUM *Pratyrisæon*, sive *observ. d. merar.* 196., LANCISIUM *De motu cord.* & *aneurys.*, KINPS MACOPPE *De aort. polyp.*, MORGAGNIUM *De sed. & causis morbor. per. anatom. indug.*, SENACIUM *Traite du coeur*, PASTAM *De cord. polyp. in dub. revocat.*, VALCARENGHIUM *De aort. aneurys. observ.* 3.. MATANIUM *De aneurysm. præcord. vitiis*, SWIETENIUM

Auctores, qui de cordis mole aucta exempla referunt.

Comment. in Boerhaav. aphor. de cogn. & curand. morb., LIBUTAUDIUM *Hist. anat. med.*, HAENIUM *Ratio medendi*, & ibi non cordis tantum, verum, etiam aorta, venæ cavæ, aliorumque vasorum dilatationum exempla inveniet.

(a) NICOLAUS MASSA, & BALLONIUS *loc. citatis*.

§. CCLXXXVIII.

*Modo
quadam
cordis
partes
modo plu-
res dila-
tantur.*

Quandoque autem aliquæ tantum cordis partes, aut una vel altera singillatim in immensam molem explicantur. In primis *dextra cordis auricula* huic vitio obnoxia est, ut modo *dimidiatum*; modo *integrum cor*, modo *caput infantis recens nati* magnitudine referat: Dilatatur quoque *dexter ejus ventriculus*, sicuti etiam *sinister*, ejusdemque lateris *auricula*, & ita quippe, ut interdum disruptionis periculum immineat, immo disruptio ipsa sequatur. *Sinistri vero ven-*

*An plus
dextera
quam si-
nistra
partes
laborent?*

triculi dilatationes plures vidit LANCISIUS, item MORGAGNIUS, quam *dextri auricula* vero *sinistræ* rariores, quam *dextra* (a). At SWIETENIUS contrarium docet (b) Interdum *dextera*, interdum *sinistra* solum *cavæ* interdum *utrinque* una *simul* ampliantur, ut apud observationum anatomico medicarum scriptores videre est.

(a) *Epist. anat. med. XVIII. num. 5.* (b) §. 176.

§. CCLXXXIX.

*Quanam
ex arte-
riis ane-
urysmate
afficiun-
tur?*

Ex arteriis porro; quæ in præcordiis locantur, præcipuè aneurysmate efficiuntur *arteria pulmonaris*; *bronchialis*; *aorta* tam in suo initio atque *arcu* quam in *trunco* *descendente*; *subclavia*; *carotides*;

tides; axillares; calica; hepatica; splenica; mesenterica; emulgentes; iliace; earumque rami.

Sed frequentius reliquis *aortæ curvatura*, quod & proximior cordis actioni sit, & totum sanguinis impetum arcu suo recipiat. Sæpe *arteriarum aneurysmata* ut ab acri humore ibi deposito, aut acri ex stagnatione facto intus eroduntur, & sanguinem in pericardium, in pectoris cavum, aut alia proxima loca tam lacerata ac erosa; quam rupta effundunt. Inter pocula, & jocos *arteriam pulmonarem diffractam* MATANIUS (a); *erosam, & sanguinem in pericardium evomentem* TABARRANIUS (b); *aortam prope cor ruptam* MORGAGNIUS (c); & ob *molem adauctam* a cordis basi secedere incipientem MERYUS (d) viderunt. *Bronchiale* eodem vitio affectam in quodam cursore repente denato conspexit cl. LEPROTTUS (e).

Quenam frequentius?

Unde frequens erosio, earumque disruptio?

Exemplum arteriarum pulmonari, aorta, bronchialis aneurysmate affectarum, & disruptarum.

Interdum intus ossæ evadunt, aut ossibus squamis obducuntur. Ex *aorta in aneurysma dilatata*,

& hic illic *ossea* obiit WEPFERUS (f). *Aortam cum aneurysmate tres digitos lato indurata*, ac

Interdum ossæ, aut squamæ

ossibus intus *lamis* obsitam refert MORGAGNIUS (g), VALSALVA (h); & *crusta ossea* inductam ac ALBERTINIUS (i). De *monstruosissimo* tribus digitis

multis ossibus, obductæ evadunt. Exemplum ex observationibus ecl.

supra cor aneurysmate cum interiore *aortæ tunica*

erosa mentionem facit RUYSCIUS (k), alique

multi commemorant, quod in primis huc venerea

virorum.

laborantibus non infrequenter accidit: Haud raro

Interdum

aortæ aneurysma œsophagum, & hac dilatata

aorta aneurysma

œsophagum, *tracheamque* comprimente meminit

œsophagum &

RAMAZZINIUS (l); ac de alia, quæ *œsophago* ita

tracheam

adhærebat, ut eo *eroso* in ventriculum post *aneu-*

latis.

rysmatis ruptionem sanguis descenderit, MATA-

NIUS (m). Prope cor sæpe ita dilatatur, ut in-

immensam molem excreseat. *Orificium* ejus adeo

Sæpe in amplium in corde aneurysmatico olim LAURENTIUS, & nuper PASCHELIS FERRARIA observatum pe cor ex-crefci. memorat, ut *brachium* admitteret (n).

(a) *De præcordior. morb.* p. 120.

(b) *Observat. anat.* n. 8.

(c) *Epist. anat. med.* XVII. n. 28.

(d) *Hist. acad. Parisien. anni* 1716. p. 51.

(e) *Comm. acad. Bon.* vol. I. p. 345.

(f) HAENIUS ex ejus vita in *rat. med.* P. IV. pag. 15.

(g) *Epist. cit.* n. 17.

(h) MORGAGNIUS *ibid.* n. 23.

(i) *Comment. acad. bonon.* T. I. pag. 402.

(k) *Observ. chirurg.* n. 38.

(l) MORGAGNIUS *Epist.* XVIII. n. 17.

(m) *De aneurysm. præcord. morbis* pag. 120.

(n) *Delle morti e malattie subitanee* p. 89.

§. CCXC.

Dæmna ab aneurysmaticis aliis remotis, & solidis partibus illata. Interdum etiam *aneurysmata* ad varias diffitas regiones producuntur; ossa opposita diffringunt, cartilaginea solvunt; omnia carie pessumdant. *Sacrum cum aneurysmaticum hedinum caput* superantem ovalis figuræ in dextro arteriæ magnæ latere, antequam hæc commune principium subclaviæ, & carotidi dextræ præberet, cum dextræ claviculæ ruptura, carie, & quatuor primarum costarum, qua diu cartilagineæ esse solent, corruptione, describit MORGAGNIUS (a), & ante cum VETERUS (b), SCHREIBERUS (c), & FLECHIIUS (d). *Aneurysma sacciforme circumferentiam* XXI. $\frac{3}{4}$ pollicum *rhenholland.* habens, x. $\frac{1}{4}$ latum altumque inter secundam, & tertiam costam veram ex anteriore dextra aortæ parte enatum, ac in dextro thoracis latere extrorsum protuberans; sinistrorsum vero

vero ultra sternum extensum, a clavicula duo
 rum digitorum latitudine distans; inferius ad pa-
 pillam usque dextram protensum, ac intus ad si-
 nistrum usque cordis ventriculum expansum, san-
 guineque polyposo plenum (unde pulsus debiles,
 & parvi in ægro fuerant) refertur ab EDUARDO,
 SANDIFORTIO (e). Aliud *sacciforme* in latere dex-
 tro *arcus aortæ* post magnam vocis; corporis con-
 tentionem ortum legitur in *miscellaneous varia lit-*
teraturæ Lucæ editis (f); quod sic protuberabat
 dextrorsum, ut inter secundam, & quartam co-
 stam, tertia penitus comminuta, ad ovi anserini
 magnitudinem erumperet. Nec dissimile fuit il-
 lud, quod ab *arcu aortæ* inter secundam, &
 tertiam costam, itemque inter tertiam, & quar-
 tam sibi viam paraverat, duplicemque tumorem
 extrosum attollebat, visum a MORANDIO
 (g). — Memoratu quoque dignum est; quod
 in curvatura magnæ arteriæ ab enormi quatuor
 dierum vomitu ortum jam prodidit in lucem LIT-
 TREUS (h). Hoc media sui parte occupabat tho-
 racem, superiore ad collum usque ferebatur, immo
 ad ipsam inferiorem mandibulam ascendebat. Cl.
 MORGAGNIUS narrat quoque in viro ludo pilæ li-
 gnæ, & vini largiori potui dedito anteriorem *ar-*
cus aortæ parietem in magnum se expandisse *aneu-*
ryisma, quod summum os sterni, huicque insiden-
 tia clavicularum extrema, & proximas costas par-
 tim absumperat, partim carie vitiaverat, & su-
 prema ex parte sterni sub furunculi specie proru-
 perat (i). Ex gravissimo terrore *aneuryisma aortæ*
 in homine quinquagenario excitatum, & cum
 spirandi difficultate, febre, sinistri pulsus abolitio-
 ne conjunctum, tuberculumque supra sinistram
 claviculam ovo columbino magnitudine exhibens,

dextra
aorta
parte ad
thoracis
usque la-
tus dex-
trum, &
ultra
sternum.
 III. Item
arcus a-
orta sac-
cus com-
minuta 3.
costa ex-
tra pro-
tuberant.
 IV. Aliud
arcus a-
orta cum
duplici
externo
tumore.
 V. Cur-
vatura
arteria
magna a
medio
thorace
ad infe-
riorem
mandibu-
lam.
 VI. Aliud
arcus a-
orta cum
carie &
consum-
ptione os-
sium ster-
nis, cla-
vicula-
rum, &
costarum.
 VII. Aor-
te supra
clavicu-
lam sini-
stram ex-
hibens
tubercu-
lum insi-
gens.

VIII. memoriae prodidit GUTTANIUS (k). In dorso circa vertebrae in pratricio viro aortae aneurysma in tumorem protuberans ex VERSALIO descripsit ALBERTINIUS (l). Exempli vero aneurysmatum subclaviarum, carotidum, auxillarium, bronchialis arteriae aortae descendens, celiacae, splenicæ, hepaticæ, aliarumque videatur apud ccl. VALSALVAM, MORGAGNIUM, NENCIUM, BEAUSSIERUM, FANTONIUM, LEPROTTUM, HALLERUM, LANCIUSIUM, HISTORIAM ACADEMIÆ PARISIÆ, BOUCHERUM, BANDERIUM, MATANIUM, TABARRANIUM, aliosque non paucos.

(a) Epist. anat. med. XVIII. n. 25.

(b) Ephemerid. N. C. accad. III. n. IX. obser. 162.

(c) Nov. comment. accad. scientiar. petropolit. T. III. physic. n. 4.

(d) Ephemerid. nat. curios. centr. V. observ. 74.

(e) Nova acta phys. med. N. C. T. IV. p. 21.

(f) T. II. p. 184. (g) Mem. de l'acad. des scienc.

(h) Histoir. de l'acad. roy. de Paris ann. 1707.

(i) Epist. anatom. medic. XXVI. n. 9.

(k) De aneurysmat. intern.

(l) Comm. instit. sc. & ar. bonon. vol. I. p. 402. & seqq.

§. CCXCI.

varicet
venarum
præcor-
diorum. Vena demum intra præcordia varicibus patent, sed ex his in primis vena cava, pulmonaris. Earum quoque exempla crebro occurrunt apud laudatos scriptores. Dilatationis ingentis vena cava cum corde maximo, & supra diaphragma prolapsa meminerunt Miscellanea N. C. Tom. V. decad. I. observ. XL.; item vena cava; nec non auricula

cula dextra amplioris, sanguinisque turgentis, in homine annorum LIV. subita morte extincto repertæ LANCISIUS (a); ut MORGAGNIUM, ALBERTINIUM, aliosque plures preteream *Venam* porro *pulmonarem* dilatatam commemorat PARÆUS, memorantque post eum alii quamplures. Hoc pariter vitio non vacat ipsa vena *azygos*. Ejus enim truncum immaniter dilatatum ad palmi longitudinem, ut etiam post ruptionem, quæ circa medium longitudinis contigit, venæ cavæ latitudinem simularet, invenit phthisico (b) HERACLITUS MANFREDIUS (c). Sed notatu digna omnino est observatio PORTALII (d), quæ docet in cadavere hypochondriaci, qui suppressis hæmorrhoidibus in lentam febrem inciderat, & ea extinctus est, *venam portam* adeo dilatatam, ut intestini faciem præferret, cum hepate prægrandi, & scirrhuso inventam esse (*).

Vena pulmonaris.

Truncus Azygæ immaniter dilatatus.

Vena portæ dilatatio intestinum referens.

(a) *De subitan. mort. observ. I. p. 243., & observ. IV. p. 281.*

(b) *Oper. lib. IV. cap. 32.*

(c) MORGAGN. *Epist. anat. m. XXVI. n. 29.*

(d) *Histor. anat. med. T. I. p. 125.*

(*) Vasa etiam breviora varicibus obnoxia sunt. Id patet ex observationibus, & ex illa potissimum, quam habet COLUMBUS *de re anatom. lib. XVI. p. 492.* In Cardinali CIBO vena, quæ a liene ad os ventriculi tendit, insignis magnitudinis erat; quæ disrupta ventriculum; & intestina sanguine replevit, & mortem intulit; licet dum viveret, vomitu, & secessu aliquot sanguinis libras rejecerit. Huic sectioni adfuit BRASAVOLA. *Ex sch. auct.*

Observatio COLUMBI anatomica.

§. CCXCII.

Causa Jam vero ad causarum recensionem, quibus
utriusque hæc vitia originem debent, veniamus. Harum
vitæ tam itaque quædam cor ipsum, vel aliquis ejus par-
aneurys- tes, vel venam cavam, & pulmonarem, vel ar-
matici, teriam ejusdem nominis dilatant; quædam cum
quam cordi, tum aortæ in aneurysma diducendis aptif-
varicosi. simæ esse consueverunt. Ad primum genus ple-
Primum ræque causæ pertinent, quas cordis palpitacionem
genus inferre, supra (§§. CCXLII. CCXLIII. CCXLIV.)
caussa- tradidimus. In primis videntur huc spectare, ut
rum, qua observationes anatomicæ docuerunt, aortæ angu-
dilata- stia (*), aut ejus initium osseum, valvulæ semi-
tionem lunares osseæ; angustia pariter, aut induratio ar-
proxime teriæ pulmonaris; valvularum ejus ad latera ad-
inferunt. pressio; tumores quicumque egressum sanguinis
 aliquomodo e corde impediētes; exterior cordis
 erosio; vomendi conatus repetit, & diu conti-
 nuati. Nec desunt, qui aerem quoque in cordis
 thalamis evolutum, & expansum his addiderint.

Aneurys- (*) Aneurysma cordis ab angustia aortæ, &
mata ex valvulis induratis natum refertur a MECKELIO
angustia Tom. VI. Memoir. de l'academ. roy. de Berlin. A-
coræ. 1750., & a MORGAGNIO epist. anat. med. XVIII.
 n. 2., & n. 6.

Novi & ego puellam annorum sexdecim, quæ a-
 neurysmate ex angustia aortæ laborans, usque a te-
 neris unguiculis obnoxia fuit universi corporis tre-
 moribus; magnis anxietatibus, palpitationi cordis,
 nec non pulsuum irregularitati. Tempore, quo ejus
 menstrua fluebant, omnia symptomata augebantur,
 immo venæ sectione, vel purgantium usu ea incre-
 scere vidi. Demum syncope superveniens vitæ fi-
 nem imposuit. Ex auct.

§. CCXCIII.

§. CCXCIII.

Ad alterum genus referuntur nativa, & acqui- ^{Causse} sita fibrarum cordis, aut arteriarum debilitas & ^{secundi} laxitas; item nimia rigiditas (*); motus ve- ^{generis.} mentiores; insignes nifus, conatusque thoracis, ut tubarum, aut fistularum inflatio, ars cisiarii, rhedarii, bajuli, cursoris, saltatoris; cantus effusus, tussis valida, & diu protracta; animi pathemata (*) (præsertim ira diu, violenterque compressa); mœror; terror subitus, ac ingens, ictus (**); lapsus; gestatio; vulnera; polypus mercuriarum remediorum usus (a); interioris tunicæ arteriarum exulceratio, aut exterioris consumptio (b); sanguinis boni nimia copia, etsi hæc raro per se sola sufficiat; cacochymia; hæreditaria labes (c); lues venerea; hypochondriacæ, hysteriæ, rheumaticæ catarrhales, hæmoptoiæ, herpeticæ affectiones; ac demum largior ciborum, ac vici ingurgitatio. Hanc vero tanti facit LAN- LANCII opi-
sius, ut ex centum aneurysmatis sponte natis nio æe
quingenta saltem inde progenita ipse asseve- frequen-
ret. Cor item mole auctum *aneurysmatibus ar-* tiori
teriæ pulmonaris, aut *aortæ* causam præbet; quod causse
validius sanguinem trudens in eas, alterutram, proegre-
aut utramque urgeat, distrahat, divellat, sensim-
que amplificet, necesse est.

(*) *Aneurismata in aorta a rigiditate hac pro-* HALLE-
fifici videntur, quod in infantibus nunquam, in RI opi-
junioribus rarissime, in senibus frequentissime hic nio.
morbis oriatur ex disrupta a sanguinis ictu exte-
riore tunica. HALLER. *Opusc. patholog. observ.* XX.

(**) Ab hujusmodi principio celebris ALBERTI- ALBER-
NIUS causam deduxit, ob quam non infrequens in TINII
hemi- doctrina.

hominibus, rarum vero in brutis hoc vitium occurrat (*T. I. Comment. instit. scient. & art. bononien.*). Quod spectat ad hanc causam, scire licet ex ea, si pathemata subita, mixta, & pugnancia, ac vehementia sint, sepæ quasi extemplo *aneurysmata* nasci; *vitia* vero *varicosa* ex simplicibus, diuturnis, & gravibus animi curis plerumque lento passu suboriri.

(***) Videantur exempla apud LANCISIUM *l. c. propos. 21.*, SWIETENIUM *Comm. in BOERHAAV. aphor. 176.*, VALCARENGHIUM *Observ. II.*, HÆNIUM *Rat. med. P. IV. c. 2.*, aliosque.

observa-
tiones.

(a) ALBERTINIUS *l. c.*

(b) HALLER. *Prim. lin. n. 34.*

(c) LANCISIUS *De aneurysmat. in gen. propos. 47.*. ALBERTIN. *lib. cit. n. 65.* Uterque observavit, *aneurysmatica vitia cordis*, & *adnexarum partium* eadem omnino a proavo, & avo, & parente in liberos perniciose hæreditate descendisse. *Ex sch. auct.*

Diagnosis.

§. CCXCIV.

Ardua
& diffi-
cilis est.

Singula hæc vitia (§§. CCLXXXVIII. CCLXXXIX. CCXC. CCXCI.), variasque causas (§§. CCXCII. CCXCIII.), unde dimanarint; internoscere res sane complicatissima est. Ut vero minus difficultatis quærenti, indaganti- que occurrat, cum cl. ALBERTINIO notandum est

Ut lis
methodus
ALBER-
TINII,
ut faci-
lior fiat.

(a), in præcordiorum vitiis, præter alia signa mox afferenda, applicata ad thoracem, vel ad eum locum in quo morbus latitat manu, motum quemdam insuetum vel cum pulsatione, vel sine ea percipi, vel etiam nullum. Plerumque motus, qui conjunctam habent insolitam, diu durantem, & cum vibrationem, istoque micantem *pulsationem*, percipitur in sin-

plici

plici dilatatione aneurysmatica aut cordis totius, aut auriculæ, aut ventriculi sinistri, aut aortæ, aut subclaviarum, carotidum, auxillarium, aut aliarum ab aorta descendente prodeuntium articularum. Qui vero sine ejusmodi pulsatione motus est, aut fere nullus, ac insensibilis esse videtur, conjungi ut plurimum solet cum dilatationibus caudicis venæ cavæ, aut auriculæ, aut ventriculi dextri (*); aut arteriæ, aut venæ pulmonaris; aut arteriæ bronchialis, aut venarum subclaviarum, jugularumque. Utilissima sane ast clinico ejusmodi observatio motus vel præsentis, vel absentis in hisce morbis; quanquam ea non ita certa constantique lege innititur, ut pluribus de causis, dilatationum nimirum gradu, figura, magnitudine, situs varietate, complicatione, temporis, aliarumque rerum ratione variari interdum quammaxime non possit.

Quoniam pulsatio aneurysmaticæ dilatationis cordis, aliarumque partium?

Quando minor, aut valde insensibilis evadit?

Quandoque varietatibus obnoxia hujusmodi leges sunt.

(a) *Comment. instit. scient. & art. bononien. T. I. p. 83. De difficili respiratione vitiis. Inter opuscula.*
 (*) Laudatus ALBERTINIUS dextri cordis ventriculi dilatationem refert ad vitia, quæ vocat ipse varicosa, quia motum inducit fere insensibilem, & quasi sine ulla pulsatione. At BURGLAVIUS (*Act. academ. natur. cur. Vol. X. A. 1753. edit. Norimb. p. 140., & Vol. IV. P. IV. p. 634. Comm. Lips.*) docet, in dextri cordis ventriculi aneurysmate ictum cordis non omnem sub læva papilla, sed sub sterno, & in dextro etiam thoracis latere percipi. Quinam, quæso, major fides adhibenda? ALBERTIUS solam experientiam consulit, quæ veracior est. BURGRAVIUS vero videtur ad loci rationem respexisse. At pulsatio non a cordis aucta capacitæ, verum ab ejus valida contractione videtur repetenda. An hæc major in dextro cordis ventriculo dilatato? an dexter ventriculus dextra

An hæc ALBERTINII doctrina a BURGRAVIO exceptione infirmetur?

in parte residet, aut in posteriore? Non videtur. Fortasse itaque plus justo verosimilitudini indulgit. Id etiam ex eo patet, quod ultro ipse fatetur, interdum *non ventriculū dextrum aneurysmaticum* inventum esse, ubi *dextrorsum pulsatio* percipiebatur, sed ipsum *aortæ arcum dextrorsum distentum*. Ex sched. Auth.

§. CCXCV.

Si pulsationis motus minus sensibilis sit, quid & diligenti observatore præstandum est?

At ubi pulsatio non valida admodum est, sed modica, aut longe minor, quam vitii magnitudo ferat, aut loci conditio eam quodammodo minus sensibilem reddat manui, altius etiam digiti ad jugulum juxta trachææ latera, & sub claviculas adigendi sunt, eodemque tempore intentis oculis carotidum motus, aut venarum jugularum undulationes accurate lustrentur; idque pluries, ac in primis a pastu, a motu, a scalarum ascensu iterandum, ut medici diligentiam non effugiat. Modica enim, & longe minor pulsatio, immo interdum nulla est, ubi cor, licet aneurysmaticum; a basi ultra ejus medietatem durius, ac quasi tendineum, aut flaccidum nimis evaserit, vel ubi parietes dilatatae arteriæ præter modum crassiores redditi; aut oblongum, & quasi fornicatum concreti, & polyposi sanguinis aggerem intra se nacti; aut cartilaginea, osseave intrinsecus tunica fuerint omnino obducti. Quod postremum ubi incidit cognosci poterit, si pulsatio olim præcesserit; diu persisterit, paullatim deinde elanguerit, & melius inde ager habuerit. Quando vero sine hac causa pulsatio, & pulsus obscuriores evadunt, tunc vires deficere, mortemque appropinquare perspicuum est.

Quanam vitia cordis pulsationem obscuriorē, aut minimam reddunt quandoque?

Quando a pulsatione imminere mortem dignoscitur.

§. CCXCVI.

Præterea sedulo inquirendum est, an motus manu perceptus a naturali recedat, nec ne, & quali quantoque recessu? An in propria cordis sede, an in vicina videatur; An pulsans pars naturalem, fervet molem, & magnitudinem, aut ampliore exhibeat? arduum est distinguere pulsationem cordis a pulsatione *aneurysmatis* prope cor positi, nisi hæc omnia diligenti studio excutiat. Si extra pectus morbi sedes fuerit, ubi costæ impedimento manui esse non possunt, probe considerare oportet, num diametros arteriæ aucta revera sit, quod facile anatomes peritus perspiciet; an vero secundum naturam? Si enim aorta, aut cœliaca valide, & crebro pulset, idque fiat sine ullo ejus diametri augmento, indicium erit, *aneurysma* abesse.

Quædam alia præmittenda, & consideranda, ut pulsatio aneurysmatica a reliquis pulsationibus, ejusque differentia & gradus distinguantur possint.

§. CCXCII.

His (§§. CCXCIV. CCXCV. CCXCVI.) accuratissime indagatis, observatisque vel signa alterutrum vitii genus indicantia inveniuntur, vel nulla. Si aliqua, confirmari; si nulla, suppleri possunt aliis, quæ aliunde petuntur: nimirum e respirationis læsione; pulsu; e sensu aliquo aut ponderis, aut cujusdam constrictionis, aut levis doloris regionem cordis subinde infestante (præsertim si cordis inordinatus motus præcesserit, aut una concurrerit); e decubitu & somno in utrovis latere, potissimum sinistro, non facili; e somni, in primis inter ejus initia, interruptione, & levi aliquando se movendi necessitate. Respi-

Signa, quæ in præcedentium subsidium peti possunt. Unde pendenda?

Respirationis læsio pro variis morbi gradibus.

ratio autem morbo incipiente, vel paullo post ejus initium non læditur nisi post motum concitatio- rem, aut modice tantum læditur, ac inter somnum plerumque primum aliquam permutandi lateris, aut residendi necessitatem inducit: inva- lescente verò, respirationis læsio & ipsa incre- scit, immo sæpius, levio- re ex causa aggreditur.

Qui re-
spiratio
ab his vi-
tiis læ-
datur?

Aneurysmata enim sive cordis, sive aortæ, aut alterius cujusque arteriæ intra thoracem, pulmo- nes mole comprimunt, sanguinis per eos motum pervertunt, & sæpe diaphragma ipsum prægravant, sicque respirationis liberæ actioni officiunt (a).

Quæ fi-
gura a
pulsu pe-
tenda?

Aortæ quoque, ubi sinistrum bronchiorum ramum amplectitur, aneurysmatica dilatatio sic ramum illum, qui etiam natura angustior est, compri- mit, ut per eum inspiratio fieri nequeat (b). Pulsus ipse pluribus modis a naturali ægrotantis habitudine deflectens magnitudine, vel parvitate, tensione, vel mollitie, vel vibratione, vel fre- quentia, vel inæqualitate, vel intermissione, vel alia quacumque ratione; si cum constantia talis

Animad-
versi nes
circa hæc
i c. mo-
tum &
pulsatio-
nem cor-
dis, re-
spiratio-
nem, &
pulsus,
ad erro-
rem in
diagnosi
vitian-
dum.

sit, sive in utroque carpo, sive in alterutro (ut sæpe solet), poterit diagnoseos obscuritati non parum lucis afferre; dummodo ad ea animus ad- vertatur, quæ de *asphyxia*, *pulsu exili*, & *parvo*, atque *intermittente* proposita sunt (cap. VIII. *hujus de morbis pectoris volum.*). Non tamen omnis motus cordis inconditus, aut pulsus, & respirationis læsio statim vitia præcordiorum signi- ficat, ut alibi sapius præceptum est. Id satis evin- cunt affectiones *hypochondriacæ*, & *hystericæ*; *chlorosis*; naturalis amplioris cordis vis; aut pec- toris angustior capacitas; aut utraque simul jun- cta; aut fervida ætas, ac temperies; aut pulsus ab ipsa natura inæqualis, vel intermittentes, præ-
fertim

fertim in pueris; in senibus, in podagra confirmata affectis, aut podagra imminente, in quibus si febris superveniat, naturalis evadere solet; sicut a naturali in febribus mali moris absque ullo organico vitio in intermittentem deflectit.

(a) MORGAGNIUS *epist. A. M. XVII. n. I.*

(b) PORTALIUS *mem. de l'academ. roy. a. 1769.*

§. CCXCVIII.

Hæc signa (§. CCXCVIII.) cum vel omnia, ^{*Signa nascentis, vel jam nati in præcordiis vitiis.*} vel plura concurrant, cum diu constanterque perseverent, & sine alio manifesto pectoris morbo sint, nos de vitiis nascentibus, vel jam natis præcordiorum monere possunt; eoque magis si dolor quasi rheumaticus, inter initia præsertim, ad superas thoracis partes, ad humeros, ac ab his ad medietatem usque unius, vel alterius brachii, vel utriusque persentiat, & maxime ad homoplatas; & si demum causæ recensitæ jam ^{*Signa in grave-scentis morbi.*} (§. CCXCIII.) non defuerint. Ingravescentibus porro ejusmodi vitiis, labefactata sanguinis crasi, & distributione, non raro ob difficilem orthopnoicamque respirationem, quæ demum accedit, vasa pulmonum alicubi turgescunt, distenduntur, immo etiam lacerantur, rumpuntur, aut erosa dehiscunt, unde sæpe in aliis sanguis per sputum prodeat, in aliis lympa, & serum; hinc tussis, congestiones; dolores pleuritici, peripneumoniæ superveniunt. His sæpe succedit, quin ^{*Quanam superveniant, vel præcedant?*} immo interdum præcedit ex retardato venosi sanguinis refluxu, aut dissiliantibus vasis lymphaticis, aut uberiore per vasa exhalantia effusa humoris copia, quam recipi per absorbentia possit, hydrops

pericardii, thoracis; abdominis; atque ex similibus causis sopor perpetuus, mentis obtenebratio, apoplectici affectus, hepatis obstructio, œdemata.

§. CCIC.

*Signa peculiaria
cujusque
vitii a-
neurys-
matici
præcor-
diorum.
Utrius-
que cor-
dis ven-
triculi a-
neurys-
maticum
notæ.
Pulsatio.*

Atque hæc de communibus *aneurysmatum* signis. Nunc ad cujusque propria concedimus. Cor itaque utroque thalamo *aneurysmaticum* si fuerit, his notis distinguitur. Manu sinistræ mamillæ admota cordis ictus non ibi tantum percipitur, sed sub sternō, & ad latera extenditur latius, quam cordis naturalis magnitudo postulat, ac ita pulsationes ejus confunduntur, ut fere ad numeros redigi nequeant. Immo id evenit, quod eveniret, si toto pectore, nimirum superne ad jugulum usque, inferne ad scrobiculum cordis, ac ad latera etiam demissiora plura quasi corda simul & sine ordine subsilirent, & quidem plus minus vehementer pro varia aneurysmatis magnitudine. Ad quemcumque corporis motum mox gravior anhelatio, & molestior cordis palpitatio præsto est (a). Præterea ægri in sinistro thoracis latere, in quo dolor vel pondus esse solet, non possunt decumbere: subinde pectoris oppressionibus, anxietatibus, orthopnœis (b), animique deliquiis licet levibus corripiuntur. Interdum commodius & spiritum ducunt, & cibos deglutiunt, corpore ad anteriora incurvato (c). Pulsus vero plerumque magnus, durus, vehemens, vibratus, ac ab initio rarus, deinde durus item; sed celerior ac inæqualior est (d). Interdum tamen naturalis (e) est, quin etiam parvus, exilis, intermittens: sed tunc extenuatio etiam cordis parietum, aut

nimia

Respirationis ratio.

*Item
pulsus
ratio.*

nimia flacciditas, aut aliud vitii genus, aut nervæ vis cum his imminutio conjungitur . Sæpe quoque accidit ; ut cor *aneurysmatum* deorsum procidat ; diaphragma , ventriculumque inferiora versus detrudat, difficilesque circa stomachi regionem molestias præcreet . Tunc cor prolabi dicitur , & *pulsatio* cordis in hypocondrio in primis sinistro , vel epigastrio sic perſentitur , ut sæpe pro *caliaca* pulsatione habeatur (f) .

Prolapsus cordis ita inferius accedit , ut pro caliaca pulsatione sumatur.

(a) BURGRÄVIUS in *act. act. acad. N. C. vol. X. ann. 1754. ed. Noorimb.*

(b) MORGAGNIUS *Epist. A. M. XVII. n. 6. 7. 8. 9.*

(c) *Idem epist. XVIII. n. 18. 19.*

(d) *Id. epist. XVII. n. 7.*

(e) *Id. ibid. n. 8. 9.* (f) *Id. ibid. n. 17. & 28., epistola item XV. n. 53.*

§. CCC.

Aorte vero *aneurysmata* si intra thoracem sita sint vel sursum , vel dextrorsum , vel sinistrorsum procul a cordis sede plerumque pulsationibus se produnt ; interdum etiam in jugulo , & temporibus , in dorso eorum pulsationes sunt manifestæ . Spirandi quoque difficultas motu ingravescit ; pulsus durus , rarus potius , & vibratus , non intermittens , nec inæqualis (nisi cum aliis vitiis copulentur) , interdum parvus , & debilis ; & facilis in utrumque latus decubitus esse consueverunt (a) . Sæpe ubi adoleverint & tracheam , & bronchia , & præcipue œsophagum comprimunt , unde & suffocatio , & pluribus in locis aliquod deglutiendi impedimentum supervenit (b) , præsertim resupinato corpore . Non raro dolores in eo latere diuturni , & gravantes divexant , qui a flatibus

Note aneurysmatum aorte .

Signa adulti morbi graviora Dolores , qui ab ægris falso flatibus tribuuntur .

bus erumpentibus levantur. Hinc ægri flatibus se torqueri, ac laborare credunt. Sed malum minime a flatibus est. *Aneurisma* potius œsophagi compressione sive flatus in ventriculo coercendo, sive spasmodum excitando sibi novam adjungit molestiam: emissis vero flatibus, vel laxato spasmo

Cur etiam morbus aliquando convulsivus videtur a grœtæti?

tandem omnia mitescunt (c). Interdum etiam aura quædam ascendens ab ægris percipitur; quare putant morbum esse *convulsivum*. Sed hæc opinio plerumque refellitur aliis signis, & potissimum anteriora versus residendi (d) necessitate.

(a) MORGAGNIUS *epist.* XVII. n. 17. & 21.

(b) *Idem ibid.* n. 25. & 26. *Epist. item* XVIII. n. 22.

(c) *Idem epist.* XVII. n. 14. 15. 16.

(d) *epist.* XVIII. n. 18.

§. CCCI.

Aneurysmatum varia diagnosi pro varietate indicationum. Quæ obscurissima est?

Prout ergo vel plura, vel pauca, vel unum, vel alterum ex his (§. CCXCV. usque ad CCC.) antecedunt, comitantur, & subsequuntur aliquod præcordiorum vitium aneurysmaticum, certior, vel incertior, vel etiam dubia erit ejusdem diagnosis: Obscurissima quoque est, ubi cordis motus, ut interdum usuvenit, fere perpetuo variatur, & lesio organica etiam extra cor ut in partibus prope ipsum positis, reperitur; ac demum ubi plura vitiorum genera, variaque ratione complicantur, sic ut propria cujusque signa discerni nequeant, nisi post cadaveris sectionem institutam.

Monitio. Qua in summo mentis acumine, & recta rerum omnium considerationem, si unquam, opus est.

CCCH.

Diametri arterie consideratio; ubi *pulsatio aneurysmatis* suspicionem movet, ubique necessaria admodum est, sed in primis ubi arteriæ manibus magis patent; uti sunt etiam eæ, quæ in imo ventre locantur. Hac enim sola observatione *aneurysma* a reliquis arteriarum vitiis feliciter distinguebat, quin unquam falleretur, expertissimus ALBERTINIUS. Cum itaque *sola pulsatio arteriarum* non statim pro *aneurysmatis* signo haberi possit, cavendum est, ne de hoc etiam incipiente suspicemur, quoties in imo ventre magna pulsatio perferriatur. Multa enim in causa esse possunt. In primis macies summa potest *aortæ descendentis*, ejusque ramorum pulsationes reddere manifestiores. Exempla vide apud BERENGARIUM (a), MARTIANUM, (b), aliosque). Item plenitudo nimia; compressio arteriarum; phlegmonosus tumor aut scirrhusus, aut quicumque alius in pancreate, mesenterio, aut alibi situs arterias comprimens; obstructions; spasmi; irritationes varii generis. Huc pertinent *aneurysmata spuria* LANCISII, quæ in sola vehementiori arteriarum pulsatione sine earum dilatatione continentur. MARGRAFFIUS (c) vidit *pulsationem* ab umbilico ad cordis usque scrobiculum pertinentem, & tantam, ut sæpe ab adstantibus audiri posset; quæ triginta & quatuor annos perduravit. Cumque suspicaretur, non ab *legitimo* arteriæ in mesenterio insigni *aneurysmate*, quia diametro vix paulo amplificata videretur, eam oriri posse; sed ab *spurio* (quod vocabat LANCISIUS), idque ob diuturnitate æstimaret insanabile; datis tandem

In suspicionem aneurysmatis arteriæ diametrum consideratione necessariissima?

Sola arteriarum magna pulsatio fallax signum.

Plures causæ pulsationis sunt, quid ad sit aneurysma. Exempla.

Aneurysmata spuria LANCISII sine dilatatione arteriæ, & cum ejus pulsatione vehementiori.

Observatio MARGRAFFII de pulsatione aortæ

ter. e me-
senterii,
sine ane-
urysma-
tis vitio.

Alia

TABAR-
RANII
maxime
pulsatio-
nis aortæ
in epiga-
strio a
scirrho
non ab
aneurys-
mate ge-
nita.

Tertio
MORGA-
GNI pa-
rentissi-
me pulsa-
tionis a-
ortæ in-
tra pe-
ctus abs-
que ulla
dilata-
tione, aut
lesione
eiusdem.

post innumera incassum ab aliis adhibita remedia nonnullis, quæ humorum saltem cruditatem corrigerent, præter omnem spem *pulsatio* hæc intra non longum tempus felicissime sublata fuit (d).

TABARRANIUS (e) sub regione epigastrica non modo *pulsationem*, sed etiam tumorem pugni magnitudine deprehendit, eamque cum ceteris *aneurysmatis legitimi* signis conjunctam. Sed ejus loco scirrhum ad mesenterii centrum tumorem sectione cadaveris detexit; qui *aortam* comprimebat, ejusque pulsationibus attollebatur. Miram habet observationem MORGAGNIUS de sutore consentientis ætatis magno vini potore, qui signa omnia *aneurysmatis aortæ* intra pectus, & præterea manifestissimam omnium a capite ad calcem *pulsationem* ostendebat; in cujus tamen cadavere nullibi inventa est arteriarum dilatatio, an interior earum conspicua labes (f).

(a) Comment. IX. super anatom. MUNDINII.

(b) VII. Epid. n. 3.

(c) Act. N. C. T. VI. observ. 131.

(d) MORGAGN. epist. XXXIX. n. 20.

(e) Observ. anat. ed 2. n. IX.

(f) Epist. anat. med. XXIV. n. 34.

§. CCCIII.

DIA-
GNOSIS

vitiorum

GENE-

RIS VA-

RICOSI

aque dif-

ficilis est.

Quenam

impedire

queant

ut pulsa-

tionis

Difficilis quoque *diagnos* videtur *vitiorum*, quæ ad *varicosum* genus spectant. Ægre enim cognoscuntur ea, quæ motum edunt pulsationis expertem, vel admodum levem, ac obscurum, egrius quæ eundem non tantum obscurum, sed etiam profundum, & confusum; ægerrime demum quæ nullum, aut vix ullum ejus vestigium exhibent. Quorum in numero sunt vitia, quæ intra peri-

car-

cardium suborta ab ipsomet pericardio vel magno-
 pere crasso, vel cordi arcte adhærente sic coer-
 centur, ut eorum motus a nobis minime perci-
 piatur. *Dilatatio caudicis vene cavae*, ac *dextrae*
cordis auriculæ, aut *omnium dextrorsum ejus ca-*
vorum, notantibus LANCISIO (a), ac ALBERTINIO
 (b), nec repugnante MORGAGNIO (c), pulsus
 habet plerumque magnum, atque æqualem. Inter-
 dum tamen etiam inæqualem fuisse, docent ob-
 servationes (d); immo *varicosum* vitium nonnulli
 docent a pulsu parvo, ac minime vibrato designa-
 ri. Sed præterea in ea cordis angustia, ac op-
 pressiones; animique defectiones ægrum excru-
 ciant, quæ non nunquam in syncopem cardiacam
 desinunt. Multa autem in causa sunt, cor hæc
 plurimum variant; pericardii nimirum firma cum
 corde cohæsiō; organica alia vitia conjuncta; di-
 versa, & morbida partium, quæ præcordiis insi-
 dent, proportio; vis cordis sive naturalis, sive
 præter naturam adscita; morbus ipse prout sim-
 plex, aut complicatus, recens, aut vetus; atque
 id genus alia. ALBERTINIUS (e) in cadavere ho-
 minis, qui ex paullo citatiore ambulatione statim
 cordis oppressionibus, animique deliquiis cum
 pulsu deficiente corripitur consueverat, invenit *osseas*
concretiones sinum falcatum occupantes, ac *auricu-*
lam cordis dextram, quæ frequenter dilatationi
 obnoxia est, *sic dilatatam*, ut *membranea* potius
 quam muscularis appareret. Alios quoque vidit,
 qui adultiore jam morbo, quasi præter ejus mo-
 rem nec e lecto surgere, nec in eodem residere
 poterant, quin cordis, spiritusque oppressionibus,
 ac animi defectu tentarentur; ideoque perpetuo
 fere decumbere cogebantur. Similia prostant ex-
 empla apud MORGAGNIUM, ac in primis notatu

motus
percipi-
tur?

In qui-
busdam
varicosis
vitiis
pulsus
plerum-
que æ-
qualis.

Inter-
dum ina-
qualis;
parvus
etiam,
nec vi-
bratus.

Deli-
quia, &
syncopes.

Cur hæc
signa va-
rient ple-
rumque?

Observa-
tiones
ALBER-
TINII.

Alia ex
MORGA-
GNIO.

digna sunt duo ; quorum alterum (f) *dextram auriculam in ingens marsupium dilatatam cum aucta cordis mole* exhibet , qua postremis vitæ diebus *orthopnoea* talis inducta fuit , ut ægerne conqueri quidem de pectoris oppressione posset , dum interea ejus pulsus *juxta naturalem rythum* se haberet ; alterum vero (g) , in quo *auriculam dextram summopere dilatatam orthopnoea* , pulsus *durus , celer , parvus , hydrops lectoris , pericardii , abdominisque* subsequutus est .

(a) *De aneurysm. lib. I.* (b) *L. c. p. 390.*

(c) *Epist. anat. med. XVIII. n. 11.*

(d) MORGAGNIUS *ibid.* (e) *L. c.*

(f) MORGAGN. *epist. XVII. n. 8. 9.*

(g) *Ibid. n. 10.*

§. CCCIV.

Signum pathognomonicam dilatationis auriculæ, & ventriculi dextri ex LANCI-SIO. LANCIUS tanquam signum *auriculæ , & ventriculi dextri præter naturam dilatati pathognomonicum* proponit *venarum jugularium* sive *pulsationem , sive fluctuationem* . Ex dilatatione enim *auriculæ , ac ventriculi cordis dextri* sequi docet , ut orificium quoque utrique interjectum , quod *valvulis tricuspidalibus munitum est ; ita dilatetur , ut , his diductis & necessario hiantibus , sanguinis portio a ventriculi constrictione per rimas earum in venam cavam repellatur ; unde venarum jugularium conspicua dilatatio , & mox , eodem ventriculo relaxato , par constrictione alterne contingant , quæ a minus cautis , ac attentis pro ca-rotidum dilatatione , & constrictione haberi possint . Sed meminisse oportet , hoc signum interdum cum sola chlorosi conjungi ; cum graviditate ; eum valvulis triangularibus non diductis , sed*

Fluctuatio , vel palpitatio jugularium est signum , quod cum aliis morbis , ac vitiis conjungitur .

tan-

tantum a sanguine in validiori cordis systole (qualis est palpitatione laborantibus) extrorsum propulsis, concussionemque in sanguinem venarum transferentibus (a); cum minori quam par sit ventriculi sinistri capacitate, aut quocumque alio obstaculo sanguinis e corde egressui opposito, effectumque suum ad dextera cordis cava exferente, & demum cum aliqua triangularium valvularum, si non omnibus, strigosa aut inflexili facta, aut cum chordulis earum erosis, disruptis, aut laxatis; unde orificium, cui dicantur, aut non satis occludant, aut si occludant, extrorsum tamen urgeri, invertique possint, & retrogradum motum in venosum sanguinem imprimere (b).

(a) HOMBERG. *Memor. de l'accadem. des scienc. ann. 1704.* Ex hac causa vidit HOMBERGIUS *palpitationem* non solum *jugularium*, verum etiam *venarum brachii*.

(b) MORGAGN. *Epist. XVIII. n. 9. 10.*

§. CCCV.

Quare ut recte signo hoc uti possimus, videndum primo est, ne forte pro *pulsatione venarum jugularium alterna* tantum quædam earum *turgentia* accipiatur, quæ validæ inspirationi, & expirationi succedit (*), aut tremulus ille motus, quem proximæ carotides vibrationibus suis interdum excitant. Deinde quærendum est, an jugularium palpitation, & concussio cum cordis angore; palpitatione, animi defectionibus, pulsu magno, atque inæquali, aliisque hujusmodi vitiorum signis (§. CCCIII.) conjungatur. Tunc enim dextrorum cordis cavorum dilationem signum hoc poterit indicare. Secus nequaquam. Cum ve-

Ratio recte attendi hujusmodi signa, ne cum aliisurgentibus, & palpitationibus confundatur.

Modus cognoscendi & pulsatione jugularium, num vitium sit in ventriculo dextro aut in dextra cordis auriculæ? ro venæ jugulares subsilire, ac pulsare vel vitio auriculæ dextræ, vel vitio dextri ventriculi possint, MORGAGNIUS modum tradit, quo utrumque distinguas. *A ventriculi dextri*, inquit, *contractione illas micare intelliges, si obtutu in his fixo, simul digitis arteriæ aut temporum, aut carpi admotis, evidenter cernas eodem temporis puncto venas se attollere, quo senties arteriam pulsare: contra evenit, si non ab hujus, sed a contractione auriculæ dextra subsiliant (a).*

(*) VALSALVA jugulares in inspiratione subsidere, attolli expiratione, MORGAGNIUS vero contrarium vidit, idest turgere in inspiratione, subsidere in expiratione. *Epist. XIX. num. 33.*

(a) *Epist. anat. med. XVIII. n. 12.*

Prognosis.

§. CCCVI.

Hæc vitia eorum remedio.

Exitiosa magis juvenibus, & robustioribus, quam senilibus, & imbecillæ ætati.

Qui ætate proximè præ ceteris sunt?

Hereditarius morbus interdum est.

Aneurysmatica, & varicosa vitia discriminis plenissima, & gravissima sunt, in primis si adoleverint, aut alia insuper mala sibi adjunxerint. Nondum enim his medicina est inventa. Univerſim juniores, & robustiores homines, si his vitiis corripiantur, celerius pereunt: ætate vero provecti, aut corpore imbecilli diutius eorum vim sustinent; item mulieres, quam viri. Cænobitæ, & moniales sæpe hisce morbis conflictantur, & diu etiam eos ferunt. Interdum malum ex hereditaria, nativæque constitutione a proavo, ab avo, ac patre in filios transfunditur. Quinque fratres ex his vitiis sublato, alios repentina; alios lenta morte abreptos, narrat ALBERTINIUS. Qui subito moriuntur, aut ex syncope, aut ex ruptis repen-

repente *aneurysmate*, aut *varice* pereunt. Inter-
dum si ruptio non statim magna sit, sed lente
sanguis ex angusto liatu effluat, ægri a ruptione
per aliquot horas supersunt, nec nisi sensim ex-
tinguuntur. Interdum etiam sine ruptione asphy-
xia, sive pulsum abolitione correpti per aliquot
adhuc dies vitam trahunt. Initio tamen leniri cer-
te, si non amoveri, possunt hujusmodi morbi,
spesque aliqua superest differendæ mortis. Immo si
nascentes, atque ex oculis, ut solent, insidias
agentes dignosci possint, possent etiam experte
reprimi, & coerceri; ne adeo celeriter increse-
rent, atque ad peiora contenderent.

*Vel repen-
tinam,
vel mor-
tem len-
tam affe-
runt.
An æger
semper
perit
statim
post ru-
ptionem?
Quomo-
do, vel
quando
leniri;
coerceri-
ve mor-
bus con-
tingat?*

Curatio.

§. CCCVII.

Eo spectet curatio, ut sanguinis nîsus in vasa
imminuatur, horum vero renîsus augeatur; uni-
versa humorum massa, si quo vitio laboret, e-
mendetur; depravata organorum structura repa-
retur; & quidquid alicubi præter naturæ ordinem
aut concreverit, aut confluxerit, aut hæserit, ad
pristinam, rectæque œconomix rationem rediga-
tur. Sed danda est opera, ne dum vim liquo-
rum in vasa incurrentium retundere, aut vaso-
rum in liquores reagentium intendere volumus,
modus minime excedatur, sed tantum, quantum
opus est, solummodo efficiatur: quod sane diffi-
cillimum esse fatemur. Initium itaque curationis
esto a tenuissimo, blando, temperanti victu;
quiete summa tum corporis, tum animi; potu
aqueo; & sanguinis missione. Quantum sangui-
nis missioni tribuendum sit vel una declaret ob-
ser-

*Curatio
genera-
lis.*

*Cautio
adhiben-
da.*

*Quale
cugatio-
nis ini-
tium?*

*Præstan-
tia V. se-
ktionis ex*

LOPESII *observa-* servatio GARZIÆ a LOPESIO. Is enim in homine, *tione.* cui arteria loco venæ pertusa fuerat, sivit sanguinem effluere, donec syncope accederet; tunc que vasis magna ex parte exhaustis splenium vulneri apposuit; & brevi illud coaluit, quin ullum insequeretur *aneurysma*. Sanguinis autem missio ætati, temperamento, habitui, viribus, regioni, tempestati, aliisque circumstantibus rebus aptetur; repetaturque, quoties videatur e re futurum. *Generales* Generatim tamen incipienti morbo, nec valde *regula* profecto, nimirum nondum *status* prætergresso, *siccasanguinis* utilis ea est. Nocet autem profectioni, ac ultra *missionem* *status* (a) constituto. Præstantissimum quoque *observanda.* auxilium ea præstat in gravioribus respirationis angustiis, & cordis oppressionibus, præsertim si sputa sangulne tincta aut meri sanguinis superveniant; sed parca, & prudenti manu adhibenda est, ut eidem iterandæ locus, qui sæpe recurrere solet, non desit, nec sub eadem æger viribus deficiat. Vere item, ac autumnio utilissime ad symptomata, atque incrementum morbi præcavendum adhiberi consuevit. Nec ab ea deterreat aliquis partium extremarum tumor. Nam sæpe post eductum sanguinem, restituto liberiore sanguinis circuito, ille ut effectus depravæ in organis mechanices dissipari consuevit (b), Ab hoc vero præsidii genere nos fere abducat subtumida facies, cachecticus habitus, venerea, aut scorbutica cacochymia, quæ proximum in hydropem, aut anasarcam transitum prænunciant. Desistere etiam ab ea oportet, quando solitum amplius non affert solatium. Cavendum item est, ut monet MORGAGNIUS (c), ne invito ægro, aut admodum repugnante sanguinem mittamus. Accidit enim interdum, ut sub ipsam sanguinis missionem

*Quando
ab ea ab-
stinendum?*

nem, aut paullo post rumpatur aneurysma, atque æger pereat. Quod fortasse ab aucta sanguinis velocitate, quæ ejusdem detractione concitari solet, repetendum videtur.

(a) ALBERTINIUS *l. c. p.* 394.

(b) MORGAGN. *ep. med.* XVII. n. 31. 32.

(c) *Id. ibid.*

§. CCCVIII.

Noxium porro est alvum ducere validioribus medicamentis. Compertum est enim, improvido consilio nonnullos pharmaco cathartico sumpto sub ipsam alvi ductionem, aut paullo post ipsam interiisse. Innocua sunt lenientia alvum, & enemata, ubi res expostulare videtur. Immo solis clysmatibus ex urina pueri, sale prunellæ, vel nitro stybiato, aut terebinthina vitello ovi soluta, aut melle rosato solutivo parati uti expedit, quando respirationis difficultas, & partium externarum tumor increscunt. Interdum etiam lenissima, ac anodyna in alvum injecta spasmodicæ ventris affectiones exposcunt.

Cathartica noxia.

Innocua alvum ducentia quæ? Clysmata.

Anodyna injicienda.

§. CCCIX.

Acriora item diuretica cautissime in usum veniant, cum experientia demonstraverit, motum sanguinis ab his nimium concitari, aut dolores nephriticos induci, aut hydropicum tumorem sic interdum augeri, ut respiratio pene supprimatur, aut licet ægri inter initia copiosiore urina emissâ levâri videantur, subita tamen, vel non tarda saltem virium exsolutione non raro eos confici,

Diuretica acriora arceda.

*Mitiora
propo-
nuntur.* ac e medio præter omnium expectationem re-
pente tolli. Mitissima, ac fere innoxia habentur
sympus terebinthinæ, in primis si ex saccharo ro-
sato, aut cydonite fuerit confectus; millepedum
infusio, vel pulvis; nitrum; liquor terræ foliatæ
tartari; quæ præsertim in pectoris anxietate cum
aucto partium œdematoso tumore opportunissima
sunt. Tunc etiam oxymel scilliticum, mel hi-
spanicum, sal volatile succini, vel ejus essentia
locum obtinent. Sed ALBERTINIUS præ reliquis

*Succus
plantagi-
nis cum
operculo-
rum co-
chlearum
pulvere.* commendabat succum plantaginis tum recens ex-
pressum, tum ad dimidium excoctum, eumque
vel merum, vel mixtum cum pulvere operculo-
rum cochlearum propinabat. Sic quoque calidiora
omnia, ac concitantia remedia procul absint.

*Calidio-
ra, &
concitan-
tia ar-
ceantur.* Item quæ corroborante, ac vulneraria, ut vocant,
facultate pollent, mitioris naturæ sint oportet;
atque in primis ex eo genere, quod sanguinem
blande fluidum servant, si crassitie peccare vi-
deatur, aut, si tenuitate, debitam ei crassim re-
stituunt. Sæpe enim alterutrum vitium in hisce
morbis, nempe vel nimius lentor, vel nimius
fluor esse consuevit.

§. CCCX.

*Alteran-
tia ex se-
ro lactis
decocta.* Ex alterantium itaque classe exeligantur, quæ
caussis morbi, atque indicationibus, quas supra
posuimus; faciant satis. Generatim cichoreum,
taraxacum, fumaria, acetosa egregie temperant,
ac refrigerant; præsertim ex lactis sero decocta.
*Adstrin-
gentia
addenda
qua?* Si simul adstringendum aliquantulum sit, aut si-
mul blande serosa colluvies per urinas educenda,
consolida, plantago, agrimonia, hederæ terre-
stris, hypericon, hisque similes plantæ adjici pos-
sunt.

sunt. Quibus vero lactis serum sive vaccinum sit, sive caprillum, aut decocta ex vegetabilibus modo propositis non bene cedunt, sufficiunt interdum jura ex cancris fluviatilibus, & carne ranarum palustrium, quibus sub finem incocti leviter fuerint flores aut hyperici, aut hederæ terrestres. His porro pro varia complicatorum morborum ratione modo antivenerea, modo antiscorbutica, modo absorbentia, uti coraliorum, aut osteocollæ pulvis, modo nervina, atque antispasmodica adjiciuntur. Excipi autem commodissime solent vel cydonite, vel conserva rosarum rubrarum, vel extracto hyperici, aliove apto ac idoneo medicaminum genere. Nonnunquam additur *tinctura martis* succo pomorum dulcium elicitâ, aut serobs ferri in pollen super porphyritim attenuata, aut alia, prout corporis habitus, liquorum diathesis, hypochondriorum affectiones, œdemata, syphylis &c. peculiarem exposcunt animadversionem.

Jura cancrorum, & ranarum.

Varia adjicienda in fine pro varietate complicationum.

Additis interdum fit vel tinctura martis, vel serobis ferri attenuata.

§. CCCXI.

In summi respirandi difficultatibus (quæ sæpe quasi periodice recurrunt, aut saltem vehementius subinde aggrediuntur), cum non semper liceat sanguinem mittere (§. CCCVII.), ad alia præsidia, quæ spiritum faciliorem reddant, est confugiendum. In his volatilia naribus admota excellunt, ut spiritus melissæ, sanguinis humani, salis ammoniaci, acetum vini; quin immo aliquid etiam eorum intrinsecus dari potest, ut guttæ aliquot spiritus salis ammoniaci, aut fuliginis, aut liquoris cornu cervi succinati aqua hyssopi, aut capillorum veneris exceptæ. Oleum

Recurrentis morbus est.

Volatilia quæ, & quando?

Oleosa.

quo-

quoque ex amygdalis dulcibus recentissime expressum, aut commune ex olivis eductum utilissime propinari solet tam cochleatim, quam ad aliquot uncias uno haustu. Quod si alvus etiam

*Quando
rhabar-
barum o-
leo adji-
ciendum?*

*Fricatio-
nes ar-
truum, eo-
rumque
in calida
immer-
siones.*

*Quid in
paroxys-
mo, &
corpore,
aut dolo-
re sinistri
brachii
conve-
niens sit?*

*Frigida
in nudum
pectus in-
jicienda.*

*Quid
spato
sanguini
opponendum,
ab V. S.
locum
non obtineat?*

ducenda sit, ut liberior respiratio, fiat, amygdalis, antequam oleum exprimatur, adjiciatur pulveris rhabbari tantillum. Sed reliquis palmam fere præripiunt fricationes artuum, aut eorum in calidam immersiones (a). Quocunque enim modo sanguis in arteriis, atque adeo in ipso *aneurysmate* consistat, congeraturque, anxietates summæ, quæ inde excitantur, illico cessant, reliquis partibus per aquam calidam laxatis. Hinc brachia, manus, pedes in eam demersis, vel linteolis aqua calenti madidis involuti paroxysmum & præcavent, & præsentem solvunt. Id etiam opportunum est, ubi brachium sinistrum, quod sæpe evenit, dolore, aut torpore afficiatur. Dum autem artus sic aqua calida foventur, si simul eorum fricatio accesserit, promptior revulsio aliqua fit, & si qua convulsio copuletur, resolvituri. Immo solæ frictiones (etiam siccæ) tremores, spasmos, & jectigationes sopiunt, somnumque accersunt, ut non semel vidimus. Interdum aqua etiam frigida in pectus nudum proje-

cta solamen attulisse visa est (b). In orthopnœis, tussique vehementiori, quæ subinde excitantur, sputum sanguinis erumpit, nec semper vena ad illud sistendum secari potest, nec secta semper sufficit. Sistendo itaque, aut præcavendo hujusmodi sputo quies, abstinentia, potus demulcens imperandus est. Succus etiam concretus hederæ terrestris cum terra catechæ non una vice profuit.

(a) ALBERTINIUS *l. c.*, MORGAGNIUS *Epist. XVII. n. 27.*, & SENACIUS *Traite du coeur &c. Tom. IV.*

(b) ALBERTIN. *l. c.*

§. CCCXII.

Sed maxima curationis, aut prophylaxeos pars in diætetico regimine sita est. Loco vini, quod exulare debet, nisi stomachus, vires, aliaque exigant, datur potui aqua simplex vel ignito chalybe alterata, vel ex liguo lentisco, aut cotoneo, aut hordeo decocta, additis, si videatur, passulis dulcibus. Alimenta sint & parca, & levissima, & quæ viribus sustinendis tantum sufficiant. Pulmenta ex hordeo contrito, aut oryza in lacte vaccino, aut jure cocta bis vel ter in die sumpta sine alio cibo interdum profuerunt. Lactea vero diætâ post unam, vel alteram sanguinis missionem instituta, & ad xxx. aut xl. dies protracta cum perpetuo in lecto decubitu ex VALSA-
Prophylaxis.
Potus ratio.
Alimenta quæ?
Diætâ lactea cum decubitu in lecto.
Quies, somnoque conciliandis, & dolori leniend. quid conferat?
Causse remota vitanda.
 VÆ, ac ALBERTINII testimonio plurimum visa est aliquoties profuisse. Vesperis somnus, ac quies emulsionibus, diacodio, immo etiam laudano, ubi valentius agere expediat (uti in doloribus, & spasmis opus est), concilietur. Doloribus vero ob subclaviarum distentionem urgentibus remedia opium habentia uti spasmos compescentia dentur. Præfertur illud opii genus, quod laudani liquidi JO. BAP. HELMONTII nomine venit; daturque sub vesperam ad guttas xii. vel xv. in aquæ distillata ex succo lactucæ haustu (a). Omnes denique remotæ causse evitentur.

(a) MICHELOTTUS in opusc. vol. I. comment. institut. sc. & art. bononien.

NOTA.

NOTA.

Fortasse plura in dissertatione De aneurysmaticis præcordiorum vitiis, quam anno 1777. Vicini editam, atque in theses distributam propugnavit cl. auctoris tunc auditor & discipulus, immaturo fato nobis ereptus, CAJETANUS LOMBARDINIUS Mediolanensis.

Finis Vol. VII. De Morbis Pectoris.

I N D E X

CAPITUM.

- I. **D**E Tussi. Pag. 1.
- II. De cruenta exspuitione, & speciatim de
hemoptysi. 20.
- III. De phthisi pulmonari, præmissa phthiseos,
sive tabis universe cum ejus differen-
tiis explicatione. 41.
- IV. De pulmonum, pectorisque inflammationi-
bus, atque aliis affinibus, aut succe-
dentibus morbis. 110.
- V. De hydrope pectoris, pericardii, & pulmo-
num. 172.
- VI. De difficili respirationi, & speciatim de
asthmate. 207.
- VII. De animi deliquiis, sive de lipothymia, &
syncope. 225.
- VIII. De asphyxia, duobusque ei proximis pul-
sum vitiis. 233.
- IX. De cordis palpitatione. 245.
- X. De cordis, aortae polypo. 260.
- XI. De aneurysmatibus, & varicibus præcor-
diorum. 284.

NOI RIFORMATORI

DELLO STUDIO DI PADOVA.

A Vendo veduto per la Fede di Revisione , ed Approvazione del P. F. Gio: Tommaso Mascheroni Inquisitor Generale del Santo Offizio di *Venezia* nel Libro intitolato *Institutionum medicinae practicae quas praelegebat Jo: Baptista Burserius, de Kanilfeld. Volumen Septimum. Opus posthumum in duas partes divisum &c.* Stampa , non vi esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica , e parimente per Attestato del Segretario Nostro , niente contro Principi, e Buoni Costumi, concediamo Licenza a *Giuseppe Orlandelli* Stampator di *Venezia* , per la Dita del fu *Francesco di Niccolò Pezzana* , che possi essere stampato , osservando gli ordini in materia di Stampe , e presentando le solite Copie alle Pubbliche Librerie di *Venezia* , e di *Padova* .

Dat. li 10. Giugno 1789.

(*Piero Barbarigo* Rif.

(*Girolamo Ascanio Giustinian* Kav. Rif.

Registrato in Libro a Carte 293. al Num. 2754.

Marcantonio Sanfermo Segr.



